

*Реєстр наукових нововведень
вип 8-9, Київ - 1998*

Харчовий додаток вживають за 15-30 хвилин до їди. Дітям від 2 до 12 років - 5 мл (чайна ложка) на 1/2 склянки напою (вода, мінеральна вода, компот, сік, чай та ін.) 3 рази на добу. Дітям після 12 років - 1 столова ложка на 1/2 склянки напою 3 рази на добу. Лікувально-профілактичний курс 3-4 тижні. Курс повторювати через 2-3 місяці. Даний засіб має радіозахисну та Р-вітамінну дію за рахунок антоціанових компонентів бальзаму, виготовленого з натурального винограду сортів типу Каберне.

6. Немає.

7. При загостренні гіперацидного гастриту, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки слід застосовувати з лужною мінеральною водою під час їди.

8. Зниження частоти та тяжкості перебігу респіраторних захворювань, підвищення імунітету.

9. Одеський медичний університет, 270100, м.Одеса, Валіховський пров., 2.

10. О.В. Зубаренко, Е.В. Нікітін, В.А. Куєв, 23-65-18.

11. При зацікавленості у харчових додатках, їх можна замовити: 270100, м.Одеса, вул. Пастера, 7, тел. 23-65-18.

Реєстр. № 84 /8/8

1. СПОСІБ ОБ'ЄКТИВІЗАЦІЇ РУХОВОЇ ФУНКЦІЇ КИШЕЧНИКА.

2. Підвищення результативності своєчасної діагностики порушення рухової функції кишечника та контролювання її відновлення.

3. Перитоніт.

4. Пристрій "Інтестінофонограф".

5. НДР "Використання випромінювання оптичних квантових генераторів у комплексному лікуванні хірургічних захворювань органів черевної порожнини у дітей". Позитивне рішення за заявкою на винахід за №96041588 від 10.07.96 р.

При реалізації способу здійснюється графічне зображення перистальтики кишечника шляхом застосування пристрою "Інтестінофонограф", аналіз якого дозволяє своєчасно діагностувати характер порушення моторно-евакуаторної функції кишечника та контролювати її відновлення під впливом лікувальних засобів.

6. Немає.

7. Немає.

8. Своєчасна допомога при порушенні рухової функції кишечника, скорочення термінів лікування.

9. Одеський медичний університет, 270100, м.Одеса, Валіховський пров. 2.

10. Н.Г. Ніколаєва, 63-09-68; М.Г. Мельниченко, В.Г. Балабан, 32-97-71; О.Р. Мазуровський.

11. Консультації авторів.

Реєстр. № 85 /8/8

1. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СОЛЯРНОГО СИНДРОМУ.

2. Поряд з медикаментозними методами лікування розроблені та впроваджені в лікувальну практику найбільш ефективні фізичні та преформовані фактори терапевтичного впливу, добре діючі на вегетативний апарат нервової системи при солярному синдромі.

3. Патологія периферичної вегетативної нервової системи.

4. Дермограф Кузнецова, РЕГ, РВГ, ЕЕГ, капіляроскоп, тепловізор, вегетативні тестові фізіотерапевтичне обладнання.

5. НДР "Вивчити механізми формування цереброваскулярної патології для підвищення ефективності профілактичних заходів на підставі результатів дослідження вегетативної нервової системи і церебрального кровообігу у осіб з вегетативною патологією, чатковими проявами недостатності кровопостачання головного мозку та дисциркуляційною енцефалопатією", 260/95-97. Патент України №10193, 1997 р.