



НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ,
присвячена 90-річчю
з дня народження
Б. Я. РЕЗНІКА



СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

(для студентів та молодих вчених)

18–19 квітня 2019 року

Тези доповідей



ОДЕСЬКИЙ
МЕДУНІВЕРСИТЕТ



НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ,
присвячена 90-річчю з дня народження
Б. Я. РЕЗНІКА



СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

(для студентів та молодих вчених)

18–19 квітня 2019 року

Тези доповідей



ОДЕСЬКИЙ
МЕДУНІВЕРСИТЕТ

УДК 06.091.5:061.3:61-057.875
С 91

Головний редактор:

т. в. о. ректора, заслужений лікар України
проф. Ю. В. Сухін

Редакційна колегія:

голова Вченої ради, академік НАМН України
проф. В. М. Запорожан
в. о. проректора з науково-педагогічної роботи
проф. Р. С. Вастьянов
науковий керівник Ради СНТ та ТМВ
проф. О. Г. Юшковська

С 91 **Сучасні** теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для студентів та молодих вчених) : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвячена 90-річчю з дня народження Б. Я. Резніка. Одеса, 18–19 квітня 2019 року : тези доп. — Одеса : ОНМедУ, 2019. — 168 с.
ISBN 978-966-443-098-9

У тезах доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю для студентів та молодих вчених, присвяченої 100-річчю з дня народження професора Б. Я. Резніка, подаються стислі відомості щодо результатів наукової роботи, виконаної учасниками конференції.

УДК 06.091.5:061.3:61-057.875

ба) проводилося лікування НПЗП та хондропротекторами. До та після лікування всім жінкам проводили оцінку больового синдрому за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ) та оцінку індексу WOMAC, рухливість колінних суглобів за допомогою кутоміра, рентгенологічне дослідження колінних суглобів.

Результати. В I групі після курсу пресотерапії спостерігалась позитивна динаміка у вигляді зниження інтенсивності больового синдрому на 40 % ($p < 0,05$) за шкалою ВАШ та зменшився індекс WOMAC на 51,7 % ($p < 0,05$) порівняно з II групою хворих, які отримували стандартну медикаментозну терапію. Пацієнтки I групи відмічали значний анальгетичний ефект пресотерапії, а також збільшення показників рухливості колінних суглобів (на 45 %; $p < 0,05$).

Отже, застосування пресотерапії на колінні суглоби є ефективним у жінок в менопаузальному періоді з больовим синдромом, що страждають на остеоартроз колінних суглобів.

ФАКТОРИ НЕКОНТРОЛЬОВАНОГО ПЕРЕБІГУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ

Бажора Я. І., Іванчишина В. П.

*Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна*

Актуальність. Статистичні дані вказують на зростання захворюваності на бронхіальну астму в Україні в 1,6 разу за останні чотири роки. Незважаючи на національні та міжнародні рекомендації щодо лікування бронхіальної астми, впровадження сучасних ефективних лікарських препаратів, астма залишається невиліковним і складно контрольованим захворюванням.

Мета: вивчення, аналіз і узагальнення факторів, що сприяють неконтрольованому перебігу бронхіальної астми.

Матеріали та методи. Нами проводилося проспективне клінічне когортне дослідження у хворих на бронхіальну астму. Було обстежено 142 пацієнти з астмою. Серед них у 78 (54,93 %) пацієнтів був низький контроль перебігу, які й утворили основну групу. Пацієнти з контрольованою астмою — 64 (45,07 %) особи — увійшли до групи порівняння.

Результати. Тільки у 6 (7,69 %) пацієнтів основної групи та у 35 (54,69 %) хворих в групі порівняння немає коморбідної патології. Частіше всього наявні супутні захворювання — надлишкова маса тіла і ожиріння. В основній групі було діагностовано ожиріння у 41,03 % випадків (32 пацієнти) проти 10,94 % випадків (7 пацієнтів) в групі порівняння. Надлишкова маса тіла спостерігалася приблизно однаково: в основній групі — 41,03 % (32 пацієнти), в групі порівняння — 42,19 % (27 пацієнтів). Крім того, у пацієнтів відзначалася низька прихильність до базисної терапії, а також була відсутня мотивація до зміни способу життя, виявлено низький рівень знань про своє захворювання і можливості його лікування. Пацієнти не знали про те, які препарати вони повинні прийма-

ти постійно, як і коли потрібно збільшувати дозу препарату, куди звертатися, якщо немає відповіді на лікування.

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ПІЗЬОГО ДЕБЮТУ СИСТЕМНОГО ЧЕРВОНОГО ВОВЧАКА

Лохаївська А. І.

*Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна*

Системний червоний вовчак (СЧВ) — хронічне автоімунне захворювання, яке характеризується продукцією органоспецифічних автоантитіл до клітинного ядра з імунозапальним ушкодженням внутрішніх органів.

Клінічний випадок. Пацієнтка І., 50 років, звернулася до Університетської клініки ОНМедУ 22.05.2018 р. зі скаргами на хиткість при ходьбі, запаморочення, загальмованість. Із анамнезу відомо, що в 1992 р. вона перенесла інфекційний ендокардит. В 2014 р. була проведена нефректомія з приводу гідронефрозу. В 2017 р. діагностований СЧВ, повільно прогресуючий перебіг, приймає щодня медрол по 4 мг вранці.

Проте 15.05.2018 р. стан погіршився, з'явилась неврологічна симптоматика. Була госпіталізована з попереднім діагнозом транзиторної ішемічної атаки (ТІА). Після короткотривалого стаціонарного лікування — значний регрес неврологічної симптоматики з мінімальною резидуальністю.

Була госпіталізована в УК ОНМедУ, де була проведена магнітно-резонансна томографія (МРТ) головного мозку. На МРТ — ознаки вогнищевих змін в лобних частках судинного характеру (васкулопатія), ретроцеребелярна кіста задньої черепної ямки.

На підставі позитивних серологічних маркерів СЧВ та результатів МРТ був встановлений клінічний діагноз: СЧВ, підгострий перебіг, активність 0–1 на фоні терапії. Церебральний васкуліт. Після проведеної терапії стан пацієнтки значно покращився: хиткість при ходьбі, запаморочення та загальмованість зменшилися до мінімальних. Пацієнтка виписана в задовільному стані.

Клінічний випадок демонструє можливість пізнього дебюту СЧВ та автоімунного ураження церебральних судин у віці, не характерному ні для СЧВ, ні для ТІА.

ВПЛИВ КОМПЕНСАЦІЇ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ХВОРОГО

Митрохіна Н. А.

*Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна*

Актуальність. Сьогодні 422 млн людей в усьому світі хворіють на ЦД. За прогнозами, до 2030 р. діабет стане 7-ю причиною смерті в світі. Сучасна концепція ведення хворих сприймає цукровий діабет як «спосіб життя», до якого вони повинні пристосуватися, використовуючи ще й особистісні ре-