

## МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ



IV науково-практична конференція

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

СПАДКОЄМНОСТІ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТА

З ПОЛІМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ВНУТРІШНІХ  
ОРГАНІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ  
ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ В УКРАЇНІ»



25-26 КВІТНЯ 2019 р.

УДК 616.1/4-056.7 : 614.2(477)(043.2)

### Редакційна колегія:

**В.А. Штанько**, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 Одеського національного медичного університету, к.мед.н., доцент;

**В.І. Величко**, завідувач кафедри сімейної медицини та загальної практики Одеського національного медичного університету, Голова Асоціації сімейної медицини Одеського регіону;

**С.А. Тихонова**, професор кафедри внутрішньої медицини №2 Одеського національного медичного університету, д.мед.н.;

**Л.С. Холопов**, доцент кафедри внутрішньої медицини №2 Одеського національного медичного університету;

**О.В. Хижняк**, доцент кафедри внутрішньої медицини №2 Одеського національного медичного університету

**Актуальні** питання спадкоємності ведення пацієнта з поліморбідною патологією внутрішніх органів в умовах реформування системи охорони здоров'я в Україні: наук.-практ. конф. Одеса: ТОВ «Н-Побута», 2019. – 47 с. (укр., рос., англ.)

У збірці наведено тези доповідей IV науково-практичної конференції «Актуальні питання спадкоємності ведення пацієнта з поліморбідною патологією внутрішніх органів в умовах реформування системи охорони здоров'я в Україні», яка відбулася в Одесі 25-26 квітня 2019 року.

УДК 616.1/4-056.7 : 614.2(477)(043.2)

©ТОВ «Н-Побута»

2,3% проти 30,0 % пацієнток. Тобто, присутність чоловіка під час пологів значно знижує стан високої тривожності. Також слід відмітити результати анкетування: доцільність присутності чоловіка під час пологів відмітили 90,2 % жінок I групи та 86,7 % осіб другої групи.

**Висновки :** Таким чином, проведення партнерських пологів дозволяє знизити частоту акушерських ускладнень у пологих, покращити стан матері та новонародженого.

## ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІGU ТА ЗАВЕРШЕННЯ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК ІЗ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЮ АНЕМІЄЮ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ

### РЕТРОСПЕКТИВНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Москаленко Т.Я., Грищенко А.А., Задорожний В.А.,  
Чернієвський С.В., Задорожний О.А., Мартиновська О.В.

Одеський національний медичний університет,  
КУ «Пологовий будинок №7», м. Одеса, Україна

Проблема зниження перинатальної захворюваності та смертності-головна медична проблема сьогодення у всіх країнах світу. В останні роки найчастішим ускладненням гестаційного процесу у вагітних є залізодефіцитна анемія (ЗДА), яка становить від 30 до 80% (Вдовиченко Ю.П., 2015; Рожковська Н.М., 2017). ЗДА ускладнює перебіг вагітності та пологів, післяполового періоду і призводить до підвищення перинатальної смертності більше ніж у 2-3 рази у порівнянні з здоровими жінками.

**Мета дослідження:** дослідити перебіг та завершення вагітності у жінок із залізодефіцитною анемією за результатами ретроспективного дослідження

**Матеріали та методи:** Нами на базі КУ «Пологовий будинок №7», м. Одеси проведений ретроспективний аналіз 354 індивідуальних карт спостереження за вагітними, історій пологів та індивідуальних карт новонароджених. Із них для поглиблого дослідження відібрано 74 індивідуальні карти. Вік жінок коливався від 18 до 38 років. Термін вагітності у жінок складав 22-34 тижнів. Ступінь анемії переважно середня. Встановлено, що серед ускладнень вагітності у жінок із ЗДА домінували дисфункція плаценти – у 44,6%, затримка росту плода – у 14,9 %, загроза переривання вагітності – у 20,3 %, ранній гестоз – у 32,4 %, прееклампсія – у 14,9 %, передчасні пологи – у 17,6 %, дискординація полової діяльності – у 20,3 %, патологічна крововтрата – у 4,1 %, асфіксія новонароджених – у 5,4 % осіб. Звертає на себе увагу ускладнення у новонароджених. Так, морфофункциональна незрілість відмічена – у 9,5 %, анемія – у 40,5%, кон'югаційна жовтяниця – у 9,5 %, гіпоксичні ураження ЦНС – у 6,8 %.

**Висновки:** Таким чином, проведений нами ретроспективний аналіз свідчить про актуальність проблеми, високу частоту гестаційних та перинатальних ускладнень, що обумовлює необхідність пошуку нових

патогенетично обґрунтovаних методів профілактики та лікування ЗДА у вагітних.



## ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ПЕРЕБІGU ВАГІTНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ПЕРШОНАРОДЖУЮЧИХ ПІЗЬОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ІЗ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЮ АНЕМІЄЮ

Задорожна О.Б., Ситникова В.О., Задорожний В.А.,

Чернієвська С.Г., Краснова Ж.О., Шевченко В.А.

Одеський Національний Медичний Університет

КУ «Пологовий будинок №7», м. Одеса, Україна

**Актуальність проблеми** зумовлена невпинним зростанням кількості вікових першонароджуючих, коли жінка свідомо вирішує свою дітородну функцію. Неодмінно слід враховувати велику кількість несприятливих факторів ризику, таких як: соціальні – пізній шлюб, прагнення до матеріальної та соціальної незалежності; медичних – перенесені гінекологічні (особливо інфекційні захворювання), непліддя, соматичні хвороби та ін. Відомо, що серед екстрагенітальних захворювань у вагітних одне з перших місць займає залізодефіцитна анемія (ЗДА), яка дуже поширенна (30-80%), тому удосконалення методів профілактики, діагностики та лікування ускладнень на сучасному етапі дуже важливо.

**Мета дослідження:** вивчити особливості перебігу та завершення вагітності у першонароджуючих жінок пізнього репродуктивного віку із залізодефіцитною анемією.

**Матеріали та методи:** під нашим спостереженням знаходились 82 першовагітні жінки віком від 35 до 40 років (середній вік  $38,2 \pm 1,5$  роки). Із них 62 вагітні із ЗДА середнього ступеня важкості складали I (основну) групу, та 20 соматично здорових жінок – II (контрольна) група. Групи вагітних за віком, соціальним станом, терміном гестації були ідентичними, що дозволило об'єктивно оцінити результати дослідження. Обстеженім жінкам проводили загальноклінічні, клініко-лабораторні, імуноферментні, інструментальні (оцінка біофізичного профілю плода, УЗД, кардіотокографію, допплерометрію), морфологічні та імуногістохімічні методи.

**Результати дослідження:** при первинному обстеженні та дослідженні лабораторних показників у жінок із ЗДА виявили переважно анемію середнього ступеня тяжкості. Частота ускладнень вагітності та пологів у жінок I групи в 2,0-2,5 рази була вище, ніж у контрольній групі пацієнок. Необхідно відмітити, що наряду з численними ускладненнями вагітності у жінок I групи, такими як: ранні гестози, прееклампсія, загроза переривання вагітності, кровотеча, домінували дисфункція плаценти (ДП) у 51,6% вагітних, дистрес-синдром плода (ДС), гіпотрофія та затримка його росту (ЗРП). При ретельному обстеженні жінок I групи, які мають ДП, встановлені низькі показники фетальних та плацентарних гормонів, наявність метаболічного ацидозу,

## Содержание

<b>Особистісні опитувальники як метод індивідуалізації в діагностиці і лікуванні цукрового діабету.</b> Алавацька Т.В., Карпенко Ю.І., Потапчук О.В., Савельєва О.В., Чукітова Д.Я.	3
<b>Питання нефармакологічних підходів щодо ведення пацієнтів з остеоартрітом великих суглобів.</b> Балашова І.В., Лисий І.С., Найдьонова О.В., Богатирьова Т.В., Афанасьєва Я.С.	5
<b>Коморбідна патологія при системних болезнях соединительної ткани и возможные пути ее коррекции.</b> Вастьянов Р.С., Гуркалова И.П., Кузьменко И.А.	6
<b>Особенности изменений липидного и углеводного обмена у пациентов с избыточной массой тела и ожирением.</b> Венгер Я.И., Величко В.И., Фомин А.В., Данильчук Г.А.	7
<b>Хроничне обструктивне захворювання легень та коморбідна кардіоваскулярна патологія: ведення хворого на прикладі клінічного випадку.</b> Воробйов Є.О., Букій Є.М., Бутова Т.С.	9
<b>Зв'язок ліпідного обміну з показниками метаболізму кісткової тканини у хворих з поєднаним перебігом остеоартрозу та цукрового діабету 2-го типу.</b> Журавльова Л.В., Олійник М.О., Федоров В.О., Сікало Ю.К.	12
<b>Спосіб лікування діабетичних остеоартропатій.</b> Журавльова Л.В., Федоров В.О., Сікало Ю.К., Олійник М.О.	13
<b>Relationship between interleukin-1beta and lipid profile in patients with type 2 diabetes mellitus and overweight.</b> Zhuravlyova L.V., Sokolnikova N.V.	15
<b>Кардиология. Что нового в 2018 году (по материалам конгресса кардиологов и пленума АМН Украины).</b> Руденко В.Г., Гульченко Д.Ю.	16
<b>Молекулярно-генетические аспекты коморбидности.</b> Кузьменко И.А.	18
<b>Вплив лікувально-профілактичного комплексу на рівень циркулюючих імуних комплексів у пацієнтів з бронхіальною астмою на тлі надмірної маси тіла або ожиріння.</b> Лагода Д.О.	19
<b>Пацієнт з періартритом плеча на тлі надмірної маси тіла або ожиріння на прийомі в сімейного лікаря.</b> Назарян В.М., Величко В.І., Храмцов Д.Н.	20
<b>Особливості змін ендотелійзалежних факторів системи гемостазу та фібринолізу при поєднанні артеріальної гіпертензії і хозл під впливом раміприлу.</b> Кошлия В.І., Склярова Н.П.	21
<b>Гиперхолестеринемия и высокий сердечно – сосудистый риск.</b> Руденко В.Г., Гульченко Д.Ю.	22
<b>Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень шляхом проведення партнерських пологів.</b> Москаленко Т.Я., Задорожна О.Б., Чернієвська С.Г., Таганова Т.Ю., Грищенко А.А., Шевченко В.А.	24

<b>Особливості перебігу та завершення вагітності у жінок із залишодефіцитною анемією за результатами ретроспективного дослідження.</b> Москаленко Т.Я., Грищенко А.А., Задорожний В.А., Чернієвський С.В., Задорожний О.А., Мартиновська О.В.	25
<b>Профілактика ускладнень перебігу вагітності та пологів у першонароджуючих пізнього репродуктивного віку із залишодефіцитною анемією.</b> Задорожна О.Б., Ситникова В.О., Задорожний В.А., Чернієвська С.Г., Краснова Ж.О., Шевченко В.А.	26
<b>Добовий профіль артеріального тиску у коморбідних хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з гіпотиреозом.</b> Корчагіна Д.А.	27
<b>Co-, multimorbidity and polypragmasy in cardiac patients: the view of the cardiologist and ways to solve the problem.</b> Makienko N., Delich O., Kharchenko L.	29
<b>Покращення прихильності пацієнтів високого та дуже високого кадіоваскулярного ризику до статинотерапії при застосування поліпілл триномія.</b> Яблонська В.Б., Тихонова С.А., Нігрескул О.Ю.	30
<b>Ефективність фармакотерапії на тлі ожиріння у літніх пацієнтів з коморбідною кардіальною патологією.</b> Штанько В.А., Тофан Н.В., Хижняк О.В., Юрданова І.Г.	31
<b>Магнітолазеротерапія в комплексній реабілітації пацієнтів з резистентною артеріальною гіпертензією та коморбідним цукровим діабетом 2 типу.</b> Волошина О.Б., Чайка А.А., Ковальчук Л.І., Найдьонова О.В.	32
<b>Спостереження щодо ведення хворих з одночасним перебігом постійної форми фібриляції передсердь та облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок.</b> Матюхін П.В.	34
<b>Коморбідність гпмк і гіпертонічної хвороби у пацієнтів міського інсультного центру м. Херсон.</b> Загородній І.В., Величко В.І., Малицька А.П., Засєць С.С., Панова Т.В.	35
<b>Про доцільність застосування електросну у осіб похилого віку, що перенесли інфаркт міокарду.</b> Новиков С.А.	37
<b>Генетика подагри та її перспективи.</b> Грищенко М.В.	38
<b>Статинопрофілактика та статинотерапія коморбідних хворих, та причини недотримання рекомендацій лікаря.</b> Штанько В.А., Андрух В.А.	39
<b>Оценка потребления пуринсодержащих продуктов у пациентов с артериальной гипертензией и их влияние на уровень мочевой кислоты и общего холестерина.</b> Найдёнова Е.В., Шишман Ю.М., Чайка А.А.	43

**АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  
СПАДКОЄМНОСТІ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТА  
З ПОЛІМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ  
В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ  
ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ**

**IV науково-практична конференція**

25-26 квітня 2019 року

Тези доповідей

Провідний редактор І.В.Прокопович

Формат 60×84/16. Ум. друк. арк. 3,06. Тираж 200.

Видавець і виготовлювач ТОВ «Н-Побута»

65044, Одеса, пр..Шевченко, 1