

Валери-Радо, Рене

26/7/88

Библиотека


ЛУИ ПАСТЕРЬ.

ИСТОРИЯ ОДНОГО УЧЕНАГО.

№ 301

Переводъ съ десятаго французскаго изданія

съ шестью приложеніями,



1972

И. И. МЕЧНИКОВА.

1952 г.



ОДЕССА.

Типографія Л. Нитче, Поліцейская улица, № 30.


1889.

ІНВЕНТАР
№ 8040

2012

Дозволено цензурою. Одесса, 8-го февраля 1889 г.

690.016



✓ 301

Посвящается

Госпожъ ПАСТЕРЪ.

300



ПРЕДИСЛОВІЕ.

Предлагаемыя въ переводѣ біографія и исторія научныхъ трудовъ одного изъ величайшихъ умовъ нашего вѣка не нуждаются въ оправданіи предъ читающей публикою. Написанная зятемъ Пастера, известнымъ писателемъ Валери Радо, книга интересна не только для лицъ непосвященныхъ, но и для большинства ученыхъ, такъ какъ лишь немногимъ изъ нихъ достаточно знакомы всѣ области знанія, которыя освѣтилъ геніальный умъ основателя науки о роли и дѣятельности микроорганизмовъ. Для того чтобы ярче выставить интересъ и значеніе предлагаемой читателю книги, я не нахожу ничего лучшаго, какъ передать ему впечатлѣніе, произведенное ею на знаменитаго химика Дюма (учителя Пастера), впечатлѣніе, выраженное имъ въ письмѣ къ Пастеру вскорѣ послѣ выхода въ свѣтъ книги Валери Радо.

«Дорогой товарищъ и другъ,

съ большой и искренней радостью прочель я описание Вашей жизни, сдѣланное близкимъ Вамъ, но вполнѣ безпристрастнымъ человѣкомъ. Будучи постояннымъ очевидцемъ и поклонникомъ Вашихъ счастливыхъ начинаній, Вашего плодотворнаго генія и Вашего непоколебимо-точного метода, я считаю, что полное и вѣрное изложеніе всего этого для юношества есть большая заслуга передъ наукой.

Для читающей публики это изложение будетъ очень полезно; оно послужить хорошимъ двигателемъ для молодыхъ ученыхъ; люди же, какъ я, закончившие свою научную карьеру, будутъ съ радостью переживать въ воспоминаніи наслажденія и восторги, составлявшіе некогда и ихъ счастье.

Да сохранить Васъ превидѣніе еще на долгіе годы для Франціи и да продлить оно Ваше необыкновенное умственное равновѣсіе точности наблюдателя съ гeniemъ проницательности и съ энергией въ исполненіи нeвѣдомаго до сихъ поръ совершенства.

Поблагодарите отъ моего имени Валери Радѣ и пріймите вмѣстѣ съ поздравленіями, лучшія пожеланія любящаго Васъ Дюма.»

И. Мечниковъ.

Въ приложеніяхъ помѣщены нѣкоторыя брошюры Пастера, любезно имъ присланныя для русскаго перевода. Первое приложеніе содержитъ письмо Пастера къ Декану Бонскаго университета съ отказомъ отъ званія нѣмецкаго доктора. Этимъ отчасти объясняется пристрастное отношеніе нѣкоторыхъ нѣмецкихъ ученыхъ къ Пастеру. Въ остальныхъ приложеніяхъ изложены взгляды Пастера на высшее образованіе, его рѣчи на международныхъ конгрессахъ, его споръ съ Петеромъ въ Медицинской Академіи по вопросу о предохранительныхъ прививкахъ бѣшенства, и наконецъ предложенный имъ способъ истребленія кроликовъ путемъ зараженія микробами куриной холеры. Послѣдний способъ, какъ известно, предложенъ былъ также И. И. Мечниковымъ для истребленія сусликовъ, наносящихъ столь громадный вредъ южно-русскому хлѣбопашеству.

Переводчики.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
Воспоминания детства и юности	1
Первый открытия	7
Брожение	29
Укусное брожение	47
Вопросъ о самопроизвольномъ зарожденіи	64
Ученіе о винѣ	81
Болѣзни шелковичныхъ червей	92
Рѣшительные опыты	118
Изслѣдованія о пивѣ	120
Заразныя болѣзни	126
Куриная холера	150
Ослабленный заразы или вакцины заразныхъ болѣзней	157
<u>Вакцины сибирской язвы</u>	165
Объ обратномъ усиленіи заразы	176
Этіология сибирской язвы	178
Способъ спора и возраженія	187
Лабораторія Пастера въ Нормальной школѣ. — Предметы изслѣдованія.	
Бѣшенство	193
Методъ предупрежденія заболѣванія бѣшенствомъ	214
Приложение: 1-ое. Возвращеніе диплома д-ра медицины Боннскому университету	225
" 2-ое. Нѣкоторыя размышленія о положеніи наукъ во Франціи	227
" 3-е. Отчего Франція не нашла выдающихся людей, когда ей угрожала гибель	231
" 4-ое. Три рѣчи Пастера на международныхъ конгрессахъ	243
" 5-ое. Засѣданіе Парижской Медицинской Академіи о предохранительномъ лѣченіи бѣшенства по методу Пастера .	279
" 6-ое. Объ истребленіи кроликовъ въ Австралии и Ново-Зеландіи	308





ЛУИ ПАСТЕРЪ.



Воспоминанія дѣтства и юности.

— «Ну, г. Пастеръ, пора уже стряхнуть съ себя лѣнь!»

Такъ говорилъ ночной сторожъ Безансонского коллѣжа, входившій неизмѣнно въ четыре часа утра въ комнату Пастера и будившій его выше приведеною сильною фразою, сопровождаемою, въ случаѣ надобности, и сильнымъ толчкомъ. Пастеру было тогда восемьнадцать лѣтъ. Кромѣ содержанія и помѣщенія, королевскій коллѣжъ давалъ ему двадцать четыре франка въ мѣсяцъ. Но хотя это было скромное мѣсто, оно однако удовлетворяло его самолюбію: это было первое звено, долженствовавшее соединить его съ университетомъ.

— «Ахъ, — говорилъ часто Пастеру его отецъ, — если-бы ты когда-нибудь сдѣлался профессоромъ, и еще профессоромъ въ коллѣжѣ Арбуа, я быль-бы самый счастливый человѣкъ въ мірѣ!»

Подобнымъ мечтамъ о будущемъ его отецъ предавался еще тогда, когда онъ жилъ въ Доль и сыну его было ^{всего} два

года. Что, сказаль-бы онъ, если-бы ему сообщили, что, спустя пятьдесят восемь лѣтъ, на фасадѣ маленькаго домика небольшой улицы Танеръ, въ присутствіи его живаго сыпа, обремененнаго почестями и славою, явившагося въ замощенный уже городъ, въ сопровожденіи тріумfalнаго кортежа, — будетъ помѣщена дощечка, носящая золотыми буквами слѣдующую надпись:

Здѣсь родился Луи Пастеръ

27 Декабря 1822 г.

Подойдя къ этому дому, Пастеръ вспомнилъ о своемъ отцѣ и матери, о тѣхъ, кого онъ называлъ своими дорогими покойниками, — и изъ глубины его далекаго дѣтства передъ нимъ возстало столько воспоминаній о родительской любви, преданности и самоотверженіи, что онъ не могъ удержаться отъ рыданій.

Жизнь его отца, стараго, заслуженнаго солдата, была тяжелой, когда по возвращеніи съ походовъ во Францію, гдѣ онъ уже не имѣлъ пристанища, онъ долженъ былъ трудомъ зарабатывать свой хлѣбъ. Онъ выбралъ ремесло кожевника. Однажды онъ встрѣтилъ молодую и бодрую дѣвушку, избралъ ее своей подругою, — и они вдвоемъ смѣло вступили въ трудовую жизнь. Онъ былъ спокойный, разсудительный, предпочитающій въ минуты отдыха общество книгъ обществу своихъ сосѣдей; она — полная энтузіазма, съ умомъ и сердцемъ, волнуемыми великими мыслями, которыя во всякую минуту освещали яркимъ свѣтомъ сѣрий фонъ ихъ скромной жизни; оба следили безпрерывно съ беспокойною заботливостью за маленькимъ сыномъ Луи, «изъ котораго, — какъ они говорили съ гордостью, смѣшанною съ нѣжностью, — мы сдѣлаемъ образованнаго человѣка.»

Въ 1825 г. семейство Пастера покинуло Доль съ тѣмъ, чтобы основаться въ Арбуа. Отецъ Пастера купилъ на берегу рѣки Кизансъ маленькую кожевню. Въ этой-то кожевнѣ и въ городѣ Арбуа Пастеръ провелъ свое дѣтство. Лишь только онъ достигъ возраста, когда онъ могъ быть принятъ полупансионеромъ, его отдали въ общественную школу. Первые дни онъ очень гордился, когда, будучи самымъ маленькимъ изъ всѣхъ

учениковъ, онъ входилъ въ большую дверь старого колледжа съ полными руками громадныхъ словарей, тогда ему еще совершенно ненужныхъ.

Занимаясь своимъ тяжелымъ ремесломъ, отецъ Пастера превращалъ себя по вечерамъ въ репетитора для своего сына. Это вначалѣ было не легкимъ дѣломъ: Луи Пастеръ не всегда избиралъ прямой путь, когда нужно было пойти въ классъ или вернуться домой работать. Въ Арбуа попадаются еще и теперь старые друзья, которые помнятъ, какъ они отправлялись удить рыбу съ маленькимъ Пастеромъ, и впечатлѣніе, оставшееся отъ этихъ прогулокъ, было такъ сильно, что они уже сами повторяли ихъ, отъ времени до времени, во всю свою жизнь. Часто также Пастеръ вмѣсто того, чтобы заняться своею задачею или переводомъ, исчезалъ и съ увлечениемъ предавался рисованію какого-нибудь большаго портрета сосѣда илисосѣдки. Еще и въ настоящее время можно встрѣтить въ нѣкоторыхъ домахъ Арбуа съ дюжину портретовъ, писанныхъ пастелью и подписаныхъ имъ. Вѣрность рисунка поразительна, если принять во вниманіе, что рисунокъ сдѣланъ тридцатилѣтнимъ мальчикомъ.

— «Какъ жаль, — еще недавно сказала одна старая обывательница Арбуа, — что онъ углубился въ химію! Онъ не отдался своему призванію, а между тѣмъ онъ могъ бы составить себѣ репутацію художника!»

Только начиная съ третьяго класса, Луи Пастеръ сталъ сознавать, сколькихъ жертвъ онъ стоилъ отцу; онъ бросилъ свои рыболовные снаряды, заперъ въ ящикъ свои цвѣтные карандаши съ тѣмъ, чтобы ихъ оттуда доставать лишь въ рѣдкихъ случаяхъ, и почувствовалъ ту страсть къ труду, которая сдѣлалась основаніемъ всей его жизни. Студентъ, стоявшій во главѣ колледжа, видя, что его ученикъ, маленький Пастеръ, при первомъ усилии опередилъ всѣхъ своихъ товарищѣй, говорилъ: «Онъ пойдетъ далеко!... Его надо направлять не къ кафедрѣ такого маленькаго колледжа, какъ нашъ, онъ долженъ сдѣлаться профессоромъ королевскаго колледжа.»

«Мой маленький другъ, — прибавлялъ онъ, — Вы должны думать о великой Нормальной Школѣ!...»

Такъ какъ коллежъ въ Арбуа не имѣлъ профессора философіи, то Пастеръ перевелся въ Безансонъ. Онъ тамъ остался учебный годъ, получилъ степень бакалавра и немедленно былъ назначенъ репетиторомъ въ этомъ-же коллежѣ. Когда онъ былъ свободенъ отъ своихъ обязанностей, онъ продолжалъ курсъ специальной математики, подготовлявшій его къ экзамену въ Нормальную Школу. Надо думать, что уже тогда онъ обладалъ особенною серьезностью, такъ какъ ему порученъ былъ надзоръ за классомъ старшихъ, которые въ часы уроковъ были его товарищами. Въ классѣ его столъ помѣщался среди нихъ, и никогда еще такой молодой преподаватель не пользовался подобнымъ авторитетомъ и такъ мало нуждался въ его обнаруживаніи.

Его первая склонность къ химіи выразилась въ столь многочисленныхъ вопросахъ, обращенныхъ во время урока къ старому профессору Дарлэ, что этотъ почтенный человѣкъ, приведенный въ смущеніе, кончилъ тѣмъ, что заявилъ, что онъ самъ долженъ обращаться за разъясненіями къ Пастеру, а не Пастеръ къ нему. Пастеръ не настаивалъ, но узнавъ, что въ Безансонѣ проживаетъ фармацевтъ, отличившійся въ прежнее время работою, помѣщенную въ Анналахъ химіи и физики, онъ отыскалъ его и попросилъ дать ему тайкомъ, въ дни выхода, нѣсколько частныхъ уроковъ.

На экзаменѣ въ Нормальной Школѣ Пастеръ былъ принятъ: онъ былъ четырнадцатый. Но эта степень ему не понравилась. Какъ его ни порицали другие кандидаты, явившіеся съ нимъ въ одно время, онъ однако рѣшилъ еще одинъ годъ подготовляться. Онъ захотѣлъ поработать въ самомъ Парижѣ, въ одномъ изъ его спокойныхъ уголковъ, среди подготовительныхъ школъ и монастырей.

Въ переулкѣ Фейантинѣ жилъ одинъ содержатель института, г. Барбе или иначе папа Барбе, какъ его называли съ провинциальнюю фамильярностью всѣ уроженцы департамента Фран-Контѣ. Пастеръ пожелалъ вступить въ это учебное заведеніе не въ качествѣ репетитора, а какъ обыкновенный ученикъ. Зная, какъ мало состоятеленъ его землякъ, г. Барбе умень-

шиль его плату на одну треть. Папа Барбе привыкъ дѣлать подобныя благодѣянія; онъ только не любилъ, чтобы ему о нихъ говорили, но тѣмъ пріятнѣе теперь разсказать объ этомъ.

Годъ прошелъ, наступили экзамены, Пастеръ былъ принятъ четвертымъ. Наконецъ-то, въ Октябрѣ 1843 г., онъ въ этой Нормальной Школѣ, гдѣ ему суждено было занять такое видное мѣсто! Склонность Пастера къ химіи превратилась въ страсть. Теперь онъ могъ ее удовлетворить вволю. Химію тогда преподавали: въ Сорбонѣ — Дюма, а въ Нормальной Школѣ — Баларъ. Ученики школы слушали оба курса. Какъ ни отличались другъ отъ друга оба профессора, и тотъ и другой имѣли большое влияніе на своихъ учениковъ: Дюма съ своею спокойною важностью, глубокимъ уваженіемъ къ своей аудиторіи, не допускающей ни малѣйшей неточности въ своихъ словахъ и опытахъ; Баларъ съ своею совершенно юношескою живостью, волнующейся на своей кафедрѣ, подобно южанину на трибунѣ, не всегда дающей своимъ словамъ время следовать за мыслями. Это онъ, показывая однажды публикѣ немногого калія, сказалъ съ жизнью фразу, оставшуюся памятною: «Вотъ калій — самъ калій, наконецъ калій, который я вамъ показываю».

Общія идеи, которыя развивалъ Дюма въ своемъ превосходномъ изложеніи, масса научно изслѣдованныхъ фактовъ, которые сообщалъ Баларъ — все это соответствовало требованиямъ ума Пастера. Относясь съ любовью къ великимъ обобщеніямъ въ наукѣ, онъ въ то же время былъ сильно озабоченъ необходимостью въ постоянномъ контролѣ опытами. Каждая лекція въ Нормальной Школѣ или Сорбонѣ вызывала въ немъ глубокій энтузіазмъ. Когда однажды Дюма, производя опытъ уплотненія угольной кислоты, спросилъ, кто желаетъ получить въ свой платокъ эту уплотнившуюся въ видѣ снѣга угольную кислоту, — Пастеръ бросился къ подножью кафедры, попросилъ дозволить ему подставить свой платокъ и, получивъ кусокъ снѣга, съ триумфомъ побѣжалъ въ Нормальную Школу, гдѣ тотчасъ повторилъ всѣ главные опыты, которые знаменитый химикъ продѣлалъ передъ всею аудиторіею, а платокъ, кото-раго коснулся Дюма, хранилъ, какъ святыню.

По воскресеньямъ Пастеръ проводилъ день у Барюеля, препаратора Дюма. Онъ только и думалъ объ опытахъ. Долгое время въ одной изъ лабораторий Школы приводилъ въ удивление, а, можетъ быть, еще и теперь приводить, бокалъ, содержащий шестьдесят граммъ фосфору, добытыхъ изъ костей, которыя Пастеръ купилъ у мясника, кальцинировалъ, подвергъ всѣмъ процедурѣ, хорошо известнымъ изучающимъ химію, и превратилъ, наконецъ, послѣ цѣлаго дня нагреванія, съ 4 часовъ утра до 9 вечера, въ эти 60 граммъ фосфору. Это былъ первый случай въ Нормальной Школѣ, что производились всѣ продолжительныя манипуляціи, необходимыя для приготовленія фосфора. Ложась въ постель наканунѣ дня, когда печь въ лабораторіи должна была нагреваться, Пастеръ шепталъ про себя: «Еще семь часовъ нужно ожидать до того времени, когда можно будетъ возвратиться въ лабораторію».

Онъ только и думалъ о томъ, какъ бы забраться въ лабораторію или библіотеку, побуждаемый любознательностью ко всѣмъ предметамъ науки, постоянно желая учиться, разузнавать, провѣрять. Уставъ Школы предоставлялъ широкую свободу личной ініціативѣ, и онъ этимъ вполиѣ воспользовался. Эта постоянная свобода заключаетъ въ себѣ прелестъ и достоинство Нормальной Школы; она не только допускаетъ, но она поощряетъ личныя занятія; она дозволяетъ воспитаннику посещать библіотеку, сколько ему вздумается, просматривать журналы и научныя обозрѣнія. Эта система высшаго образования замѣчательно развиваетъ духъ изслѣдованія. Въ этомъ состоитъ большое преимущество Нормальной Школы передъ Политехническою. Учрежденная вначалѣ для военныхъ и вынужденная, между прочимъ, и громаднымъ числомъ своихъ воспитанниковъ ко введенію строгой дисциплины и точной правильности въ каждомъ изъ занятій, Политехническая Школа менѣе Нормальной способна возбудить въ умахъ учениковъ наклонность къ умозрительнымъ знаніямъ. Несомнѣнно, что этой широкой свободѣ труда, этой возможности уединеннаго чтенія Пастеръ обязанъ своимъ первымъ научнымъ изслѣдованіемъ, которое сдѣжалось исходною точкою новаго открытия.

Первые открытия.

Один из учителей Нормальной Школы, совершенно не похожий на Безансонского профессора физики и химии, не только радовался, когда Пастеръ ему задавалъ вопросы, но часто самъ ихъ вызывалъ и бесѣдовалъ съ нимъ о научныхъ книгахъ. Это былъ Делафоссъ, память о которомъ осталась дорога для всѣхъ его учениковъ; это былъ одинъ изъ тѣхъ людей, которые недостаточно цѣнятъ себя, или, по выражению кардинала де-Реца, не выставляютъ на видъ своихъ заслугъ. Не потому, что обстоятельства этому не благопріятствуютъ, но вслѣдствіе того, что непреодолимая скромность и природная беспечность оставляютъ ихъ въ полуутѣни, гдѣ они чувствуютъ себя очень хорошо и находятъ себѣ легкое умиротвореніе отъ всякихъ внутреннихъ сомнѣній. Делафоссъ, ученикъ и сотрудникъ знаменитаго кристаллографа Гаюи, занимался преимущественно вопросами молекулярной физики. Пастеръ зачитывался съ Делафоссомъ работами Гаюи и не говорилъ съ нимъ ни о чёмъ иномъ, какъ только о молекулярномъ строеніи тѣль, — какъ вдругъ, сообщеніе немецкаго минералога Мичерлиха, сдѣланное Академіи наукъ, пошатнуло всѣ ихъ воззрѣнія. Сообщеніе состояло въ слѣдующемъ.

Парафинокаменно-и виннокаменно-кислые натръ и аммоній имѣютъ одинаковый химический составъ, ту же самую кристаллическую форму съ одинаковымъ угломъ, одинъ и тотъ же удѣльный вѣсъ, одинаковую двойную рефракцію и, слѣдовательно, одинаковый уголъ оптическихъ осей. Растворенные въ водѣ, они имѣютъ одинаковую преломляемость, но растворъ тартрата*) отклоняетъ плоскость поляризациіи, а растворъ паратартрата остается индиферентнымъ, какъ это показалъ Біо для всѣхъ подобныхъ солей. «И, однако, — прибавляетъ Мичерлихъ, — природа и число атомовъ, ихъ расположеніе и разстояніе одинаковы въ обоихъ сравниваемыхъ тѣлахъ.»

«Какъ?», — сказалъ себѣ Пастеръ, всецѣло проникнутый ученіемъ Гаюи и Делафосса о расположеніи молекуловъ въ кристал-

*) Тартраты — соли виннокаменной кислоты.

лахъ и точными идеями Дюма относительно молекулярной химії, — «какъ допустить, чтобы въ рядахъ тѣлъ, гдѣ природа и число атомовъ, расположение ихъ и разстояніе одинаковы, а также одинаковы и кристаллическія формы обоихъ рядовъ, — какъ возможно, чтобы оба ряда не были строго идентичны во всемъ остальномъ? ! Совмѣстимо ли тождество, подтверждаемое заключеніемъ Мичерлиха, этихъ двухъ рядовъ солей тартратовъ и паратартратовъ, о которомъ идетъ рѣчь въ его сообщеніи, съ констатированнымъ различіемъ ихъ оптическаго характера? »

Мысль объ этой несовмѣстимости долго и неотвязчиво преслѣдовала Пастера. Получивши степень адъюнктъ-профессора физики въ концѣ третьаго года пребыванія въ Нормальной Школѣ, оставленный потомъ при своемъ учителѣ Баларѣ, онъ началъ уже заниматься изученіемъ кристалловъ, опредѣленіемъ ихъ угловъ и формы, — какъ вдругъ онъ получилъ назначеніе быть профессоромъ физики въ лицѣ Турнона. Это назначеніе сильно его поразило и привело въ отчаяніе. Профессоръ Баларѣ поспѣшилъ къ министру и поговорилъ съ нимъ о своемъ помощнике въ такихъ выраженіяхъ, что назначеніе Пастера было отмѣнено. Пастеръ остался въ Нормальной Школѣ.

Чтобы укрѣпиться въ знаніи кристалловъ, онъ взялся изучить пространную работу де-ла-Провосте. «Я продѣлаю опять,» — сказалъ себѣ Пастеръ — «всѣ измѣренія угловъ, всѣ опредѣленія де-ла-Провосте и сравнию его данные съ моими». Работы этого физика, извѣстнаго точностью и тщательностью въ своихъ изслѣдованіяхъ, касались какъ разъ виннокаменной и паравиннокаменной кислотъ и ихъ солей.

Года 2—3 тому назадъ, во время одного изъ путешествій на Юру, гдѣ мы вмѣстѣ гуляли съ Пастеромъ, онъ, изложивъ мнѣ дословно сообщеніе Мичерлиха, рассказалъ съ энтузіазмомъ ученаго о той радости, которую онъ испыталъ, когда ему удалось получить кристаллы виннокаменной кислоты и ея солей. «Это были такие кристаллы, — прибавилъ онъ, — которые могли послужить по красотѣ и величинѣ съ самыми лучшими изъ извѣстныхъ кристалловъ.»

— «Мнѣ довольно трудно», сказаіъ я ему, — «слѣдить за Вашей виннокаменной кислотой и за всѣми этими тартратами и паратартратами. Насколько меня всегда увлекали всѣ Ваши другія изслѣдованія, настолько же работы, имѣвшія своимъ исходнымъ пунктомъ сообщеніе Мичерлиха и мемуары де-ла-Провосте, мнѣ постоянно казались, когда я старался вникнуть въ нихъ, чѣмъ-то совершенно недоступнымъ. Вы должны были бы, — прибавилъ я, — въ угоду тѣмъ, которые любятъ говорить о вашихъ работахъ, не дѣлать никакихъ открытій въ этой области знанія.»

— «Возможно-ли это», — воскликнулъ Пастеръ съ иѣкоторой досадой, смѣшанной съ снисхожденіемъ, — «возможно-ли, чтобы вы никогда не усматривали широкаго горизонта за этими изысканіями физики и молекулярной оптики?! Если я жалѣю о чѣмъ-нибудь, то именно о томъ, что я не послѣдовалъ по этому пути, гораздо менѣе трудному, чѣмъ это кажется, и который долженъ быть вести, по моему убѣженію, къ прекраснѣйшимъ открытіямъ. Внезапное увлеченіе бросило меня въ область броженія, а броженіе въ свою очередь привело меня къ изученію болѣзней, но я все-таки сокрушаюсь, что никогда не имѣлъ времени возвратиться къ своимъ первымъ шагамъ.»

Затѣмъ онъ продолжалъ съ ясностью изложенія, въ которой чувствовался профессоръ, всегда ставившійся излагать свои идеи въ доступной для аудиторіи формѣ:

«Если разсматривать всѣ тѣла природы, какъ они являются въ минеральномъ, растительномъ и животномъ царствахъ, или если даже разсматривать предметы, сдѣланные человѣческими руками, мы замѣчаемъ, что они раздѣляются на двѣ большихъ категоріи: одни тѣла имѣютъ симметричное строеніе, другія не имѣютъ его. Вотъ, напр., столъ, стулъ, игральная кость, человѣческое тѣло; можно себѣ вообразить плоскость, проходящую черезъ эти предметы или черезъ тѣло человѣка и раздѣляющую ихъ на двѣ совершенно равныя половины. Такимъ образомъ, плоскость, проходящая по срединѣ стула или спинки кресла, раздѣляетъ ихъ на двѣ равныя части, правую и лѣвую. То же самое: вертикальная плоскость, проходящая по срединѣ лба, носа, рта и подбородка какого-нибудь

человѣка, оставляетъ на правой сторонѣ ту же совокупность частей, что и на лѣвой сторонѣ. Вѣдь это очень просто, не такъ-ли? Всѣ эти предметы и цѣлая масса другихъ подобныхъ образуютъ первую категорію. — «Они имѣютъ одну или нѣсколько плоскостей симметріи», — сказаль-бы математикъ».

«Но далеко не всѣ предметы устроены такимъ образомъ, чтобы у нихъ замѣчалось повтореніе одинаковыхъ частей. Рассмотрите, напримѣръ, вашу правую руку: въ ней невозможно найти симметрическаго строенія. Какой-бы ни придумали разрѣзъ правой руки, вы никогда не раздѣлите ее такъ, чтобы на правой и на лѣвой сторонѣ остались одинаковыя части. То же самое и съ лѣвой рукой, съ правымъ или лѣвымъ ухомъ, съ правымъ или лѣвымъ глазомъ, съ вашей правой или лѣвой, верхней или нижней конечностью. Человѣческое тѣло, взятое въ цѣломъ, имѣетъ плоскость симметріи, а каждая изъ частей, составляющихъ ту или другую его половину, не имѣютъ ея. Стволъ какого-нибудь растенія, вокругъ котораго спиралью распредѣляются листья, не имѣть плоскости симметріи. Витая лѣстница не имѣетъ плоскости симметріи, а лѣстница прямая — симметрична. Вѣдь это ясно? !»

«Не правда-ли, было-бы удивительно, если-бы разные виды минераловъ, каковы: морская соль, квасцы, алмазъ, горный хрусталь и много другихъ, возникающихъ по великому закону кристаллизациіи и которые имѣютъ геометрическія формы, — не представляли-бы намъ примѣровъ двухъ выше названныхъ категорій. И, въ самомъ дѣлѣ, они намъ ихъ представляютъ. Такъ, кубъ, имѣющій форму игральной кости, имѣетъ плоскость симметріи, онъ даже имѣетъ ихъ нѣсколько. Алмазъ, имѣющій форму правильнаго октаэдра, имѣетъ также нѣсколько плоскостей симметріи. То же самое и у громаднаго большинства формъ химическихъ тѣлъ, встречающихся въ природѣ и въ лабораторіяхъ. Есть, однако, и исключенія: горный хрусталь, который находятъ въ трещинахъ скалъ, въ нѣкоторыхъ перво-бытныхъ местностяхъ, и представляющійся въ видѣ иголъ, часто довольно большихъ, не имѣетъ плоскости симметріи. На этой кристаллической формѣ находится нѣсколько маленькихъ

поверхностей, разсѣянныхъ такимъ образомъ, что совокупность ихъ можно сравнить съ завиткомъ улитки или со спиралью, или съ винтомъ, — словомъ, съ такими предметами, у которыхъ нѣтъ плоскости симметріи.»

«Весь предметы, имѣющіе плоскость симметріи, поставленные предъ зеркаломъ, отражаются въ немъ совершенно идентичными формами. Зеркальное изображеніе совмѣщается съ реальнымъ предметомъ. Поставьте стулъ предъ зеркаломъ: изображеніе воспроизведетъ точно такой же стулъ; наше тѣло въ цѣломъ воспроизводится такимъ же въ зеркалѣ. Но положите вашу правую руку предъ зеркаломъ — и вы увидите тамъ лѣвую руку. Правая рука не можетъ совмѣщаться съ лѣвой такъ же, какъ перчатка правой руки не можетъ быть надѣта на вашу лѣвую руку и обратно.»

И возвратившись къ началу своихъ кристаллографическихъ изслѣдований, Пастеръ мнѣ разсказалъ вкратцѣ, что при повтореніи работъ де-ла-Провосте онъ замѣтилъ, что одинъ чрезвычайно интересный фактъ ускользнулъ отъ вниманія опытнаго физика. Де-ла-Провосте не замѣтилъ при изученіи формъ кристалловъ виннокаменной кислоты и ея солей, что эти формы не имѣютъ плоскости симметріи. Нѣкоторыя маленькия поверхности ускользнули отъ его вниманія. Иными словами, Пастеръ замѣтилъ, что форма виннокаменной кислоты, положенная предъ зеркаломъ, даетъ изображеніе, которое съ ней не совмѣщается. То же самое происходитъ со всѣми солями этой кислоты. Форма же паравиннокаменной кислоты, какъ и формы всѣхъ ея соединеній, по изслѣдованию Пастера, принадлежать къ группѣ предметовъ природы, имѣющихъ плоскость симметріи.

Этотъ двойной результатъ привелъ въ восхищеніе Пастера: онъ увидѣлъ возможность достигнуть экспериментальнымъ путемъ объясненія того затрудненія, которое надѣжало сообщеніе Мичерлиха, брошенное въ видѣ вызова въ эту область знанія, указывая на оптическую разницу между двумя химическими соединеніями, которыя, казалось, должны-быть строго идентичны по общности всѣхъ своихъ другихъ признаковъ. «Затѣмъ, — сказалъ себѣ Пастеръ, — такъ какъ я нахожу, что виннокаменная кислота

и вѣсъ соли лишены плоскости симметріи, тогда какъ ея изомеръ — паравинокаменная кислота и соли этой кислоты имѣютъ плоскость симметріи, то я постараюсь приготовить тартраты и паратартраты, о которыхъ сообщилъ Мичерлихъ, я буду сравнивать ихъ формы и, очень вѣроятно, соли винокаменной кислоты будутъ диссимметричны, т. е. безъ плоскости симметріи, соли же паравинокаменной кислоты, напротивъ, окажутся съ плоскостью симметріи. Тогда абсолютная идентичность формъ этихъ двухъ химическихъ соединеній, указанная Мичерлихомъ, не будетъ больше существовать. Въ такомъ случаѣ окажется, что онъ ошибся, и въ его сообщеніи не будетъ ничего таинственного. Такъ какъ оптическое дѣйствіе, свойственное винокаменнокислымъ соединеніямъ, о которыхъ Мичерлихъ говоритъ въ своемъ сообщеніи, выражается въ отклоненіи плоскости поляризациіи вправо, то это и есть родъ диссиметріи, въ которой пѣтъ ничего страннаго при диссиметричности ихъ кристаллической формы. Напротивъ, оба рода диссиметріи могутъ быть отнесены къ одной и той же причинѣ. То же самое въ соединеніяхъ паравинокаменной кислоты: отсутствіе диссиметріи въ кристаллическихъ формахъ будетъ связано съ оптической недѣятельностью этихъ соединеній.»

Факты, однако, только отчасти оправдали надежды Пастера. Винокаменные соли натра и амміака, какъ и вѣсъ другія соли этой кислоты, представились диссиметричными, съ отсутствиемъ какой-бы то ни было плоскости симметріи, т. е. кристаллическія формы этихъ солей, положенные предъ зеркаломъ, отражались въ немъ въ видѣ изображеній, не совмѣщаемыхъ другъ съ другомъ все равно, какъ правая рука отражается въ зеркальѣ въ видѣ лѣвой. Относительно же паравинокаменнокислыхъ солей натра и аммонія одно обстоятельство поразило Пастера своей совершенной неожиданностью. Онъ не только не могъ констатировать въ этихъ соляхъ отсутствіе диссиметріи, онъ ее, напротивъ, явно находилъ во всѣхъ кристаллахъ. Но, странно, некоторые кристаллы представляли диссиметрію въ одномъ, а другіе въ противоположномъ направленіи. Если помѣстить некоторые кристаллы предъ зеркаломъ, то они даютъ изображенія,

совмѣстимыя съ другими, и нѣкоторые изъ этихъ кристалловъ съ точностью сливаются по своей формѣ съ формой тартратовъ, приготовленныхъ изъ виноградной виннокаменной кислоты. Тогда Пастеръ себѣ сказалъ: «такъ какъ нѣть никакой разницы между формами тартратовъ, добытыхъ изъ виноградной виннокаменной кислоты, и нѣкоторыми формами кристалловъ, отлагающихся въ моментъ кристаллизациіи паравиннокаменокислыхъ солей, то я хочу собственноручно отдѣлить всѣ кристаллы, образующіеся при кристаллизациіи паравиннокаменокислыхъ соединеній, которые по своей особенной диссимметріи идентичны съ виннокаменокислыми солями. Я долженъ стараться обыкновенными химическими манипуляціями получить виннокаменную кислоту, идентичную съ виноградной виннокаменной кислотой, со всѣми ея физическими, минералогическими и химическими свойствами,— кислоту, которая имѣла бы, какъ натуральная виноградная виннокаменная кислота, такую же диссимметрію формы и такое-же дѣйствіе на поляризаціонный свѣтъ. Съ другой стороны, я долженъ буду извлечь изъ другаго сорта кристалловъ, соединенныхъ съ предыдущими при кристаллизациіи паравиннокаменокислыхъ соединеній, такую кислоту, которая воспроизведетъ обыкновенную виннокаменную кислоту, но имѣющую диссимметрію въ обратномъ направленіи и такое же обратное дѣйствіе на поляризаціонный свѣтъ.»

Съ чисто-лихорадочнымъ жаромъ Пастеръ поспѣшилъ произвести этотъ двойной опытъ. Какъ велика была его радость, когда онъ увидѣлъ, что его предположенія осуществляются, и осуществляются съ чисто-математической точностью! Его волненіе было такъ велико, что онъ внезапно покинулъ лабораторію и, встрѣтивъ, тотчасъ по выходѣ, препаратора физического кабинета, онъ обнялъ его и сказалъ:

«Мой дорогой Берtrandъ, я только что сдѣлалъ великое открытие! Я раздѣлилъ двойную соль паравиннокаменокислого натра и аммонія на двѣ соли съ противуположной диссимметріей и съ такимъ же противуположнымъ дѣйствіемъ на плоскость поляризациіи свѣта. Правая соль совершенно идентична съ правой виннокаменокислой солью. Я до того счастливъ, что испы-

тываю первное потрясеніе, которое мѣшаетъ мнѣ снова приставить свой глазъ къ поляризационному аппарату! Пойдемте въ Люксенбургъ, я Вамъ все это объясню.»

Эти результаты возбудили въ высшей степени вниманіе Академіи наукъ, гдѣ сидѣли такія лица, какъ Араго, Біо, Дюма, Сенармонъ и Баларь. Можно сказать безъ всякаго преувеличенія, что Академія была крайне поражена. Однако многіе изъ членовъ не повѣрили сразу этому открытию. Біо, назначенный Академіей для проверки, началъ съ того, что потребовалъ отъ Пастера проверку каждого изъ пунктовъ его сообщенія. Въ это дѣло Біо внесъ свою обычную точность, къ которой у него примѣшивалась некоторая подозрительная недовѣрчивость.

«Онъ меня заставилъ прийти къ себѣ», — рассказывалъ Пастеръ въ одной изъ своихъ лекцій, — «передалъ мнѣ паравинно-каменную кислоту, которую онъ самъ внимательно изучилъ и которую онъ находилъ совершенно педѣятельной относительно поляризационаго свѣта. Не въ лабораторіи Нормальной Школы, а въ его присутствіи, въ его собственной кухнѣ я долженъ былъ приготовить двойную соль съ натромъ и аммониемъ, которыми онъ также хотѣлъ самъ меня снабдить. Жидкость оставлена для медленнаго выпариванія, и чрезъ 10 дней, когда уже собралось около 30 или 40 граммъ кристалловъ, онъ меня пригласилъ въ Коллежъ де Франсъ для того, чтобы собирать выкисталлизовавшееся и извлечь изъ него кристаллы обоихъ сортовъ, — которые, — прибавилъ онъ, — вы будете класть: одни вправо отъ меня, а другіе влѣво; предложилъ мнѣ, чтобы я вновь подтвердилъ, увѣренъ ли я, что кристаллы, лежащіе направо, дадутъ отклоненіе вправо, а другіе дадутъ отклоненіе влѣво. Когда подтвержденіе было мною сдѣлано, онъ сказалъ, что обѣ остальномъ онъ самъ позаботится. Біо приготовилъ соотвѣтственные растворы, и въ то время, когда онъ ихъ поставилъ предъ поляризационнымъ аппаратомъ для изслѣдованія, онъ меня опять пригласилъ войти въ его кабинетъ. Онъ сначала поставилъ предъ аппаратомъ растворъ соли, болѣе его интересовавшей, т. е. тотъ растворъ, который долженъ быть отклонить

плоскость поляризациі влѣво. Не принявши никакихъ особенныхъ предосторожностей, а простымъ сравненіемъ цвѣта двухъ изображеній, полученныхъ въ анализаторѣ, онъ увидѣлъ сильное отклоненіе плоскости поляризациі влѣво. Знаменитый старецъ, крайне взволнованный, взялъ меня тогда за руки и сказалъ: «Мое дорогое дитя! Всю свою жизнь я до такой степени любилъ науку, что это открытие заставляетъ усиленно биться мое сердце.»

Волненіе Біо было тѣмъ болѣе сильно, что онъ первый открылъ поляризaciю въ химическихъ соединенiяхъ, и въ теченіи болѣе 30 лѣтъ онъ неоднократно заявлялъ, что изученіе дѣйствiя химическихъ соединенiй на вращательную поляризaciю будетъ, можетъ быть, вѣрнѣйшимъ средствомъ, чтобы проникнуть въ тайну строенiя тѣлъ. Принимаю съ уваженiemъ его совѣты, ими, однако, почти никто не воспользовался. И вдругъ, къ нѣсколько огорченному старику является молодой человѣкъ двадцати пяти лѣтъ, который съ первой же своей работы становится совершенно самостоятельнымъ, разсѣваетъ туманъ, произведенный удивительнымъ сообщенiemъ нѣмецкаго ученаго, и создаетъ новую главу въ кристаллографической химiї. Составъ и природа паравиннокаменной кислоты сдѣлались ясными; новое вещество, лѣвая виннокаменная кислота, съ совершенно неожиданными свойствами, была открыта; физика и молекулярная химiя обогатились новыми и крайне цѣнными фактами и теорiями.

Первая забота Пастера, послѣ того какъ онъ открылъ лѣвую виннокаменную кислоту и строенiе паравиннокаменной кислоты, состояла въ томъ, чтобы тщательно сравнить свойства новой лѣвой виннокаменной кислоты съ правой, причемъ онъ старался опредѣлить экспериментальнымъ путемъ влiянiе, какое имѣетъ внутреннее расположение атомовъ упомянутыхъ двухъ кислотъ на эти свойства. Хотя бы и не удалось точно уловить очертанiе этого расположения, тѣмъ не менѣе несомнѣнно было-бы, что они состоятъ изъ тѣхъ же элементарныхъ частицъ, что, кромѣ того, это расположение должно быть диссимметричнымъ и что, наконецъ, диссимметрия расположения атомовъ въ обѣихъ кислотахъ должна быть одинакова, но въ обратномъ направ-

лени. Если совокупность атомовъ правой виннокаменной кислоты должна представить наружную форму неправильной пирамиды, то въ лѣвой эта совокупность необходимо должна представлять форму пирамиды, тоже неправильной, но въ обратномъ направлении.

II.

Назначенный въ Страсбургъ адъюнктомъ-профессоромъ химіи, Пастеръ продолжалъ также страстно заниматься своими прежними интересными изслѣдованіями. Оторвать его на-время отъ этихъ работъ могло только такое событие, какъ намѣреніе жениться на Мари Лоранъ, дочери ректора Академіи. Молва прибавляетъ, что въ самый день свадьбы его пошли искать въ лабораторію, чтобы напомнить ему, что въ этотъ именно день онъ женится. Однако, хотя Пастеръ и походилъ своей разсѣянностью на Лафонтена, онъ по отношению къ женѣ до такой степени отличался отъ Лафонтена, что Г-жа Пастеръ снисходительно улыбалась, когда ей напоминали о такой забывчивости ея мужа.

Возвратимся, однако, къ его научнымъ работамъ. Пастеръ послѣдовательно соединялъ съ каждой изъ этихъ двухъ кислотъ, при одинаковыхъ условіяхъ по отношенію къ всѣму, температурѣ и количеству раствора, всѣ химическія тѣла, дающія съ ними соединенія. Такимъ образомъ, онъ получилъ соотвѣтственные соли правой и лѣвой виннокаменной кислоты съ калиемъ, натромъ, аммониемъ, известью и всѣми, такъ называемыми, окислами. Онъ обращалъ особенное вниманіе на соединенія,— а такихъ было не мало,— которыхъ осѣдали изъ его растворовъ въ формѣ кристалловъ, ясно опредѣленныхъ. Не останавливалась на подробностяхъ его долгихъ и терпѣливыхъ изслѣдованій, скажемъ только, что Пастеръ узналъ, что все, что можно сдѣлать съ одной изъ этихъ кислотъ, то же самое можно повторить и съ другой, поставленной въ точно такія же условія, и что полученные продукты удерживаютъ постоянно одинаковыя свойства, съ тѣмъ только различіемъ, описаннымъ уже выше, что у однихъ плоскость поляризациіи отклоняется вправо, а у

другихъ влѣво, и что формы кристалловъ солей лѣвой кислоты, сходныя во всѣхъ мелочахъ съ формами правой, не могутъ, однако, съ ними совмѣщаться. Въ другихъ же своихъ свойствахъ, физическихъ и химическихъ, онъ совершенно тождественны. Растворимость, простая рефракція растворовъ, двойная рефракція кристалловъ, вліяніе теплоты на разложеніе этихъ солей и т. д. — всѣ эти свойства совершенно сходны въ обоихъ рядахъ тѣль.

Академія наукъ, признавая, хотя и сдержанно, всю важность, которую она придавала этимъ сообщеніямъ, захотѣла вторично провѣрить эти новыя изслѣдованія. Біо былъ опять назначенъ докладчикомъ. Пастеръ привезъ изъ Страсбурга изящно приготовленные образцы великолѣпныхъ кристалловъ обоихъ сортовъ тартратовъ, правыхъ и лѣвыхъ, съ точными этикетками. Около каждого изъ этихъ образцовъ, помѣщавшихся цѣликомъ на одной черной дощечкѣ, находилась мѣдная подставка, которая поддерживала слѣпки изъ простой глины, изображавшіе форму кристалла, помѣщавшагося въ соотвѣтственномъ бокалѣ. Для того, чтобы удобно было демонстрировать ихъ на разстояніи, Пастеръ нарисовалъ еще всѣ формы на большомъ картонѣ изъ черной бумаги. Границы плоскостей кристалловъ обозначались узенькими полосками белой бумаги.

Біо рѣшилъ доставить въ Академію эти предметы, приспособленные для демонстраціи. Утромъ того дня, когда онъ долженъ былъ читать свой докладъ, онъ нѣсколько часовъ бесѣдовалъ съ Пастеромъ. Біо до такой степени радовался, его возбужденное состояніе было до такой степени сильно, что, Г-жа Біо со свойственной всѣмъ женамъ ученыхъ заботливостью о своихъ мужьяхъ, подошла къ Пастеру и сказала:

«Прошу васъ, перемѣните предметъ разговора. Не отвѣчайте ему на то, что онъ вамъ скажетъ о вашихъ работахъ. Онъ заболѣтъ отъ всего этого: онъ не живетъ съ тѣхъ поръ, какъ вы сдѣлали эти прекрасныя открытія!»

Члены Академіи вполнѣ раздѣляли энтузіазмъ Біо. Араго предложилъ напечатать это сообщеніе въ сборникѣ мемуаровъ Академіи. Это была рѣдкая почесть. Члены Академіи, почти

всѣ почтенные старцы, любовались на склонѣ своей ученой дѣятельности первыми лучами восходящей зари будущей славы.

— «Мой юный другъ, — сказалъ вскорѣ послѣ этого Біо Пастеру, представляя его Мичерлиху, — Вы можете гордиться тѣмъ, что Вамъ удалось сдѣлать великое открытие, найдя то, что ускользнуло отъ вниманія такого человѣка, какъ Мичерлихъ!»

— «Я, — отвѣтилъ Мичерлихъ, обращаясь къ Пастеру съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ досады, — такъ осторожно и тщательно изучалъ во всѣхъ подробностяхъ эти двѣ соли, бывшія предметомъ моего сообщенія Академіи, что только потому Вы могли замѣтить то, что отъ меня ускользнуло, что Вы, вѣроятно, руководствовались какой-нибудь предвзятой мыслью.»

Мичерлихъ былъ дѣйствительно правъ, и эту предвзятую мысль Пастеръ могъ бы формулировать слѣдующимъ образомъ: диссимметрія во внутреннемъ расположениіи молекулъ какого-нибудь химического вещества должна непремѣнно выразиться и въ наружныхъ свойствахъ этого тѣла, по скольку они способны выразить эту диссимметрію.

Если это теоретическое положеніе вѣрно, то Пастеръ долженъ былъ бы открыть во всѣхъ тѣлахъ, въ которыхъ Біо открылъ отклоненіе плоскости поляризациіи, соответственную диссимметрію въ кристаллахъ, которая выражалась бы тѣмъ, что кристаллы не совмѣщаются съ своимъ зеркальнымъ изображеніемъ. Дальнѣйшія изслѣдованія, дѣйствительно, во многомъ оправдали эти предположенія. Вещества, отклоняющія плоскость поляризациіи свѣта въ жицкомъ видѣ или въ растворахъ, представляли, по изслѣдованіямъ Пастера, часто форму диссимметричныхъ кристалловъ; но нѣкоторыя вещества осаждались въ видѣ кристалловъ, не имѣвшихъ никакихъ слѣдовъ диссимметріи. Это, однако, не очень смутило Пастера; напротивъ, для него это представляло случай доказать, что разъ теорія вѣрина и доказана, то нечего останавливаться, не вникая, передъ тѣмъ, что имѣеть видъ возраженія. «Не представляетъ-ли, — спрашивалъ себя Пастеръ, — это отсутствіе диссимметріи формъ въ тѣлахъ, способныхъ дѣйствовать вращательно на поляризационную плоскость, не представляетъ-ли это слу-

чайшаго явленія и не удастся ли, при измѣненіи условій кристаллизациі, вызвать эту диссимметрію?»

Для того, чтобы видоизмѣнить форму кристалловъ въ тѣлахъ, не представляющихъ при обыкновенныхъ условіяхъ диссиметріи, Пастеръ воспользовался методомъ, очень часто испытаннымъ, хотя сущность его не была объяснена, а результаты не всегда можно было предвидѣть. А именно, подражая Ромэ де Лиль, Леблану, Беданту, Пастеръ видоизмѣнялъ природу растворяющихъ жидкостей: то онъ вводилъ въ эту жидкость избытокъ кислоты или щелочи, то онъ прибавлялъ къ жидкостямъ постороннія вещества, не способныя химически дѣйствовать на изслѣдуемыя тѣла; иногда онъ употреблялъ даже нечистый маточный растворъ. Каждый разъ ему удавалось такимъ образомъ получить новые плоскости, и каждый разъ эти новые плоскости обнаруживали тотъ родъ диссиметріи, который можно было предвидѣть по характеру оптическаго отклоненія. Хотя онъ долженъ былъ ограничиваться изслѣдованіемъ только такихъ веществъ, которые легко кристаллизовались и давали ясныя формы, такъ какъ только такія годились для испытанія, тѣмъ не менѣе результаты опытовъ до такой степени согласовались съ теоретическими предположеніями, что не могло быть сомнѣнія въ необходимости существующемъ соотношеніи между диссиметріей формъ и способностью отклоненія поляризационаго свѣта.

Послѣ этихъ изслѣдованій Пастеръ пришелъ къ совершенно особенному заключенію, заслуживающему серьезнаго размышленія, о различіи, существующемъ между разнаго рода минералами и искусственными продуктами, съ одной стороны, и естественными органическими продуктами, которые можно извлечь изъ растеній и животныхъ, съ другой стороны. Всѣ минералы и искусственные продукты, скажемъ для краткости, всѣ продукты мёртвой природы совмѣщаются съ своимъ зеркальнымъ изображеніемъ, следовательно, не диссиметричны. Напротивъ, продукты растеній и животныхъ, однимъ словомъ, продукты, образующіеся подъ влияниемъ жизни, не совмѣщаются съ своимъ зеркальнымъ изображеніемъ, т. е. диссиметричны въ расположениіи атомовъ, такъ что эта диссиметрія выражается наружно способностью отклон-

пенія плоскості поляризації. Існіє і єсть ісключення, то вони більше кажущіся, чимъ дѣйствительныя. Пастеръ самъ указавъ на нѣкоторыя изъ нихъ, показавъ при этомъ, какъ легко себѣ вияснити нѣкоторыми пріемами, что всякий слѣдъ диссиметрії исчезъ бы, если подвергать разложенію продукти, которые им'ютьъ, какъ напр. горный хрусталь, наружную диссиметрію.

Такое же кажущееся противорѣчие этому закону различія между искусственными продуктами и между продуктами растительной и животной жизни мы находимъ въ фактѣ существованія въ живыхъ организмахъ такихъ продуктовъ, какъ щавелевая кислота, фумаровая, мочевина, мочевая кислота, креатинъ и т. п. Всѣ эти названные продукты дѣйствительно не им'ють ни свойства отклонять плоскость поляризації, ни диссиметрії въ формахъ своихъ кристалловъ. Но надо замѣтить, что эти продукты ничто иное, какъ результатъ второстепенныхъ процессовъ. Ихъ образование, очевидно, управляется тѣмъ же закономъ, который господствуетъ при образованіи искусственныхъ лабораторныхъ продуктовъ, или продуктовъ минерального царства въ собственномъ смыслѣ слова. Это скорѣе продукты выдѣленій живыхъ существъ, нежели главныя составныя части растеній и животныхъ. Если-же, напротивъ, ізслѣдоватъ первичные составные элементы растеній и животныхъ, тѣ составные элементы, о которыхъ можно съ полнымъ правомъ сказать, что они появились только подъ вліяніемъ народившайся жизни, такіе, какъ клѣтчатка, крахмаль, альбуминъ, фібринъ и т. д., то въ нихъ находятъ способность отклонять плоскость поляризації — признакъ, совершенно достаточный и характерный для установленія ихъ диссиметричности, даже въ такихъ случаяхъ, гдѣ кристаллизація не возможна и, слѣдовательно, отсутствуетъ форма, въ которой выражалась бы ихъ внутренняя диссиметрія.

Можно, значитъ, съ полнымъ правомъ сказать, что продукты минерального царства и искусственные продукты не представляютъ до сихъ поръ примѣровъ молекулярной диссиметрії. Съ такимъ же правомъ можно утверждать, что вещества, им'ющія наибольшее вліяніе въ жизненномъ процессѣ растеній и животныхъ, вещества, которые находятся и дѣйствуютъ въ

зернѣ или въ яйцѣ въ моментъ зарожденія всякаго рода растенія и животнаго, всѣ представляютъ молекулярную диссиметрію.

Возможно-ли указать на болѣе глубокое различіе между продуктами органическаго міра и продуктами минеральнаго міра, какъ эта диссиметрія у однихъ и отсутствіе ея у другихъ? Не удивительно-ли, что ни одинъ изъ тысячи лабораторныхъ продуктовъ, число которыхъ ежедневно увеличивается, не обладаетъ ни способностью отклонять плоскость поляризациіи, ни диссиметріей формъ? Можно, безъ сомнѣнія, получить новые соединенія естественныхъ диссиметричныхъ веществъ, наприм. крахмала, камеди, сахара, виннокаменной кислоты, яблочной, хинина, стрихина, терпентина и т. п., и эти соединенія, хотя и искусственные, останутся диссиметричными, но вѣдь, очевидно, что всѣ эти новые продукты унаследовали первоначальную диссиметрію отъ тѣхъ веществъ, отъ которыхъ они произошли. Гдѣ же, однако, химическое дѣйствіе оказывается болѣе глубокимъ, тамъ исчезаетъ всякая диссиметрія, и она ужъ никогда не появляется въ дальнѣйшихъ послѣдовательныхъ продуктахъ.

Какія же могутъ быть причины такого большаго различія? Пастеръ часто высказывалъ убѣжденіе, что это различіе связано съ тѣмъ обстоятельствомъ, что молекулярные силы, играющія роль въ минеральномъ царствѣ и ежедневно въ лабораторіяхъ, принадлежатъ къ силамъ симметричнымъ; силы-же, находящіяся и дѣйствующія въ моментъ соединеній въ растительной жизни — когда зерно проростаетъ, когда яйцо развивается, или когда, подъ вліяніемъ солнца, зеленое вещество листьевъ разлагаетъ углекислоту воздуха и утилизируетъ крайне разнообразно углеродъ этой кислоты, водородъ воды и кислородъ изъ обоихъ продуктовъ — эти силы принадлежатъ къ разряду диссиметричныхъ и, по всей вѣроятности, находятся въ зависимости отъ какихъ-нибудь великихъ космическихъ явлений диссиметріи нашей вселенной. Высказавъ однажды это мнѣніе предъ Академіей наукъ, Пастеръ выразился такъ:

«Вселенная есть совокупность диссиметрій. Я склоненъ думать, что жизнь въ томъ видѣ*, въ какомъ она у насъ про-

является, должна быть функцией диссимметрии вселенной или последствием этой функции. Миръ диссимметриченъ, потому что если представить себѣ предъ зеркаломъ совокупность тѣль, составляющихъ солнечную систему, движущихся своимъ особымъ движениемъ, то получится изображеніе, не совмѣщающееся съ предметами. Даже самое движеніе солнечного свѣта диссимметрично. Никогда лучъ свѣта не падаетъ по прямой линіи (и въ состояніи покоя) на листъ, гдѣ растительная жизнь созидастъ органическую матерію. Земной магнетизмъ, противуположность, существующая между сѣвернымъ и южнымъ полюсами магнита, а также различие положительнаго и отрицательнаго электричества — вытекаютъ изъ дѣйствій и движений диссиметрическихъ силъ.»

Увлеченный работами, составляющими главный предметъ этой книги, Пастеръ бросилъ физику и молекулярную химію, которыми онъ вначалѣ занимался. Тогда же всѣ его мысли были направлены на отысканіе средствъ, которыя сдѣлали-бы очевидными влияніе причинъ и явлений диссимметрии. Въ Страсбургѣ онъ устроилъ очень сильные магниты, для того чтобы сравнивать дѣйствіе ихъ полюсовъ и для того чтобы попробовать, не удастся ли при ихъ помощи произвести диссимметрію въ формахъ кристалловъ. Въ Лилѣ, куда онъ былъ назначенъ деканомъ факультета естественныхъ наукъ въ 1854 г., онъ устроилъ часовой механизмъ, который долженъ былъ приводить растеніе въ безпрерывное вращательное движеніе прежде въ одну, потомъ въ другую сторону. «Все это было довольно грубо», — сказалъ онъ мнѣ однажды, — «но я кромѣ того рѣшился для влиянія на ростъ нѣкоторыхъ растеній повернуть помощью гелостата и рефлектора движеніе солнечныхъ лучей, падающихъ на растеніе съ момента появленія его первыхъ листьевъ, а это уже имѣло гораздо большую будущность.» Онъ никогда не говорилъ объ этихъ опытахъ, потому что онъ не имѣлъ времени довести ихъ до задуманнаго имъ предѣла; но даже теперь еще онъ убѣждень, что никогда не удастся перейти чрезъ границу, которая существуетъ между двумя царствами природы, минеральнымъ и органическимъ, и которая выра-

жается въ невозможности произвести химическимъ путемъ органическія диссимметричныя вещества, — не удастся до тѣхъ поръ, пока не введутъ въ производство этихъ веществъ вліяніе диссимметрическихъ силъ. Успѣхи на этомъ пути дали-бы намъ, вѣроятно, доступъ къ новому миру веществъ, а также къ органическимъ превращеніямъ. Такъ какъ удалось найти обратную форму правой виннокаменной кислоты, то можно надѣяться, что мы современемъ получимъ органическіе первичные элементы, противоположные тѣмъ, которые намъ извѣстны. Кто можетъ предвидѣть, что случилось бы съ видами растеній и животныхъ, если-бы удалось замѣнить въ живыхъ клѣткахъ клѣтчатку, блокъ и ихъ производные — противоположными имъ веществами? Однако это дѣло не легкое, и Пастеръ меньше кого-либо сомнѣвался въ трудности этой задачи.

«Когда удастся, — думалъ онъ, — ввести какимъ-бы то ни было способомъ въ органическіе виды эти новые первичные элементы, противоположные тѣмъ, которые существуютъ въ живыхъ организмахъ, большая трудность еще будетъ состоять въ томъ, чтобы преодолѣть заключающееся въ зародышѣ каждого организма жизненное начало. Въ этомъ зародышѣ, надо опасаться, всегда проявится та диссиметрія, которая заключается въ его непосредственныхъ элементахъ. О! Если бы самопроизвольное зараженіе было бы возможно, если бы удалось изъ неорганической матеріи сдѣлать живую клѣтку, насколько бы тогда задача эта сдѣлалась болѣе доступной!... Какъ-бы то ни было, а надо стараться всѣми доступными средствами вызвать молекулярную диссиметрію, приводя въ дѣйствіе силы, имѣющія диссиметрическое свойство.

«Надо было-бы», — повторилъ мнѣ Пастеръ въ тотъ же день, когда начавши съ работы Мичерлиха, онъ сдѣлалъ какъ-бы обзоръ всѣмъ этимъ изслѣдованіямъ, — «надо-бы пустить въ ходъ силы соленоида или спирали. Увлеченный теперь работами, слишкомъ достаточными для того, чтобы поглотить весь остатокъ моихъ силъ и моего вниманія, я не имѣль больше времени, чтобы заниматься этимъ; но какія работы можно еще сдѣлать въ этомъ направленіи идей и какой широкій путь от-

крылся бы молодымъ людямъ, которые обладали-бы духомъ изобрѣтательности, такъ часто дающейся упорному труду.»

Эта полная противоположность между искусственными минеральными продуктами и продуктами растительными и животными считалась Пастеромъ твердо установленной истиной и онъ находилъ часто случаи выражать это свое убѣжденіе при рѣшительныхъ обстоятельствахъ. Однажды Десэнъ, очень опытный химикъ, сдѣлавшій позже членомъ-корреспондентомъ Академіи наукъ, заявилъ, что ему удалось превратить фумаровую и маллениновую кислоты въ аспарагиновую кислоту. Пастеръ, изучавшій эти кислоты немного раньше, констатировалъ, что первыя двѣ кислоты не имѣли никакой молекулярной диссиметріи, т. е. онъ были лишены всякой оптической активности, такъ что ихъ растворы не отклоняли плоскости поляризованнаго свѣта. Наоборотъ, аспарагиновая кислота представлялась ему молекулярио-диссимметричной, какъ и самъ аспарагинъ. Если наблюденіе Десэня было вѣрно, то вышло-бы, что тѣла неактивныя относительно поляризованнаго свѣта могли быть превращаемы лабораторнымъ путемъ въ тѣла активныя, диссиметричныя. Демаркаціонная линія, столь твердо установленная, была-бы порвана. Пастеръ, знаяшій по примѣру Мичерлиха, до какой степени самые опытные наблюдатели могутъ просмотрѣть мелкія различія, если у нихъ нѣтъ предвзятой идеи, заставляющей ихъ быть особенно внимательными, поспѣшилъ усомниться въ совершенной точности фактovъ, заявленныхъ Десенемъ. Но не довольствуясь теоретическимъ сомнѣніемъ, онъ пожелалъ узнать непосредственнымъ наблюденіемъ, какого мнѣнія держаться въ оцѣнкѣ этого открытия. Изъ Страсбурга опять поѣхалъ въ Вандомъ, гдѣ жилъ Десэнъ. Послѣдній поспѣшилъ передать Пастеру небольшое количество аспарагиновой кислоты, приготовленной изъ фумаровой и маллениновой. Возвратившись въ свою лабораторію, Пастеръ не медля замѣтилъ, что, не смотря на большое сходство новой аспарагиновой кислоты Десэня съ кислотой, сдѣланной изъ аспарагина, эти кислоты разнятся, однако, между собою полнымъ отсутствиемъ молекулярной диссиметріи въ новой кислотѣ.

По случаю другихъ открытій этого рода, заявленныхъ не только во Франціи, но и въ Италіи и Англіи — главнымъ образомъ обь образованіи будто бы виноградной виннокаменной кислоты помошью не активной, искусственной янтарной кислоты, о чёмъ сообщили Перкинъ и Дюпра, — Пастеръ указалъ съ почти абсолютною точностью, что существуютъ упущенныя изъ виду мелкія отличительные особенности въ этихъ новыхъ тѣлахъ, которыхъ онъ, однако, не имѣлъ предъ глазами, и которыхъ были изучены очень тщательно весьма талантливыми наблюдателями.

При помощи этихъ фактическихъ указаний и дедукцій изъ теоретическихъ взглядовъ, Пастеръ открылъ удивительную связь между своими предыдущими изслѣдованіями по химіи и кристаллографической физикѣ и новыми, совершенно неожиданными изслѣдованіями по физіологической химіи. Эта связь, подобно Ариандовой нити, должна была его привести къ новымъ великимъ открытиямъ въ медицинской біологии, такъ что Шеврель имѣлъ право сказать нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Академіи наукъ:

«Только, когда сначала разберешь всѣ работы Пастера въ хронологическомъ порядке, а потомъ разсмотришь ихъ въ цѣломъ, можно оцѣнить всю строгую точность сужденій этого ученаго, выраженную въ заключеніяхъ, которыя онъ выводить, и прозорливость проницательного ума, спльнааго уже открытыми имъ истинами и стремящагося къ установлению новыхъ истинъ.

III.

Пастеръ установилъ, значитъ, что тѣла, надѣленныя внутренней диссимметріей, вносятъ ее въ различной степени во всѣ свои соединенія. Когда эти вещества, природа которыхъ была разъяснена открытиемъ правой и лѣвой виннокаменной кислоты, химически совершенно идентичныхъ, отличающихся только противоположной формой кристалловъ и способомъ дѣйствія на поляризованный свѣтъ, — когда эти вещества вступаютъ въ соединеніе съ другими тѣлами, оптически и кристаллографически недѣятельными, то все должно оставаться химически идентичнымъ въ новыхъ условіяхъ. Въ самомъ дѣлѣ, они оп-

тически и кристаллографически подобны. Недѣятельный элементъ ничего не прибавляетъ и ничего не убавляетъ въ диссимметрическихъ свойствахъ активныхъ веществъ.

Вскорѣ Пастеръ прибавилъ къ этимъ интереснымъ изслѣдованіямъ новую главу. «Если ввести въ эти соединенія, — думалъ онъ, — вещество, обладающее само по себѣ специфическими свойствами диссимметріи, то надо, очевидно, ожидать, что это вещество сохранитъ, вступая туда, свои свойства. Слѣдовательно, это активное вещество прибавить кое-что къ свойствамъ молекулярной группы, дѣйствующей подобно ей, или убавить кое-что изъ свойствъ группы, дѣйствующей въ противоположномъ направленіи. Дѣйствія, происходящія отъ этихъ причинъ, то согласныхъ, то противоположныхъ, перестанутъ быть одинаковыми въ абсолютномъ количествѣ. И если въ этомъ состоитъ необходимое условіе сходства въ молекулярномъ строеніи, то это сходство перестанетъ существовать, а вмѣстѣ съ отсутствиемъ сходства должны будутъ явиться всѣ различія физическихъ и химическихъ особенностей, которые составляютъ наружное проявленіе молекулярного строенія.»

Факты совершенно подтвердили эти логическія заключенія. Послѣ того какъ Пастеръ ввелъ диссиметрію, какъ факторъ, измѣняющій химическое сродство, онъ получилъ явное и новое доказательство значенія диссиметріи въ явленіяхъ жизни.

Уже давно было известно, по наблюденію одного нѣмецкаго фабриканта химическихъ продуктовъ, что нечистая фабричная виннокаменноокислая извѣсть, загрязненная органическими веществами и оставленная подъ водой лѣтомъ, можетъ бродить и давать различные продукты. Пастеръ заставилъ бродить обыкновенную правую виннокаменноокислую соль аммонія слѣдующимъ образомъ: онъ бралъ совершенно чистую кристаллизованную соль, растворялъ ее, прибавляя къ жидкости бѣлковыя вещества, — приблизительно одинъ граммъ на сто граммовъ соли. Жидкость, поставленная въ теплое мѣсто, начинала бродить. Во время броженія жидкая масса, сначала прозрачная, мало по малу мутнѣла вслѣдствіе появленія маленькаго организованнаго существа, игравшаго роль фермента. Этотъ способъ броженія

Пастеръ употребилъ и для паравинокаменноокислого аммонія. Эта соль также бродила, оставляя осадокъ того же самаго бродильного маленькаго организма. Все заставляло думать, что въ данномъ случаѣ мы имѣемъ такие же процессы, какъ и съ правой виннокаменноокислой солью. Но Пастеръ, вздумавъ прослѣдить ходъ этого броженія помошью поляризационнаго аппарата, замѣтилъ глубокое различіе между этими двумя броженіями. Въ случаѣ съ паравинокаменноокислой солью жидкость, вначалѣ неактивная, мало по малу получала способность замѣтно отклонять влѣво плоскость поляризациі; эта способность прогрессивно увеличивалась, достигла своего максимума,— и тогда броженіе пріостановилось. Не осталось больше правой кислоты въ этой жидкости, которая, выпаренная и потомъ смѣшанная съ одинаковымъ объемомъ алкоголя, дала непосредственно прекрасные кристаллы лѣвой виннокаменноокислой соли аммонія.

Новый фактъ громадной важности былъ отнынѣ установленъ: молекулярная диссиметрія, свойственная органической матеріи, вступила въ разрядъ физиологическихъ явлений и вступила туда въ качествѣ видоизмѣнителя химического сродства. Родъ диссиметріи, свойственной расположению частицъ лѣвой виннокаменной кислоты, былъ, безъ сомнѣнія, единственной и исключительной причиной отличія этой кислоты отъ правой относительно броженія, произведенаго ферментомъ, имѣвшимъ всѣ признаки микроскопическаго гриба. Изъ дальнѣйшаго изложенія видно будетъ, что организованные ферменты почти всегда суть маленькия микроскопическія растенія, содержащія въ себѣ клѣтчатку, бѣлокъ и т. п., вещества, тождественные съ веществами, взятыми изъ высшихъ растеній, и одинаково диссиметричныя. Понятно, однако, что для питанія фермента и образования его составныхъ частей химические процессы могутъ гораздо легче происходить съ одной изъ этихъ виннокаменныхъ кислотъ, чѣмъ съ противоположной ей.

Противоположность свойствъ обѣихъ виннокаменныхъ кислотъ, правой и лѣвой, съ момента вмѣшательства условій жизни и питания организованнаго существа, проявляется еще болѣе очевидно въ крайне интересномъ опыте, который сдѣлалъ Пастеръ.

Онъ первый узналъ, что плѣсень можетъ жить и размножаться на почвѣ чисто минеральной, состоящей, напримѣръ, изъ фосфорокислыхъ солей кали, магнезіи и какой нибудь амміачной соли органической кислоты. Для такого развитія растительной жизни онъ взялъ зерна зеленаго кистевика (*penicillium glaucum*), маленькой плѣсени, повсюду встрѣчающейся, — и прибавилъ въ видѣ углеродистой пищи только паравинокаменную кислоту. Черезъ нѣкоторое время появилась лѣвая виннокаменная кислота. Однако известно, что лѣвая виннокаменная кислота можетъ появиться изъ паравинокаменной, только при условіи разложенія или исчезновенія совершенно одинакового количества правой виннокаменной кислоты. Очевидно, что углеродъ правой кислоты доставлялъ маленькому растенію ту углеродистую пищу, безъ которой оно не можетъ обойтись при созиданіи своихъ составныхъ частей и всей своей органической основы. Если бы маленькая микроскопическая зерна *penicillium'a*, положенные на эту почву, не состояли бы изъ диссимметрическихъ элементовъ, каковы всѣ растительные элементы, то его развитіе, жизнь и оплодотвореніе одинаково приспособились бы и къ лѣвой виннокаменной кислотѣ, какъ къ правой. Фактъ, что лѣвая виннокаменная кислота менѣе усваивается, чѣмъ противоположная ей правая, можетъ, очевидно, единственно зависѣть отъ той или другой диссимметріи веществъ, составляющихъ маленькое растеніе.

Такимъ образомъ, въ физиологической наблюденія и изслѣдованія въ первый разъ былъ введенъ фактъ вліянія молекулярной диссиметріи естественныхъ органическихъ продуктовъ.

Пастеръ говоритъ постоянно съ энтузіазмомъ о великой будущности, предстоящей изслѣдованіямъ, которыхъ будутъ иметь предметомъ вышесказанное вліяніе, потому что молекулярная диссиметрія составляетъ теперь единственную демаркаціонную линію, существующую между химіей неорганической природы и химіей органической, живой природы.

Б р о ж е н і я.

Увидя, что путь, по которому онъ слѣдуетъ, поворачиваетъ неожиданно въ сторону, Пастеръ на мгновеніе пріостановился. Пойдетъ ли онъ по этому новому пути? Его сюда толкало научное чутье, но благоразуміе и осторожность, составляющія главныя черты его характера, постоянно удерживали его, какъ только надо было принять рѣшеніе, необходимость котораго ему не была вполнѣ выяснена. Не благоразумнѣе ли было оставаться, какъ то совѣтовалъ Біо, въ области физики и молекулярной химії? Тутъ дорога была гладкая, успѣхъ на каждомъ шагу обеспеченъ. Но случай покончилъ со всѣми его колебаніями.

Онъ былъ назначенъ, когда ему минуло тридцать два года, деканомъ факультета естественныхъ наукъ въ Ліль. Въ департаментѣ Норъ, одной изъ главныхъ отраслей индустріи было производство спирта изъ свекловицы и зерноваго хлѣба. Пастеръ рѣшилъ посвятить часть лекцій вопросу о броженіи. Онъ полагалъ, что если онъ принесетъ практическую пользу своимъ слушателямъ, то этимъ привлечетъ вниманіе и общія симпатіи къ новому факультету. Молодой деканъ остался очень доволенъ своею идею, а какъ ученый радовался ей еще больше. Его не оставляли размышленія, внушенные ему странностью замѣченного имъ явленія, которое обнаруживалось при дѣйствіи молекулярной диссимметріи двухъ кислотъ виннокаменныхъ на одно микроскопическое существо. Онъ предвидѣлъ, что эта, до сихъ поръ темная сущность броженія получитъ полное разясненіе. Онъ сказалъ себѣ, что не возможно допустить, чтобы активная роль этого безконечно малаго существа была единичнымъ фактъ, по что за этимъ явленіемъ долженъ скрываться великий общий законъ.

I.

Все, что жило, должно умереть, и все, что мертвое, должно распасться, раствориться или превратиться въ газообразное состояніе. Необходимо, чтобы элементы, которые составляютъ

субстратъ жизни, получили возможность вступить въ новый кругъ жизни. Если бы дѣло происходило иначе, то матерія, изъ которой состоять организованныя существа, покрыла бы всю поверхность земли и непрерывность жизни нарушилась бы, благодаря все возрастающему истощенію необходимаго для ея построенія матеріала. Въ этой великой работѣ первое мѣсто занимаетъ одно замѣчательное явленіе — броженіе. Но это не больше, какъ слово, обозначающее тѣ внутреннія измѣненія, которые происходятъ во всякой организованной матеріи послѣ смерти — произвольно, безъ содѣйствія рукъ человѣческихъ.

Въ чёмъ-же кроются причины всѣхъ этихъ естественныхъ актовъ броженія, гниенія и тлѣнія? Гдѣ найти объясненіе, почему трупъ или упавшее растеніе исчезаютъ? Гдѣ найти причину кипѣнія винограднаго сока въ винодѣльномъ чанѣ, подыманія и закисанія тѣста, предоставленнаго самому себѣ, створаживанія молока, загниванія крови, превращенія собранной соломы въ навозъ, и растеній, закопанныхъ въ землю, въ черноземъ?

Объ этихъ таинственныхъ фактахъ составилось множество различныхъ мнѣній, прежде чѣмъ наука была въ состояніи приступить къ нимъ. Въ то время и въ моментъ, когда Пастеръ въ свою очередь началъ заниматься этимъ вопросомъ, безраздѣльно господствовала одна теорія, довольно устарѣвшая, которую нѣмецкій химикъ Либихъ подновилъ и связалъ со своимъ именемъ. «Ферменты, — говорилъ Либихъ, — это суть всѣ эти азотистыя вещества: альбуминъ, фибринъ, казеинъ.... или жидкости, содержащія ихъ: молоко, кровь, моча.... въ состояніи измѣненія, которое они испытываютъ при соприкосновеніи съ воздухомъ».

По этой системѣ кислородъ воздуха былъ первою причиной молекулярнаго сотрясенія азотистыхъ веществъ, отъ которыхъ движение постепенно сообщалось во внутрь бродящихъ тѣлъ и переводило ихъ въ новые продукты. Эти теоретическія разсужденія о роли кислорода воздуха имѣли свою точку опоры въ опытахъ, сдѣланныхъ въ началѣ настоящаго столѣтія Ге-Люсакомъ. Провѣряя опыты Аппера относительно

сохраненія животныхъ и растительныхъ веществъ, состоявшіе въ томъ, что вещества эти заключались въ герметически закрытыхъ сосудахъ и нагрѣвались до достаточно высокой температуры въ водяной банѣ, Ге-Люсакъ наблюдалъ, между прочимъ, что виноградный сокъ, сохранявшийся безъ измѣненія въ теченіи цѣлаго года, начиналъ бродить при одномъ только переливаніи его въ другой сосудъ, т. е. когда онъ приходилъ на одно лишь мгновеніе въ соприкосновеніе съ кислородомъ воздуха. Казалось, что кислородъ воздуха есть первый двигатель (*primum movens*) броженія.

Знаменитые химики Берцеліусъ и Мичерлихъ иначе смотрѣли на явленія броженія. Они ихъ включили въ рядъ темныхъ явленій, известныхъ подъ имѣнемъ явленій соприкосновенія. Ферментъ не отнимаетъ ничего у бродящаго вещества и не даетъ ему ничего. Это — альбуминоидное вещество, одаренное силою, именуемою каталитическою или силою присутствія.

Одно интересное наблюденіе было однако сдѣлано во Франціи Каньяръ-Латуромъ, а въ Германіи Шваномъ. Если придерживаться точно времени, то честь этого столь богатаго по послѣдствіямъ наблюденія принадлежитъ французскому физику. Одинъ изъ самыхъ употребительныхъ ферментовъ, также давно известныхъ, какъ закваска мучнаго тѣста или начинающее створаживаться молоко, — это тотъ осадокъ, который образуется въ чанахъ, содержащихъ бродящее пиво, и обыкновенно называемый пивными дрожжами. Каньяръ-Латуръ, провѣряя наблюденіе натуралиста Левенгека, видѣлъ, какъ эти состоящія изъ пузырковъ дрожжи размножались путемъ почкованія и спросилъ себя, не находится ли броженіе сахара въ соотношеніи съ этимъ актомъ клѣточнаго произростанія. Но такъ какъ при другаго рода броженіяхъ нельзя было замѣтить существованія подобнаго произростанія или вообще организованныхъ существъ, даже при самомъ тщательномъ ихъ розысканіи, то гипотеза Каньяръ-Латура о возможномъ соотношениі жизни дрожжей съ способностью сдѣлаться ферментомъ была оставлена, хотя обѣ этомъ выразили сожалѣніе пѣкоторые физиологи.

Такъ, напр., Дюма предполагалъ, что явленіе броженія должно находить себѣ объясненіе въ этомъ почкованіи клѣтокъ, въ этомъ необычайномъ произростаніи и жизни.

Повторяю однако, что такъ какъ въ другаго рода броженіяхъ ничего подобнаго не наблюдалось и они всѣ носили одинъ общий характеръ, требуя для своего проявленія присутствія органическаго вещества, начинающаго разлагаться, то гипотеза Каньяръ-Латура осталась простымъ инцидентомъ, по не получила значенія научнаго принципа.

«Не потому, — говорилъ Либихъ, увлекая за собою всеобщее мнѣніе, — дѣйствуютъ пивныя дрожжи, что онѣ организованы, а потому, что онѣ были въ соприкосновеніи съ воздухомъ. На сахаръ производятъ дѣйствіе мертвая часть дрожжей, — та, которая уже отжала и находится на пути къ разложенію».

Новые работы, обнародованныя по этому предмету, сходились въ томъ, что отвергали всякое влияніе организаціи и жизни на актъ броженія. Всѣ сочиненія, мемуары, преподаваніе съ кафедры — все было настроено благопріятно въ пользу теоретическихъ идей Либиха. Если нѣкоторые рѣдкіе наблюдатели и отмѣтили присутствіе въ извѣстнаго рода броженіяхъ живыхъ организованныхъ существъ, то оно, по ихъ мнѣнію, было лишь случайнымъ явленіемъ, которое вместо того, чтобы содѣйствовать броженію, мѣшало ему.

Пастеръ сталъ совершенно на иную точку зреінія, какъ только онъ началъ свою первую работу о молочномъ броженіи. Онъ узналъ, что при этомъ броженіи присутствуетъ и дѣйствуетъ живое организованное существо, служащее ему ферментомъ, подобно тому какъ пивныя дрожжи служатъ ферментомъ спиртовому броженію. Молочный ферментъ состоитъ изъ клѣтокъ, или скорѣе изъ маленькихъ членниковъ, перетянутыхъ на своей серединѣ, очень маленькихъ по величинѣ, не имѣющихъ болѣе $1/1000$ миллиметра въ диаметрѣ. Они размножаются путемъ дѣленія, т. е. маленький перетянутый членникъ дѣлится въ своей серединѣ, образовывая два маленькихъ шарика, которые, удлиняясь и перетягиваясь, въ свою очередь образовываютъ два новыхъ членника, каждый изъ послѣднихъ еще два другихъ и такъ далѣе.

Спрашивается, почему до Пастера никто этого не замѣтилъ? А потому, что химики всегда наблюдали продукты молочного броженія совмѣстно со сложными примѣсями, а именно, прибавляли къ молоку или сахару мѣль, желая сохранить нейтральность бродящаго матеріала, или прибавляли такія вещества, какъ казеинъ, клейковина или (кишечныя) перепонки. Всѣ эти вещества, рассматриваемыя подъ микроскопомъ, представляютъ такое бесконечное множество минеральныхъ и органическихъ зернышекъ, что съ ними легко было смѣшать элементы молочного броженія. Поэтому, когда Пастеръ хотѣлъ сдѣлать очевиднымъ присутствіе и жизнь фермента, то его первою заботою было замѣнить казеинъ и сродныя съ нимъ вещества растворимыми азотистыми тѣлами, которыхъ не препятствовали бы изслѣдованію подъ микроскопомъ всѣхъ живыхъ клѣточныхъ элементовъ.

«Бываютъ случаи, — говорилъ Пастеръ въ мемуарѣ, представленномъ Академіи наукъ въ 1857 г., — когда при молочномъ броженіи въ томъ видѣ, какъ оно производится химиками и промышленниками, можно замѣтить надъ осадкомъ мѣла или азотистаго вещества сѣрую массу, лежащую въ видѣ пояса на поверхности осадка. Если ее рассматривать подъ микроскопомъ, то она ничѣмъ не отличается отъ казеина или разложившейся клейковины, послужившихъ для развитія броженія, и ничто не указываетъ на то, чтобы это было особенное вещество, развившееся во время броженія. Оно, однако, играетъ здѣсь главную роль».

Чтобы отдѣлить это вещество и приготовить его въ чистомъ видѣ, Пастеръ вскипятилъ небольшое количество пивныхъ дрожжей съ 15 — 20 частями воды этихъ дрожжей, потомъ тщательно профильтровалъ эту жидкость. Въ ней онъ растворилъ сахаръ, въ количествѣ приблизительно 50 граммъ на литръ, и прибавилъ въ нее мѣлу. Взявъ тогда, при помощи тонкой трубочки, частичку сѣраго вещества, о которомъ мы прежде говорили, заимствуя ее изъ матеріала, находящагося въ хорошемъ молочномъ броженіи, онъ положилъ ее, въ качествѣ бродильного посѣва, въ прозрачную подсахаренную жидкость. На другой день обнаружилось живое и правиль-

ное брожение, жидкость мутилась, мяль исчезалъ — и можно было замѣтить осадокъ, который постоянно и прогрессивно увеличивался по мѣрѣ того, какъ исчезалъ мяль. Этотъ осадокъ и былъ молочнымъ ферментомъ.

Этотъ опытъ Пастеръ производилъ еще такимъ образомъ, что замѣнялъ воду пивныхъ дрожжей прозрачными отварами изъ пластическихъ азотистыхъ веществъ. Ферментъ постоянно обнаруживалъ тотъ-же видъ и то же размноженіе.

Эти результаты не удовлетворили однако Пастера. Въ предметѣ такой теоретической важности ему казалась необходимой большая точность. Развѣ приверженцы Либиха не могли бы утверждать, хотя, можетъ быть, и не безъ излишней придирчивости, но все таки съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ справедливости, что броженіе не обязано образованію и росту этого незначительного азотистаго осадка, но скорѣе азотистому веществу, которое растворялось въ тотъ моментъ, когда варились дрожжи, вошедшія въ составъ жидкости? Можно было до известной степени предполагать, что эти растворенные вещества, послѣ соприкосновенія съ кислородомъ воздуха, пришли въ молекулярное движеніе, которое сообщили бродящему матеріалу, а осадокъ мнимаго организованнаго фермента только случайность, одинъ изъ тѣхъ осадковъ, которые часто наблюдаются при измѣненіяхъ, претерпѣваемыхъ белковыми веществами.

Подобнымъ образомъ Либихъ объяснялъ наблюденіе Кањяръ-Латура и Швана относительно жизни пивныхъ дрожжей. Конечно, нельзя отвергать организацію пивныхъ дрожжей, ихъ размноженіе путемъ почкованія, но эти клѣтки всегда находятся въ сообществѣ другихъ клѣтокъ, уже умершихъ и находящихся на пути къ разложенію. Вотъ ихъ-то движеніе передается молекуламъ сахара, приводить ихъ въ сотрясеніе и въ состояніе броженія.

Аргументація Либиха находила еще большую поддержку во мнѣніи, раздѣлявшемся всѣми химиками, что клѣтки пивныхъ дрожжей разрушаются во время броженія и выдѣляютъ молочно-кислый амміакъ. Проверяя это мнѣніе, Пастеръ нашелъ, что амміакъ не только не образуется во время спиртоваго броженія,

но что онъ, если его нарочно прибавить, исчезаетъ, входя въ составъ новыхъ клѣтокъ дрожжей. Развѣ это не было доказательствомъ той великой силы, которая скрывалась въ организаціи фермента?

Мучимый, однако, мыслью, что, не смотря на эти факты, разсужденія Либиха могли найти еще нѣкоторую вѣру, Пастеръ всѣми силами старался добыть новыя доказательства, которыя могли бы убѣдить въ томъ, что теорія Либиха совершенно ложна. Онъ сдѣлалъ два капитальныхъ опыта: одинъ относительно пивныхъ или спиртныхъ дрожжей, другой относительно молочныхъ дрожжей или молочнаго фермента.

Онъ ввелъ въ чистый растворъ сахара небольшое количество одной кристаллизующейся амміачной соли, потомъ фосфорно-кислаго калія и магнезіи и посыпалъ въ этотъ растворъ невѣсомое, если можно такъ выразиться, количество клѣтокъ свѣжихъ дрожжей. При этихъ условіяхъ посыпанная клѣтки размножились и сахаръ забродилъ. Иначе говоря, азотъ амміака и углеродъ сахара, а также фосфоръ, калій и магнезія минеральныхъ солей вмѣстѣ соединились, чтобы образовать главныя химическія основы тѣхъ различныхъ матеріаловъ, которые входятъ въ составъ фермента. Этимъ простымъ, но однако доказательнымъ опытомъ сила организаціи фермента была отнынѣ доказана. Теорія соприкосновенія, теорія Берцеліуса, уже потеряла всякой смыслъ, такъ какъ въ этомъ опыте было очевидно, что бродящій матеріалъ доставлялъ ферменту одинъ изъ его существенныхъ элементовъ — углеродъ. Теорія Либиха, которая ссылалась на передаваемое движеніе, заимствованное отъ азотистаго албуминоиднаго вещества, также потеряла свое значеніе, такъ какъ это вещество было упразднено. Все дѣйствіе происходило между сахаромъ и зародышемъ фермента, который находилъ возможность жизни и развитія въ питательныхъ веществахъ, между которыми самымъ главнымъ былъ матеріалъ, способный къ броженію. Выяснилось, такимъ образомъ, что броженіе есть простое явленіе питания. Ферментъ, питаясь сахаромъ, увеличивался въ вѣсѣ, и въ немъ обнаруживалась такая жизненная сила, что онъ былъ въ

состояніи образовать столь сложныя составныя части своей организаціи при помощи сахара и исключительно минеральныхъ элементовъ.

Во второмъ опыте съ молочнымъ ферментомъ Пастеръ доказалъ, что, несмотря на свою малую величину и возможность быть смѣшаннымъ съ аморфными зернышками казеина и клейковины, маленькие членики молочного фермента были живыми существами и что имъ однимъ надо было приписать фактъ молочного броженія. Опь прибавилъ къ чистой подсахаренной водѣ небольшое количество амміачной соли, фосфатовъ щелочей и земель, а также чистой углекислой извести, полученной путемъ осажденія изъ раствора. По истечениіи двадцати четырехъ часовъ, жидкость начала мутиться и развились газы. Броженіе продолжалось и въ слѣдующіе дни. Амміакъ исчезъ, фосфаты и известковая соль растворились; образовалась молочно-кислая извѣстъ и соотвѣтственно можно было замѣтить отложеніе маленькаго молочного фермента. Зародыши молочного броженія при этомъ были взяты изъ пыли на различныхъ продуктахъ, или на сосудахъ, или изъ окружающего воздуха. Въ главѣ «о самопроизвольномъ зарожденіи» этотъ фактъ разсѣянія зародышей будетъ подробно выясненъ. Пока-же достаточно замѣтить, что результатами этого второго опыта вновь и самымъ рѣшительнымъ образомъ уничтожалась всякая мысль о силѣ соприкосновенія или передаваемости движенія и опровергались всѣ теоріи, господствовавшія до того времени въ наукѣ.

II.

Когда на предметъ, пребывавшій долго во мракѣ, сразу упадетъ свѣтъ, тогда лучи этого свѣта отражаются во всѣ стороны и его отблескъ попадаетъ на далекія разстоянія. Пастеръ не замедлилъ открыть еще одинъ ферментъ — масляной (бутировой) кислоты. Доказавъ прежде всего полное отличие фермента бутировой кислоты отъ всѣхъ другихъ, онъ установилъ, вопреки существовавшему мнѣнію, тотъ фактъ, что молочный ферментъ не способенъ къ образованію масляной кислоты, а что имѣется отдельное маслянокислое броженіе, вызываемое своимъ

определеннымъ ферментомъ. Этотъ ферментъ состоить изъ известного рода «вибріоновъ», которые образуются изъ маленькихъ цилиндрическихъ палочекъ, прозрачныхъ, округленныхъ на своихъ оконечностяхъ, отдельныхъ или соединенныхъ въ цѣпи изъ двухъ, трехъ, четырехъ и даже болѣе члениковъ. Они подвигаются какъ-бы скользя, при чемъ тѣльце остается прямымъ, или изогнутымъ, или волнистымъ; они размножаются путемъ дѣленія и отъ этого способа развитія зависитъ то расположение въ видѣ цѣпи члениковъ, которое они обыкновенно представляютъ. Иногда одинъ изъ этихъ члениковъ тянетъ за собою нѣсколько другихъ, двигаясь живо, какъ-бы желая отдѣлиться. Часто также можно замѣтить, что уже ставшая независимою палочка еще держится за свою цѣпь слизистою и прозрачною ниточкою. Этую породу маленькихъ инфузорій можно посѣять также, какъ сѣютъ пивныя или молочныя дрожжи. Если они находятся въ материалѣ, годномъ для ихъ питанія, то они размножаются до бесконечности; но надо отмѣтить слѣдующую, весьма существенную черту: ихъ можно посѣять въ жидкости, которая содержитъ только амміакъ и вещества минеральная или способная кристаллизоваться и кромѣ того способный бродить материалъ, какъ сахаръ, молочная кислота, камедь и проч. Бутировое броженіе обнаруживается въ то же время, какъ размножаются эти маленькия клѣтки.

Всѣъ ихъ дѣлается уже замѣтенъ, хотя сравнительно съ количествомъ развившейся бутировой кислоты онъ еще минимальный, какъ это, впрочемъ, бываетъ и при другихъ броженіяхъ. Опытъ этотъ, безъ сомнѣнія, сходенъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ съ двумя предыдущими, сдѣланными относительно спиртоваго и молочнаго ферментовъ. Онъ отличается, однако, тѣмъ обстоятельствомъ, въ высшей степени достойнымъ вниманія, что бутировый ферментъ, благодаря своимъ движеніямъ и способу развитія, представляетъ, неопровергимымъ образомъ и въ нѣкоторомъ родѣ осозательно, доказательство своей организации и жизни. Это еще не все: въ этомъ ферментѣ Пастеръ замѣтилъ одну совершенно новую и неожиданную особенность. Эти вибріоны живутъ и размножаются безъ того, чтобы имъ

надо было доставлять хотя и самое малое количество воздуха или свободного кислорода. И не только эти вибрёны живутъ безъ воздуха, но воздухъ ихъ губить и останавливаетъ броженіе, ими вызываемое. Если пропускать въ теченіи некотораго времени черезъ жидкость, въ которой они размножаются, токъ чистой угольной кислоты, то ихъ жизнь и развитіе ничуть не кажутся задѣтыми. Напротивъ, если, ни въ чемъ не измѣняя другихъ условій опыта, замѣнить токъ угольной кислоты токомъ атмосфернаго воздуха, въ теченіи одного или двухъ только часовъ, то вибрёны падаютъ безъ движенія на дно сосуда, и бутировое броженіе, которое было связано съ ихъ существованіемъ, тотчасъ пріостанавливается.

Пастеръ обозначилъ этотъ новый классъ существъ именемъ «анаэробныхъ», т. е. такихъ, которые могутъ жить безъ воздуха. Онъ оставилъ выраженіе «аэробныя» для всѣхъ другихъ микроскопическихъ существъ, которыхъ, подобно всѣмъ сложнымъ организмамъ, не могутъ обойтись безъ свободного кислорода.

«Безразлично, — говорилъ Пастеръ, — окажется-ли, при прогрессѣ науки, этотъ вибрёнъ растеніемъ или животнымъ; во всякомъ случаѣ, это — живое существо, одаренное способностью двигаться, живущее безъ воздуха и составляющее ферментъ.»

Размышляя объ этихъ фактахъ и общемъ характерѣ броженія, Пастеръ не замедлилъ подойти къ самой природѣ этихъ таинственныхъ явлений. Какимъ образомъ дѣйствуютъ микроскопическія существа при броженіи? Микроскопическое существо съѣдаетъ, если такъ можно выразиться, часть бродящаго материала. Но чѣмъ это явленіе питанія такъ разнится отъ питанія высшихъ существъ? Вообще, поглощая известное по вѣсу количество питательныхъ веществъ, животное обыкновенно ассимилируетъ тотъ же вѣсъ. При броженіи, напротивъ, ферментъ, питаясь бродящимъ материаломъ, разлагаетъ гораздо большій вѣсъ сравнительно со своимъ. Съ другой стороны, бутиловый ферментъ живеть безъ свободного кислорода. «Нѣть-ли скрытой связи — спросилъ себя Пастеръ — между способностью быть ферментомъ и способностью жить безъ свободного кислорода воз-

духа? Способны ли быть ферментами тѣ вибріоны, которые непремѣнно требуютъ для своего питанія и размноженія присутствія кислорода?»

Пастеръ тогда придумалъ рядъ опытовъ, имѣвшихъ цѣлью сопоставить параллельно эти два столь любопытныхъ физиологическихъ факта: жизнь безъ воздуха и способность быть ферментомъ.

Извѣстно, какъ приготавляютъ вино и пиво. Виноградный сокъ и пивное сусло вливаются въ деревянные чаны или въ бочки, которые могутъ имѣть большіе или меньшіе размѣры. Задимствованъ-ли ферментъ изъ тѣхъ зародышей, которые находились на поверхности винограда, или небольшое количество фермента было непосредственно прибавлено въ видѣ пивныхъ дрожжей, какъ это практикуется при броженіи пивного сусла, но, во всякомъ случаѣ, жизнь фермента, его размноженіе, увеличеніе его вѣса — все это такія жизненные явленія, которымъ, безъ всякаго сомнѣнія, недостаточно то количество кислорода, которое находится въ свободномъ видѣ во внѣшнемъ воздухѣ или раствореннымъ въ самомъ сусль. Такимъ образомъ, жизнь клѣтокъ фермента, который размножается до бесконечности, обходится, какъ видно, безъ свободнаго кислорода. Въ нѣкоторыхъ пивоварняхъ въ Англіи чаны, въ которыхъ бродитъ пиво, имѣютъ иногда объемъ въ нѣсколько тысячъ гектолитровъ, и броженіе развивается газъ, состоящей изъ чистой угольной кислоты, которая, будучи гораздо тяжелѣе воздуха, ложится толстымъ слоемъ на поверхности жидкости въ чанѣ и, такимъ образомъ, отдѣляетъ жидкую массу отъ соприкосновенія съ внѣшнимъ воздухомъ.

Вся эта жидкая масса заключается, слѣдовательно, между деревянными стѣнками и толстымъ слоемъ тяжелаго газа, не содержащаго ни слѣда свободнаго кислорода. Однако-же, жизнь клѣтокъ фермента и производство продуктовъ, входящихъ въ составъ ихъ, протекаютъ въ теченіи нѣсколькихъ дней съ необычайной дѣятельностью. Здѣсь и выясняется, между прочимъ, что жизнь безъ воздуха и свойства фермента характеризуются

большою разницею между количествомъ образовавшагося фермента, собираемаго, по окончаніи операциі, на днѣ чана подъ именемъ пивныхъ дрожжей, и количествомъ сахара, который перебродилъ, превратившись въ спиртъ, угольную кислоту и другие различные продукты.

Пастеръ изучилъ экспериментальнымъ путемъ, что происходит въ томъ случаѣ, если, не измѣня главныхъ условій этихъ явлений, измѣнить размѣщеніе бродящаго материала, давая доступъ свободному кислороду воздуха. Для этого достаточно вызвать броженіе пиваго сусла или винограднаго сока не въ глубокихъ чанахъ, а на стекляныхъ подносахъ съ большою поверхностью или въ деревянныхъ корытахъ съ плоскимъ дномъ и краями въ нѣсколько сантиметровъ вышиною. При этихъ новыхъ условіяхъ броженіе совершается съ дѣятельностью и живостью, еще болѣе необыкновенными, нежели въ томъ случаѣ, когда оно происходитъ въ глубокихъ чанахъ. Жизнь дрожжей какъ-то особенно возбуждена; но вмѣстѣ съ тѣмъ обнаруживается большая разница, которая существуетъ между обоими броженіями. Отношеніе между вѣсомъ разложившагося сахара и образовавшихся дрожжей абсолютно различно въ обоихъ случаяхъ. Въ то время, напримѣръ, когда въ глубокихъ чанахъ и въ различные моменты броженія можно было констатировать, что одинъ килограммъ фермента разлагаетъ 70, 80, 100 и даже 150 килограммовъ сахара, въ мелкихъ чанахъ можно было видѣть, что одинъ килограммъ фермента соотвѣтствуетъ всего 5 или 6 килограммамъ разложившагося сахара. Этимъ соотношеніемъ между вѣсомъ сахара, который бродитъ, и вѣсомъ фермента, который образуется, и опредѣляется значеніе того, что можно было бы назвать специфическимъ характеромъ фермента, отличающимъ образъ жизни фермента отъ образа жизни другихъ существъ, большихъ или малыхъ, гдѣ вѣсъ образующейся матеріи и ассимилированныхъ питательныхъ веществъ почти равняются другъ другу. Другими словами, чѣмъ болѣе дрожжевой ферментъ пива поглощаетъ для своей жизни свободнаго кислорода, тѣмъ меньше становится его сила, какъ фермента. Такимъ онъ бываетъ въ неглубокихъ чанахъ, очень большая поверх-

ность которыхъ широко соприкасается съ воздухомъ. Напротивъ, чѣмъ больше его жизнь проходитъ въ присутствія воздуха, тѣмъ болѣе увеличивается его способность къ разложенію и приведенію въ броженіе сахара. Такъ оно бываетъ въ глубокихъ чанахъ. Близкое соотношеніе между жизнью безъ воздуха и броженіемъ обнаруживается, такимъ образомъ, всецѣло.

Свѣтъ, столь неожиданно брошенный этими фактами на явленіе броженія, сильно поразилъ умы. «Въ этихъ безконечно малыхъ созданіяхъ жизни, — сказалъ однажды Дюма Пастеру передъ Академіей Наукъ, — Вы открыли третье царство! Ему принадлежать эти существа, которыя, обладая всѣми прерогативами животной жизни, не имѣютъ надобности для своей жизни въ воздухѣ и находятъ нужную имъ теплоту въ тѣхъ химическихъ разложеніяхъ, которыя они вызываютъ вокругъ себя».

Работы Пастера, доказывавшія, что явленіе броженія всегда находится въ зависимости отъ жизни микроскопического существа, слѣдовали непрерывно одна за другою. Самымъ любопытнымъ изъ этихъ изслѣдований было то, которое касалось броженія виннокаменно-кислой извести. Въ этомъ мемуарѣ доказательства въ пользу неучастія свободнаго кислорода въ жизни фермента и въ броженіи достигли высшихъ предѣловъ опытной точности.

III.

Но есть еще одинъ классъ химическихъ явлений, въ которомъ вполнѣ обнаруживается жизнь безъ воздуха микроскопическихъ существъ. Пастеръ доказалъ, что въ специальному броженіи, носящемъ название гніенія, первый двигатель (*primum movens*) процесса заключается въ присутствіи микроскопическихъ вибріоновъ. Эти вибріоны принадлежатъ совершенно къ тому же порядку, какъ и тѣ, которые составляютъ масляно-кислый (бутировый) ферментъ. Броженіе сахара, маннита, камеди, молочно-кислой извести, вызываемое бутировымъ ферментомъ, такъ сходно съ явленіями гніенія, что эти броженія можно было бы называть гніеніемъ сахара и сходныхъ продуктовъ.

Если сочли нужнымъ дать название гніенія броженію животныхъ веществъ, то это объясняется тѣмъ, что въ моментъ разложенія фибрина и альбумина, крови, желатины, сухожильного вещества и проч., входящіе въ ихъ составъ сѣра и фосфоръ развиваются зловоніе, зависящее отъ дурно-пахучихъ сѣрнистыхъ и фосфористыхъ газовъ.

Въ виду того, что явленія гніенія суть тѣ же броженія, отличающіяся только химическимъ составомъ бродящаго материала, Либихъ, естественно, вмѣстилъ ихъ въ свою общую теорію о разложеніяхъ органическихъ веществъ послѣ ихъ смерти. Нужно замѣтить, что, еще задолго до появленія работъ Пастера, въ бродящихъ и гніющихъ веществахъ констатировано было присутствіе грибковъ и микроскопическихъ существъ. Возникла мысль, что эти существа могли бы имѣть вліяніе на развитіе гніенія. Не доставало только доказательствъ, но намеки на возможность подобнаго соотношенія существовали. Надо однако видѣть, съ какимъ презрѣніемъ Либихъ въ своихъ лекціяхъ по хімії отвергалъ эти гадательныя предположенія:

«Тѣ, — писалъ онъ, — которые думаютъ объяснить гніеніе животныхъ веществъ присутствіемъ микроскопическихъ животныхъ, почти также разсуждаютъ, какъ дитя, которое вздумало-бы объяснить быстроту теченія Рейна, приписывая ее тому сильному движешію въ направленіи къ Бингену, которое сообщаетъ водѣ множество мельничныхъ колесъ въ Майнцѣ. Возможно-ли рассматривать растенія и животныя, какъ причину разрушенія другихъ организмовъ въ то время, когда ихъ собственные элементы обречены на тотъ-же рядъ явленій разложенія? Если грибокъ есть причина разрушенія дуба, если микроскопическое животное есть причина гніенія мертваго слона, то я, въ свою очередь, спрошу, какова причина, обусловливающая гніеніе гриба и микроскопического животнаго, когда жизнь удаляется отъ этихъ двухъ организованныхъ существъ?»

Тридцать два года спустя, когда Пастеръ за двадцать слишкомъ лѣтъ успѣлъ уже собрать массу доказательствъ того, что теорія Либиха не выдерживаетъ критики, одинъ парижскій

врачъ, Бульо, своимъ настойчивымъ голосомъ восьмидесятилѣтняго старика и съ большою ядовитостью спросилъ: «Пусть г. Пастеръ отвѣтить намъ здѣсь, передъ лицомъ всей медицинской Академіи, гдѣ ферменты ферментовъ?»

Прежде чѣмъ отвѣтить на это возраженіе, которое Либихъ и Бульо считали неопровергимымъ, Пастеръ для того, чтобы лучше обозначить всѣ фазы явлений, въ краткомъ предисловіи изобразилъ роль, которую играетъ кислородъ воздуха въ дѣлѣ разрушенія животныхъ и растительныхъ веществъ послѣ ихъ смерти.

«Нетрудно, въ самомъ дѣлѣ, понять, что броженіе и гніеніе представляютъ только первую фазу въ возвращеніи атмосферы и почвъ всего, что отжило. Броженіе и гніеніе развиваются тѣла, все еще очень сложныя, хотя они представляютъ уже продукты разложенія бродящихъ веществъ. Когда сахаръ бродитъ, большая часть его вѣса превращается въ газообразное состояніе; но вмѣстѣ съ развившейся угольной кислотою, которая представляетъ собою часть сахара, возвратившуюся въ атмосферу, образуются новые продукты: спиртъ, янтарная кислота, глицеринъ и дрожжи. Когда гніетъ мясо животныхъ, то вмѣстѣ съ парами воды и другими газами гніенія образуются еще очень сложные продукты разложенія. Гдѣ же природа находитъ агентовъ разрушенія этихъ вторичныхъ продуктовъ?»

«Великое дѣло разрушенія животныхъ и растительныхъ веществъ совершаются при помощи тлѣнія — притяженіемъ кислорода воздуха. Въ этомъ случаѣ слѣдуетъ также удалить изъ науки всю совокупность предвзятыхъ взглядовъ, допускавшихъ, что кислородъ непосредственно овладѣваетъ организованнымъ веществомъ послѣ его смерти и что это вещество подвергается чисто химическому горѣнію. Нѣть, этой работою смерти еще управляетъ жизнь!»

«Если броженіе и гніеніе производятся главнымъ образомъ анаэробными микроскопическими существами, живущими безъ свободного кислорода, то процессы тлѣнія находятся въ преимущественной, если не исключительной, зависимости отъ класса безконечно малыхъ аэробныхъ существъ. Эти послѣднія и имѣ-

ють способность притягивать кислородъ изъ воздуха. Это суть тѣ низшіе организмы, которые представляютъ могущественныхъ агентовъ въ дѣлѣ возвращенія атмосферѣ всего того, что отжило. Плѣсени, грибы, бактеріи, которыхъ мы уже описывали, монады, которыхъ такъ малы, что ихъ нужно двѣ тысячи, чтобы составить одинъ миллиметръ, — берутъ на себя великую работу возстановленія равновѣсія жизни, дѣлая опять пригоднымъ для созиданія все то, что она сотворила.»

Чтобы доказать роль, которую играютъ эти повсюду распространенные микроскопическія существа, Пастеръ сдѣлалъ два опыта. Сначала онъ ввелъ въ сосуды воздухъ, освобожденный отъ всякой пыли. Объ этомъ процессѣ очищенія воздуха во всѣхъ его подробностяхъ мы будемъ имѣть случай говорить по поводу изслѣдований о самопроизвольномъ зарожденіи. Въ этихъ сосудахъ въ соприкосновеніи съ чистымъ воздухомъ находились: вода пивныхъ дрожжей съ раствореннымъ въ ней сахаромъ, молоко, опилки дерева..., каковыя вещества были при высокой температурѣ освобождены отъ зародышей низшихъ организмовъ. Сосуды и вещества были потомъ оставлены при температурѣ 25—35 градусовъ. Въ другомъ рядѣ параллельныхъ опытовъ, сдѣланныхъ при тѣхъ-же условіяхъ и температурахъ, Пастеръ не принялъ никакихъ предосторожностей къ воспрепятствованію проростанія маленькихъ зеренъ плѣсени, находившихся въ воздухѣ или примѣшанныхъ къ веществамъ, содержавшимся въ этихъ сосудахъ. Онъ не удалилъ также другихъ зародышей безконечно-малыхъ существъ изъ класса аэробныхъ.

Спустя некоторое время, воздухъ изъ всѣхъ сосудовъ обоихъ рядовъ былъ подвергнутъ анализу. При этомъ былъ найденъ очень интересный фактъ: въ сосудахъ, въ которыхъ путемъ удаленія зародышей жизнь была отнята у органическихъ веществъ, воздухъ содержалъ еще большія количества кислорода; напротивъ, въ сосудахъ, гдѣ микроскопическіе организмы могли развиваться, кислородъ вполнѣ отсутствовалъ и былъ замѣщенъ угольной кислотой! Болѣе того, для полнаго всосанія и притяженія кислорода было достаточно нѣсколькихъ дней, въ

то время какъ въ сосудахъ, въ которыхъ не протекала жизнь микроскопическихъ существъ, оставалось, еще даже спустя много лѣтъ, много кислорода въ свободномъ состояніи; до того малое количество кислорода непосредственно и химически поглощается органическими веществами, когда отсутствуютъ безконечно малые организмы! Но могутъ-ли эти микроскопические создания послѣ того, какъ они разложили или сожгли всѣ эти вторичные продукты, сами въ свою очередь разложиться? «Какъ, — воскликнулъ Булью, повторяя свой вопросъ, — могутъ они разрушаться и исчезнуть? Какимъ образомъ ихъ матеріаль, который подобенъ матеріалу всѣхъ другихъ существъ на землѣ, можетъ переходить въ газообразное состояніе и возвратиться въ атмосферу? Они разрушаютъ другихъ, но кто-же ихъ разрушаетъ?»

— Ферментъ, который окончилъ свою работу, — возразилъ Пастерь, — и который вслѣдствіе недостатка пищи не можетъ ее продолжать, становится въ свою очередь массою органическаго вещества, такъ сказать, мертваго. Въ такомъ видѣ представилась бы куча дрожжей, выставленная на воздухъ. Предоставьте эту кучу самой себѣ при лѣтней температурѣ, и вы увидите, что внутри ея появляется масса анаэробныхъ вибріоновъ, и развивается гніеніе, соотвѣтствующее ихъ жизни внѣ соприкосновенія съ воздухомъ. Въ тоже время на поверхности всей массы, т. е. на той ея части, которая соприкасается непосредственно съ кислородомъ воздуха, разовьются зародыши бактерій и зернышки плѣсени, которые, притягивая кислородъ, вызовутъ тлѣніе, приводящее вещество въ газообразное состояніе. Оказывается, что ферментами ферментовъ служатъ просто тѣ же ферменты. Пока аэробы имѣютъ на поверхности въ своемъ распоряженіи свободный кислородъ, они размножаются и продолжаютъ свое дѣло разрушенія.


Анаэробные вибріоны погибаютъ, когда пѣтъ болѣе новаго матеріала для разложенія, и образуютъ въ свою очередь массу органическаго матеріала, становящуюся мало-по-малу и неизбѣжно жертвою аэрбовъ. Часть аэрбовъ, которая уже от-

жила, становится добычей новыхъ аэробовъ другихъ породъ или той же породы. Такимъ образомъ, переходя отъ гненія къ гненію, отъ тлѣнія къ тлѣнію, первоначальная органическая масса превращается въ группу анаэробныхъ и аэробныхъ зародышей, тѣхъ-же зародышей, которые были примѣшаны вначалѣ къ органическому материалу.

Хотя куча зародышей есть еще въ свою очередь куча органическаго вещества, могущаго подвергнуться двойному дѣйствію явлений гненія и тлѣнія, однако обѣ ихъ разрушеній нечего болѣе заботиться. Они представляютъ въ концѣ концовъ жизнь въ ея вѣчной формѣ, потому что жизнь есть зародышъ, а зародышъ есть жизнь.

Такимъ образомъ, разрушеніе всего того, что отжило, цѣликомъ сводится на совмѣстное дѣйствіе этихъ трехъ великихъ явлений природы: броженія, гненія и тлѣнія. Живое существо, животное или растеніе, умираетъ. Остатки того и другаго находятся въ соприкосновеніи съ воздухомъ и за жизнью, которая ихъ покинула, вслѣдъ идетъ опять жизнь подъ другими формами. Въ поверхностныхъ частяхъ, которыхъ можетъ коснуться воздухъ, развиваются и размножаются зародыши безконечно — малыхъ аэробовъ. Углеродъ, водородъ и азотъ органическаго вещества превращаются, при помощи кислорода воздуха и подъ вліяніемъ жизни этихъ аэробовъ, въ угольную кислоту, водяные пары и амміакъ. И это тлѣніе будетъ продолжаться, пока оно будетъ для себя имѣть органическую материю и воздухъ. Въ то же время, какъ происходитъ это поверхность тлѣніе, въ срединѣ массы производятъ свою работу броженіе и гненіе, при содѣйствіи развившихся зародышей анаэробовъ, которые не только не нуждаются для своей жизни въ кислородѣ, но которыхъ послѣдній даже губитъ. Мало-по-малу, со временемъ, процессы заканчиваются, благодаря этой работе глухаго броженія и тлѣнія. Всякое животное или растительное вещество, гдѣ-бы это ни было, на свободномъ воздухѣ или подъ землею, всегда болѣе или менѣе проникнутою воздухомъ, кончаетъ тѣмъ, что исчезаетъ. Для того, чтобы эти процессы были задержаны, требуется крайне низкая темпера-

тура. По этой причинѣ въ полярномъ льду найдены совершенно нетронутые допотопные слоны. Микроскопические организмы не могутъ жить при такой холодной температурѣ. Эти факты еще болѣе подтверждаютъ всѣ эти новыя идеи о важности роли, которую играютъ безконечно-малыя созданія, которыхъ являются властителями міра. Если-бы воспрепятствовали ихъ постоянной тихой работѣ, то поверхность земли, запруженная органическими веществами, сдѣлалась бы необитаемою.



Уксусное броженіе.

Производство уксуса.

Вскорѣ Пастеръ приступилъ къ изслѣдованію одного изъ наиболѣе любопытныхъ явлений, какія только можно указать, — притяженія кислорода воздуха микроскопическимъ организмомъ, при превращеніи вина въ уксусъ. Какъ уже само название показываетъ, уксусъ (*vinaigre*) есть ничто иное, какъ скисшее вино (*vin aigri*). Всякій замѣчалъ, что вино, оставленное само по себѣ, при обыкновенныхъ условіяхъ часто превращается въ уксусъ. Преимущественно это измѣненіе совершается тогда, когда бутылки уже початы. Иногда, однако, вино закисаетъ въ бутылкахъ, даже закупоренныхъ. Въ этомъ случаѣ можно быть увѣреннымъ, что бутылки оставались стоймя и что болѣе или менѣе плохія пробки дозволили воздуху проникнуть къ вину. И въ самомъ дѣлѣ, присутствіе воздуха необходимо для химического акта превращенія вина въ уксусъ. Какое-же участіе принимаетъ здѣсь воздухъ? И каково это маленькое микроскопическое существо, которое становится, при участіи воздуха, причиной этого броженія?

Поставивши эти два научныхъ вопроса, Пастеръ въ одной знаменитой лекціи, прочитанной имъ въ Орлеанѣ по просьбѣ уксусныхъ фабрикантовъ этого города, сначала прослѣдилъ раз-

ницу въ свойствахъ вина и уксуса. Что происходит при брожении виноградного сока, дающего вино? Содержавшійся въ сокѣ сахаръ исчезаетъ, превращаюсь въ угольную кислоту, которая улетучивается во время броженія, и въ спиртъ, который остается въ перебродившей жидкости или винѣ. Прежніе химики называли «спиртомъ» всякое летучее вещество, которое можно собрать при помощи перегонки. Если дистиллировать вино и сгустить пары въ змѣевикѣ, окруженному холодной водою, то въ концѣ змѣевика можно собрать винный спиртъ, который, будучи освобожденъ отъ смѣшавшейся съ нимъ во время дистилляціи воды, называется алкоголемъ. Уксусъ же не содержитъ болѣе алкоголя. Если его дистиллировать, то отдѣляется еще вода и какой-то «спиртъ». Но этотъ «спиртъ» кислый, съ очень острый запахомъ и не воспламеняется, какъ винный спиртъ. Отдѣленный отъ воды, которую онъ увлекъ съ собою во время перегонки, этотъ спиртъ носитъ название уксусной кислоты. Въ этой формѣ, его прибавляютъ къ духамъ, къ фланкамъ т. и. англійской соли, пары которой обладаютъ столь рѣзкимъ запахомъ.

При этомъ превращеніи вина въ уксусъ, при прикосновеніи съ воздухомъ, алкоголь исчезъ и замѣстился уксусной кислотою. Воздухъ, повидимому, что-то уступилъ вину. Воздухъ, какъ всѣмъ известно, есть смѣесь азота съ кислородомъ. Азотъ составляетъ четыре пятыхъ его объема, а кислородъ одну пятую. Оказывается, что при превращеніи вина въ уксусъ азотъ не принимаетъ никакого участія. Только одинъ кислородъ вступаетъ въ соединеніе со спиртомъ. Хотите доказательство? Возьмите бутылку, въ которой вино скисло, но которая въ то же время хорошо закупорена. Если кислородъ содержавшагося въ бутылкѣ воздуха соединился съ алкоголемъ, то въ ней долженъ остаться одинъ лишь азотъ. Опрокиньте теперь бутылку и откупорьте ее въ чашѣ, наполненной водою. Вода изъ чаши устремится въ бутылку, чтобы наполнить частичную пустоту, образовавшуюся вслѣдствіе исчезнувшаго кислорода. Объемъ этой вошедшей въ бутылку воды точно равняется одной пятой всего первоначального объема воздуха, который

содержался въ бутылкѣ въ тотъ моментъ, когда она была хорошо закупорена.

Кромѣ того, легко доказать, что остающійся въ бутылкѣ газъ имѣть всѣ свойства азота: зажженная спичка гаснетъ въ немъ, какъ-будто ее погрузили въ воду, а птица въ немъ тотчасъ задыхается.

Если бы ограничиться выше изложенными свѣдѣніями, то могло-бы показаться, что разведенный водою алкоголь, выставленный на воздухъ, долженъ образовать уксусную кислоту. Однако этого не бываетъ. Можно оставить цѣлые годы въ соприкосновеніи съ воздухомъ чистую воду, содержащую столько же градусовъ спирту, какъ и обыкновенная вина, и никакого образования уксуса не произойдетъ. Въ этомъ различіи между натуральнымъ виномъ и чистою алкоголизированною водою, обнаруживаемомъ ими при соприкосновеніи съ воздухомъ, мы еще разъ имѣемъ дѣло съ основнымъ вопросомъ о явленіяхъ броженія.

По знаменитой теоріи Либиха, которой предназначено было быть разрушенной Пастеромъ, это объяснялось такимъ образомъ: «если чистая алкоголизированная вода не закисаетъ, подобно вину, при соприкосновеніи съ воздухомъ, то это происходитъ отъ того, что эта вода не содержитъ белковаго вещества, которое содержится, напротивъ, въ винѣ, находится на пути къ разложенію и составляетъ ферментъ, способный притянуть кислородъ воздуха къ алкоголю. И что въ этомъ непремѣнно вся суть,—заключалъ Либихъ,—доказывается тѣмъ, что, если вы прибавите къ смѣси воды и алкоголя немного муки, или мясного сока, или даже самое ничтожное количество какогонибудь растительного сока, — вы увидите, что уксусное броженіе, такъ сказать, обязательно начинаетъ совершаться. Иначе говоря, прибавляя маленькое количество какого-нибудь азотистаго вещества, вы вызываете притяженіе кислорода воздуха къ алкоголю.»

Несомнѣнно, что въ винѣ, при его закисаніи, находится посредникъ, обусловливающій притяженіе кислорода воздуха, такъ какъ алкоголь самъ по себѣ въ какой-бы степени онъ ни былъ разведенъ въ чистой водѣ, никогда не можетъ пре-

вратиться въ уксусъ. Но этимъ обязательнымъ посредникомъ не представляется, какъ того хотѣла нѣмецкая теорія, мертвое бѣлковое вещество; нѣтъ, это есть растеніе, одно изъ самыхъ простыхъ и самыхъ маленькихъ растеній, какія только существуютъ на свѣтѣ, и которое известно съ незапамятныхъ временъ, подъ обыкновеннымъ названіемъ «уксуснаго цвѣта». Этотъ маленький грибокъ неизмѣннымъ образомъ и постоянно находится на поверхности вина, которое превращается въ уксусъ. Либихъ также зналъ объ этомъ фактѣ, «но это — говорилъ онъ — не больше, какъ простая случайность. Развѣ неизвестно, — прибавлялъ онъ, — что, когда настой органическаго вещества приходить въ соприкосновеніе съ воздухомъ, онъ покрывается тайнобрачными растеніями или наводняется толпою микроскопическихъ животныхъ? Развѣ уксусъ не есть также растительный настой? Уксусъ даетъ пріютъ уксусному цвѣту также, какъ онъ даетъ пріютъ тому, что называется уксусною угрицей.»

Въ данномъ случаѣ можно убѣдиться, съ какими неточностями связанъ методъ простаго наблюденія. Великое искусство — и никто лучше Пастера не примѣнялъ его — состоитъ въ томъ, чтобы поставить рѣшительные опыты, не оставляющіе никакого мѣста неточному объясненію фактовъ. Вотъ каковы эти рѣшительныя доказательства истиннаго значенія маленькаго микроскопическаго грибка, этого «уксуснаго цвѣта», этой «грибной пленки»*), въ томъ видѣ, какъ ихъ формулировалъ Пастерь. Это только образчикъ того метода, который онъ примѣнялъ при изученіи броженій: алкогольнаго, молочнаго, маслянно-кислаго и винограднно-кислаго. Разслѣдованіемъ этихъ строгихъ фактовъ теоріямъ Берцеліуса, Митчерлиха и Либиха былъ еще разъ нанесенъ жестокій ударъ.

Если влить немногого вина въ бутылку, потомъ закупорить ее герметически и предоставить ее самой себѣ, то при такихъ обстоятельствахъ вино закисаетъ. Но если предварительно поставить бутылку въ горячую воду такъ, чтобы вино и воздухъ въ бутылкѣ нагревались въ теченіи нѣсколькихъ минутъ до температуры въ 60 градусовъ, и, охладивши бутылку, предо-

*¹) *Mycoderma aceti*.

ставить ее самой себѣ, то, при такихъ условіяхъ, вино никогда не превратится въ уксусъ. Однако, нагрѣваніе должно было оставить нетронутыми вещества бѣлковыя или азотистыя, которые заключались въ винѣ и, стало быть, нельзя утверждать, что они составляютъ ферментъ уксуса. Можно ли предположить, что, нагрѣвая вино только до 60 градусовъ, мы уже измѣнили бѣлковое вещество вина и по этой причинѣ оно перестало дѣйствовать, какъ ферментъ, то есть потеряло способность притягивать кислородъ воздуха къ алкоголю? Эта гипотеза падаетъ передъ слѣдующимъ опытомъ: откройте бутылку, дуньте въ нее изъ мѣха для того, чтобы нагрѣтое вино пришло въ соприкосновеніе съ обыкновеннымъ воздухомъ, — и закисаніе вина опять начнется.

Но вотъ еще, дѣйствительно превосходный опытъ по этому вопросу. Извѣстно, что чистая алкоголялизированная вода не закисаетъ, развѣ если прибавить къ ней немного бѣлковаго вещества. Но Пастеръ нашелъ, что можно совершенно обойтись безъ бѣлковаго вещества и замѣнить его смѣсью кристаллическихъ солей, фосфатовъ щелочей и земель, къ которымъ прибавляютъ немного фосфорно-кислаго аммонія. При этихъ условіяхъ, особенно если подкислить алкоголялизированную воду небольшимъ количествомъ чистой уксусной кислоты, замѣчаютъ, что грибная пленка развивается и алкоголь превращается въ уксусную кислоту. Болѣе убѣдительнымъ образомъ не возможно доказать, что бѣлковыя вещества вина не составляютъ фермента уксуснаго броженія. Эти альбуминоидныя вещества, однако, содѣйствуютъ уксусному броженію, но единственno въ качествѣ пищи для *mycoderma acetii*, и именно пищи азотистой. Истинный и единственный уксусный ферментъ — это маленький грибокъ. Онъ главный дѣятель въ этомъ процессѣ, все совершаются имъ.

Не заключается ли величайшей прелести въ томъ, что видишь, какъ самыя темныя явленія становятся ясными, благодаря поразительной истинѣ хорошо понятыхъ и разъясненныхъ фактовъ? — Въ бутылкѣ, содержащей вино и воздухъ, которые были нагрѣты до 50—60 градусовъ, вино никогда не закисаетъ; это зависитъ отъ того, что зародыши *mycoderma acetii*,

которые находятся въ винѣ и воздухѣ, теряютъ при высокой температурѣ всю свою жизненность. Это-же нагрѣтое вино, приведенное въ соприкосновеніе съ обыкновеннымъ воздухомъ, можетъ закисать оттого, что находившіеся въ винѣ зародыши были убиты, но это не было сдѣлано съ тѣми, которые затѣмъ поступили изъ свѣжаго воздуха. — Чистая алкогелизированная вода никогда не закисаетъ, даже при соприкосновеніи съ воздухомъ и зародышами (которые попадаютъ въ нее изъ воздуха или пыли на сосудахъ, въ которыхъ она содержится) оттого, что эти зародыши не въ состояніи размножаться, такъ какъ они не имѣютъ въ своемъ распоряженіи всѣхъ необходимыхъ имъ питательныхъ веществъ. Вино въ совершенпо наполненныхъ бутылкахъ и находящихся въ горизонтальномъ положеніи не закисаетъ оттого, что *mycoderma* не можетъ размножаться: ей не достаетъ кислорода. Безъ сомнѣнія, воздухъ постоянно проникаетъ черезъ поры пробки, но въ такомъ ничтожномъ количествѣ, что имъ овладѣваютъ красящія и другія болѣе или менѣе окисляющіяся вещества вина, не оставляя ничего для зародышей *mycoderma*, постоянно заключающихся въ винѣ. Когда бутылка стоитъ стоймѧ, тогда условія другія: высыханіе пробки дѣлаетъ ее болѣе проходимою для воздуха и зародыши *mycoderma* на поверхности жидкости, если они только здѣсь находятся, окружены воздухомъ.

Такимъ образомъ, резюмируя въ нѣсколькихъ словахъ установленные только что положенія, должно признать, что образованіе уксуса, всегда безъ исключенія, предшествуетъ развитіемъ на поверхности вина маленькаго растенія, состоящаго изъ нѣсколько перетянутыхъ, весьма тонкихъ члениковъ, скопленіе которыхъ то образуетъ легкую, иногда едва видимую пленку, то сморщенную и очень тонкую, жирную на ощупь, потому что растеніе содержитъ различныя жирныя вещества.

Это тайнобрачное растеніе имѣетъ особенное свойство сгущать значительныя количества кислорода и вызывать его притяженіе къ алкоголю, вслѣдствіе чего этотъ послѣдній превращается въ уксусную кислоту. Маленькая микодерма имѣть,

кромѣ того, не менѣе потребностей, чѣмъ большія растенія. Для того, чтобы жить, ей нужна соотвѣтственная пища; вино предоставляетъ ее въ изобиліи: азотистое вещество, фосфорно-кислые — магнезію и калій. Она хорошо развивается въ жаркомъ климатѣ. Поэтому, чтобы культивировать ее въ умѣренныхъ странахъ, какъ наши, слѣдуетъ, чтобы помѣщенія, въ которыхъ она находится, нагрѣвались искусственно. Но хотя вино содержитъ всѣ необходимыя элементы для жизни маленькой микодермы, однако эта жизнь еще лучше развивается, если подкислить вино уксусной кислотою.

Отсюда ясно, насколько простъ способъ фабрикаціи винаго уксуса, которымъ справедливо славится городъ Орлеанъ. Возьмите вина и, смѣшивъ его съ одной четвертью до трети объема уже образовавшагося уксуса, посыпте на его поверхность маленькое растеніе — производителя закисанія; для этого достаточно снять съ помощью деревянной лопаточки немнога микодермической пленки съ жидкости, ею покрытой, и перенести на поверхность новой, назначенной къ закисанію жидкости. Содержащіяся въ ней жирныя вещества препятствуютъ тому, чтобы она легко смокла. Поэтому, когда ее погружаютъ въ жидкость при посредствѣ покрытой ею лопаточки, то она отдѣляется и растилается по поверхности новой жидкости, не погружаясь на дно. Когда работа совершається лѣтомъ или зімою въ помѣщеніи, нагрѣтомъ до 15—25 градусовъ Цельсія, то уже послѣ двадцати четырехъ часовъ, много черезъ сорокъ восемь, посыпанная микодерма покрываетъ всю жидкость, — до того быстро и легко происходитъ ея развитіе! Въ нѣсколько дней все вино превратилось въ уксусъ. Величина поверхности жидкости не имѣть въ данномъ случаѣ значенія. Что происходитъ въ одномъ мѣстѣ, то распространяется и на сосѣднєе.

Однажды, во время преній, которая онъ велъ въ Академіи Наукъ, Пастеръ, желая охарактеризовать чудную напряженность жизни и размноженія этого маленькаго существа, выразился слѣдующимъ образомъ:

« Я ручаюсь, что покрою уксусной пленкою, въ промежуткѣ двадцати четырехъ часовъ, поверхность винной жидкости такой

величины, какъ залъ, въ которомъ мы теперь собрались. Мнѣ только нужно будетъ наканунѣ посѣять на ней нѣсколько едва видимыхъ частицъ свѣжей *mucoderma acetii*.

Можно только представить себѣ то число миллиардовъ и миллиардовъ членниковъ, которые родились бы въ этотъ день!

Но гдѣ найти микодерму для первого посѣва? Ничего нѣтъ проще: уксусная пленка есть одно изъ тѣхъ маленькихъ твореній, такъ называемыхъ самопроизвольныхъ, которыя можно видѣть образующимися самими по себѣ на поверхности жидкостей или настоевъ, годныхъ для ихъ развитія. Въ винѣ, уксусѣ, взвѣшенные въ воздухѣ, всюду въ нашихъ городахъ, въ нашихъ хозяйствахъ, существуютъ зародыши этого маленькаго растенія. Если желаютъ добыть микодерму въ первый разъ, то достаточно помѣстить въ тепломъ мѣстѣ смѣсь вина и уксуса. По прошествіи нѣсколькихъ дней, можно видѣть очень часто, — чтобы не сказать всегда, — что тамъ и сямъ появляются маленькая сѣроватыя пятна, разсѣевающія свѣтъ вмѣсто того, чтобы отражать его, какъ то дѣлаетъ сосѣдняя съ пятнами жидкость. И эти пятна пойдутъ впередъ, прогрессивно и быстро распространяясь. Это — грибная пленка, родившаяся изъ сѣмянъ, заключавшихся въ винѣ или уксусѣ, который былъ прибавленъ къ вину, или осѣвшихъ изъ воздуха, — подобно тому, какъ поле покрывается различными травами, происшедшими изъ зеренъ, естественнымъ образомъ разсѣянныхъ въ землѣ или занесенныхъ вѣтромъ или животными. Это сравненіе вѣрно до послѣдняго примѣра, ибо, какъ только вы оставите въ тепломъ помѣщеніи вино съ уксусомъ, то тотчасъ замѣтите, какъ появляются, неизвѣстно откуда, маленькая красноватыя мушки, обычные завсегдатаи уксусныхъ заводовъ и всѣхъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ закисаютъ растительныя вещества. Они также на своихъ лапкахъ и хоботцахъ могутъ заносить сѣмена изъ сѣдніихъ мѣстъ.

Способъ фабрикаціи уксуса, практикующійся въ Орлеанѣ, очень простъ: наложенные одна на другую бочки имѣютъ въ вертикальномъ днѣ, переднемъ по расположению ряда, одно

круглое отверстіе въ нѣсколько сантиметровъ въ діаметрѣ, и меньшуюсосѣднюю дыру, называемую втулочной, для того, чтобы воздухъ могъ входить и выходить, когда большое отверстіе закрыто воронкою, черезъ которую вливается вино, или сифономъ, черезъ который выбирается уксусъ. Бочки, имѣющія вмѣстимость въ 230 литровъ, наполняются на половину.

Дѣло рабочаго — поддерживать въ заводѣ надлежащую температуру и извлекать каждые восемь дней около 8 или 10 литровъ уксуса, которые замѣщаются 8 или 10 литрами вина.

Бочка, въ которой происходитъ это передвиженіе вина и уксуса, называется *маткою*. Приведеніе въ дѣйствіе матки не представляетъ легкаго дѣла: начинаютъ съ того, что вводятъ въ бочку, предназначенную для этой роли, 100 литровъ очень хорошаго и прозрачнаго уксуса, потомъ только 2 литра вина. Спустя 8. дней, прибавляютъ 3 литра вина, еще черезъ недѣлю 4 или 5 литровъ, — и это до тѣхъ поръ, пока бочка будетъ содержать приблизительно отъ 180 до 200 литровъ. Тогда въ первый разъ извлекается столько уксуса, чтобы оставающейся объемъ жидкости равнялся приблизительно 100 литрамъ. Съ этого именно момента матка начинаетъ работать и можно каждые восемь дней выбирать 10 литровъ уксусу, которые замѣщаются 10 литрами вина. Это — максимумъ работы, производимой бочкою въ теченіи одной недѣли. Если бочки работаютъ плохо, а это случается часто, тогда необходимо уменьшить производство.

Эта орлеанская система имѣть много неудобствъ: нужно три или четыре мѣсяца употребить на то, чтобы приготовить «матку»; нужно кормить эту матку, давая ей разъ въ недѣлю и очень правильно вина для превращенія въ уксусъ, иначе матка потеряетъ всю свою силу. Нужно, стало быть, фабриковать безпрестанно, даже когда фабрикація и тягостна. Если нужно возстановить матку, то приходится все начать съ знова, какъ-бы созидать ее вновь, и опять нужно потерять три или четыре мѣсяца. Наконецъ, еще одно подчасъ весьма непріятное условіе. Матка не можетъ быть перенесена съ мѣ-

ста на мѣсто, и даже въ томъ-же помѣщеніи съ одного пункта на другой. всякая матка фатально должна быть зачислена въ разрядъ недвижимаго имущества.

Пастеръ предложилъ упразднить матки. Онъ рекомендовалъ аппараты, состоящіе изъ простыхъ чановъ, расположенныхъ въ помѣщеніи, температура котораго можетъ быть доведена до 20 или 25 градусовъ Цельсія. Въ этихъ чанахъ смѣшиваютъ вино съ уже образовавшимся уксусомъ и сѣютъ на поверхность его растеніе, представляющее собою производителя фабриката. Способъ посѣва намъ уже знакомъ: достаточно только перенести при помощи лопаточки немнога микодермической пленки, которая разстилается, — и вскорѣ жидкость покрывается ею. Съ развитіемъ растенія начинается и закисаніе.

Одинъ крупный орлеанскій негоціантъ, который ввелъ у себя съ первыхъ лѣтъ способъ, рекомендованный Пастеромъ, и за усовершенствованную по этимъ принципамъ фабрикацію получилъ премію, основанную Обществомъ поощренія отечественной промышленности, передавалъ, что, по прошествіи девяти или десяти дней, а иногда и восьми, все закисшее вино превращалось въ уксусъ. Изъ 100 литровъ вина, пущенныхъ въ фабрикацію, онъ извлекалъ 95 литровъ уксуса. Послѣ сильного развитія тепла, происходящаго въ моментъ образования уксуса и истекающаго изъ химического соединенія алкоголя съ кислородомъ воздуха, уксусъ мало-по-малу охлаждается. Тогда его выбираютъ изъ чана, переливаютъ въ бочки, гдѣ прибавляютъ къ нему клею, и ужъ очищеннымъ пускаютъ въ употребленіе. Когда чанъ совершенно опорожненъ и хорошо вычищенъ, тогда составляютъ новую смѣсь вина и уксуса, опять сѣютъ маленькое растеніе и процессъ въ этой второй операциіи протекаетъ также, какъ и въ первой.

Часто случается, что уксусъ въ сосудахъ, въ которыхъ онъ сохраняется, — будетъ ли это на заводахъ, или въ хозяйствѣ, или у бакалейщиковъ, — дѣлается мутнымъ и становится необычайно слабымъ. Онъ можетъ даже перейти въ состояніе гніенія, если не употребить быстро средства противъ зла. Пастеръ далъ весьма обстоятельное объясненіе причины этихъ явлений. Если

мы скажемъ, что процессъ образования уксуса закончился въ бочкѣ или въ чанѣ, то это будетъ означать, что весь алкоголь, благодаря сожигающему дѣйствію микодермы, превратился въ уксусъ. Но что-же тогда дѣлается съ микодермой? Чаще всего она падаетъ на дно сосуда, не имѣя, такъ сказать, работы для выполненія. За этимъ моментомъ фабрикаціи надо заботливо слѣдить. И весьма существенно не пропускать того мгновенія, когда въ уксусѣ не остается больше алкоголя. Изъ опытовъ Пастера слѣдуетъ, въ самомъ дѣлѣ, что уксусная пленка можетъ одинаковымъ образомъ жить и на образовавшемся уксусѣ, сохраняя свою способность притягивать кислородъ къ нѣкоторымъ составнымъ частямъ уксуса. Уксусная кислота, въ такомъ случаѣ, беретъ на себя весь трудъ химическаго процесса, иначе говоря, кислородъ соединяется съ углеродомъ уксусной кислоты и превращаетъ его въ угольную кислоту, и такъ какъ уксусная кислота имѣеть составъ, могущій быть представленнымъ въ видѣ углерода и воды, то выходитъ, что если дать горѣнію продолжаться, то вместо уксуса получится вода, смѣшанная съ нѣкоторыми маленькими количествами азотистыхъ и минеральныхъ веществъ и остатками микодермы. Это будетъ обыкновенный органическій настой, лишенный всякой кислоты и весьма способный сдѣлаться добычею вибріоновъ гніенія или аэробныхъ мукоровъ. Этимъ мукорамъ, образующимъ мало-по-малу, послѣ того какъ микодерма опустилась, пленку на поверхности жидкости, благопріятствуетъ также развитіе анаэробныхъ вибріоновъ, защищенныхъ мукорами отъ дѣйствія воздуха. Здѣсь мы опять встрѣчаемся съ двойнымъ явлениемъ гніенія въ глубокихъ частяхъ и горѣнія въ мѣстѣ соприкосновенія съ воздухомъ. Ничто такъ не вредитъ качеству уксуса, какъ начало этого горѣнія, вызванного микодермой, когда уксусъ вполнѣ образовался и не содержитъ больше алкоголя. И въ самомъ дѣлѣ, первыя части уксуса, на которыхъ притягивается кислородъ при помощи микодермы, суть тѣ эфирныя и ароматическая вещества, которыхъ придаются уксусу его цѣнность.

Другая причина, по которой уксусъ теряетъ свои достоинства и которая сильно тормозитъ работу на уксусныхъ заводахъ,

состоитъ въ чрезвычайно частомъ присутствіи маленькихъ червячковъ (угрицы), которыхъ очень любопытно разматривать живыми въ сильную лупу, такъ какъ ихъ тѣло такъ прозрачно, что можно удобно различать всѣ внутренніе органы. Эти червячки размножаются съ необычайной быстротою. Вѣроятно, не существуетъ ни одной бочки въ уксусныхъ заводахъ орлеанской системы производства, которая не содержала-бы ихъ въ поражающемъ множествѣ. До работъ Пастера, невѣжество относительно этихъ маленькихъ существъ было такъ велико, что ихъ считали необходимыми для фабрикаціи, въ то время какъ, напротивъ, они суть опасные и постоянные враги, отъ которыхъ надо стараться избавиться. Впрочемъ, такое стремленіе уже вызывается отвращеніемъ, внушаемымъ употребленіемъ жидкости, загрязненной присутствіемъ подобныхъ животныхъ, каковое отвращеніе становится непобѣдимымъ, если разматривать подъ микроскопомъ переполненную ими каплю. Вредное значеніе этихъ маленькихъ существъ для производства уксуса вытекаетъ изъ того, что эти червячки для своей жизни нуждаются въ воздухѣ. Въ этомъ можно достаточно убѣдиться, если совершенно наполнить уксусомъ стеклянку и потомъ ее закупорить и сравнить ее съ подобною же стеклянкою, въ которую влить тотъ-же уксусъ, но съ остающимся пространствомъ для воздуха и безъ пробки. Въ первой стеклянкѣ, по истечениіи нѣсколькихъ дней, червячки, все болѣе и болѣе замедляя свои движенія, перестаютъ размножаться и всѣ падаютъ безжизненно на дно сосуда. Во второй стеклянкѣ, напротивъ, они продолжаютъ размножаться и двигаться. Эта потребность въ кислородѣ обнаруживается еще въ томъ обстоятельствѣ, что если уксусъ въ стеклянкѣ расположены толстымъ слоемъ, то въ глубинѣ жизни пріостанавливается, и червячки, чтобы лучше дышать, образуютъ копошащійся поясъ въ верхнихъ слояхъ жидкости. Если сблизить эти наблюденія съ тѣмъ другимъ фактамъ, что уксусъ образуется, благодаря дѣйствію грибной пленки на поверхности, то тотчасъ станетъ понятно, что грибная пленка и червячки другъ другу постоянно мѣшаютъ, такъ какъ эти два живыхъ существа — одно животное, другое растительное — имѣютъ каждое настоя-

тельнейшую потребность въ одной и той-же пищѣ — кислородѣ, и оба занимаютъ тѣ же поверхностные слои. Это обстоятельство приводитъ къ очень любопытнымъ явленіямъ. Когда, по той или другой причинѣ, грибная пленка не образовалась или опоздала своимъ развитіемъ, то червячки захватываютъ въ такомъ большомъ числѣ верхніе слои жидкости, что поглощаютъ весь кислородъ, не оставляя ничего маленькому растенію, которое вслѣдствіе того только съ большимъ трудомъ можетъ развиваться или даже жить. Обратно, когда работа закисанія идетъ дѣятельно и грибная пленка взяла верхъ, она успѣшно прогоняетъ червячковъ, которые удаляются не въ глубину, гдѣ они погибли-бы, а къ влажнымъ стѣнкамъ бочки или чаовъ. Они тогда образуютъ толстый, бѣловатый вѣнецъ, весь находящійся въ движениі. Это очень любопытное зрѣлище. Въ этомъ мѣстѣ ихъ врагъ, микодерма, не можетъ больше имъ вредить, во всякомъ случаѣ не въ такой степени, такъ какъ они окружены воздухомъ. Здѣсь они ожидаютъ съ нетерпѣніемъ момента, когда они смогутъ занять обратно свое мѣсто въ жидкости и заглушить, въ свою очередь, жизнь грибной пленки. Въ способѣ, предложенномъ Пастеромъ, при которомъ чаны очень часто чистятся, можно легко себя предохранить отъ этихъ маленькихъ животныхъ. Имъ недостаетъ времени размножиться настолько, чтобы стать вредными. Они даже вовсе не появляются, если работа хорошо ведется.

Почти всѣ работы Пастера, по своемъ появленіи, подвергались критикѣ, часто очень пылкой. По своей новизнѣ онъ задѣвали всѣ предубѣжденія и ошибочные толкованія, имѣвшія обращеніе въ наукѣ. Его изслѣдованія о броженіяхъ вызвали живую оппозицію. Либихъ встрѣтилъ упреками эту совокупность работъ, которая всѣ стремились опровергнуть теорію, которую онъ построилъ и защищалъ во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ. Храня въ теченіи десяти лѣтъ молчаніе, онъ, наконецъ, выпустилъ въ Мюнхенѣ, гдѣ былъ профессоромъ, длинный мемуаръ, отъ начала до конца направленный противъ Пастера. Въ 1870 г., наканунѣ войны, Пастерь, возвращаясь съ научной поездки по Австріи, пожелалъ проѣхать черезъ

Мюнхенъ, чтобы попробовать убѣдить такого виднаго противника, каковъ былъ Либихъ. Либихъ его принялъ съ большой учтивостью, но таѣъ какъ онъ едва поправился отъ болѣзни, то онъ сослался на слабость и отказался отъ всякаго спора.

Наступила франко-прусская война. Едва она закончилась, какъ Пастеръ выступилъ передъ Академіею Наукъ въ Парижѣ съ защитою своихъ работъ, въ видѣ вызова своему знаменному противнику. Работа Либиха была полна самыми ловкими аргументами.

«Я надѣялся ими размышлялъ въ теченіи почти десяти лѣтъ, прежде чѣмъ выпустилъ работу», писалъ онъ. Пастеръ, оставивъ въ сторонѣ всѣ тонкости, перешелъ прямо къ двумъ возраженіямъ нѣмецкаго химика, выражавшимъ всю суть спора.

Читатель, можетъ быть, еще не позабылъ въ чемъ состояло, приведенное въ работѣ о броженіяхъ, самое рѣшительное изъ доказательствъ, которымъ Пастеръ разрушилъ теорію Либиха. Это доказательство вытекало изъ опытовъ, въ которыхъ Пастеръ для каждого определенного броженія заставлялъ жить ферментъ минеральными веществами и бродящимъ веществомъ. Удаливъ всякое органическое азотистое вещество, которое, по теоріи Либиха, составляло ферментъ, Пастеръ доказалъ въ одно и то же время жизнь фермента и отсутствіе всякаго дѣйствія белковаго вещества, находящагося на пути къ разложенію.

Первое возраженіе Либиха рѣшительно оспаривало возможность образованія пивныхъ дрожжей и алкогольного броженія въ минеральной подсахаренной средѣ, гдѣ было посѣяно лишь бесконечно малое количество дрожжей. Дѣйствительно, десять лѣтъ назадъ, когда Пастеръ заявилъ о жизни дрожжей и алкогольномъ броженіи при подобныхъ условіяхъ, его опытъ былъ трудно выполнимъ. Случалось самому Пастеру терпѣть неудачу, когда онъ пробовалъ воспроизвести свой опытъ. Къ клѣткамъ дрожжей, посѣяннымъ въ этой минеральной подсахаренной средѣ, часто непосредственно присоединялись другие микроскопические организмы, которые появлялись въ подсаха-

ренномъ настоѣ и чрезвычайно вредили жизни дрожжей. Пастеръ въ это время далеко еще не освоился съ той тщательностью, которой требовалъ этотъ родъ изслѣдованій, и не былъ еще знакомъ съ тѣми предосторожностями, на которыхъ онъ указалъ позже и которыхъ были необходимы для успѣха. Хотя Пастеръ въ своей оригиналной работѣ въ 1860 г. ясно указалъ на трудности своего опыта, но отъ этого эти трудности не уменьшились. Либихъ за нихъ ухватился, преувеличилъ ихъ, только ихъ и видѣлъ, и увѣрялъ, что не возможно было получить заявленныхъ Пастеромъ результатовъ. Но въ 1871 г. основной опытъ Пастера о жизни дрожжей въ минеральной подсахаренной средѣ сдѣлался для него игрушкою. Онъ уже умѣлъ точно составлять среды, освобожденныя отъ всякихъ постороннихъ зародышей, приготовлять чистыя дрожжи и препятствовать всякому внесенію въ сосуды стороннихъ зародышей, могущихъ развиваться въ употребляемыхъ жидкостяхъ и, слѣдовательно, мѣшать жизни дрожжей.

«Изберите — говорилъ онъ Либиху, — среди Академіи одного или вѣсколькихъ изъ ея членовъ, требуя у нихъ, чтобы они высказались между Вами и мною, я готовъ приготовить въ Вашемъ и ихъ присутствіи въ минеральной подсахаренной средѣ столько пивныхъ дрожжей, сколько вы разумно потребуете, и изъ веществъ, которыхъ Вы сами доставите.»

Второе возраженіе Либиховскаго мемуара касалось уксуснаго броженія. Существуетъ способъ превращенія спирта въ уксусъ, очень распространенный въ Германіи и даже во Франціи, который обозначаютъ именемъ способа буквовыхъ стружекъ. Онъ состоитъ въ томъ, что даютъ алкоголю, смѣшенному съ водою, къ которой прибавлено нѣсколько тысячныхъ частей уксусной кислоты, медленно стекать въ бочки или чаны, наполненные буквовыми стружками, сложенными въ беспорядкѣ или расположеными рядами послѣ того, какъ ихъ скатали на подобіе часовой пружины. Отверстія, продѣланныя въ стѣнкахъ бочки и въ двойномъ днѣ, на которомъ лежать стружки, даютъ доступъ воздуху, который подымается въ бочкѣ, какъ-бы въ-

каминѣ, уступая весь или часть кислорода алкоголю для превращенія его въ уксусную кислоту. До работъ Пастера всѣ авторы, и въ особенности Либихъ, предполагали, что стружки дѣйствовали, какъ порозныя тѣла, на подобіе очень тонкихъ пластинокъ губчатой платины. «Уксусная кислота,— говорили они,— образовывалась прямымъ окисленіемъ безъ всякаго иного вліянія, кроме порозности дерева. Эта точка зреїнія казалась тѣмъ болѣе основательной, что на различныхъ фабрикахъ употребляемый алкоголь получается изъ флегмы т. е. изъ дистиллированнаго алкоголя, который не содержитъ бѣлковыхъ веществъ. Кромѣ того, продолжительность дѣйствія стружекъ нѣкоторымъ образомъ безконечна.

По мнѣнію Пастера, стружки при фабрикаціи играютъ лишь пассивную роль. Онъ допускаютъ разъединеніе жидкости, значительно увеличивающіе поверхность соприкосновенія ея съ воздухомъ и служатъ подпорою ферменту, который также, по его мнѣнію, есть микодерма въ слизистой формѣ, которая всегда свойственна этому грибку, когда онъ погруженъ въ воду.

Впрочемъ, поверхностное разсмотрѣніе далеко не говоритъ въ пользу этого взгляда Пастера. Если на самомъ дѣлѣ изслѣдовать стружки въ бочекъ, работающей уже нѣсколько мѣсяцевъ и даже нѣсколько лѣтъ, то находить ихъ необычайно чистыми. Можно было бы подумать, что ихъ только что вымыли съ большой тщательностью. Пастеръ доказалъ, что наружность здѣсь обманчива и что, на самомъ дѣлѣ, многія стружки, частью или совсѣмъ, покрыты на своей поверхности слизистой плевою изъ микодермы необычайной тонины. Надобно нѣсколько поскоблить ножикомъ поверхность дерева и разсмотреть подъ микроскопомъ, чтобы убѣдиться въ присутствіи этой плевы.

Либихъ, гдѣ-то говорящій не безъ нѣкотораго презрѣнія о микроскопѣ, формальнымъ образомъ отвергалъ точность этихъ увѣреній.

«Въ разведенномъ алкоголѣ, служащемъ для скорой фабрикаціи уксуса,— писалъ онъ,— исключены элементы питанія микодермы и уксусъ образуется безъ ея вмѣшательства.» Онъ

увѣрялъ, кромѣ того, въ своемъ мемуарѣ 1869 г., что онъ совѣщался съ директоромъ одного изъ самыхъ большихъ уксусныхъ заводовъ, какіе только есть въ Германіи; что въ этомъ Мюнхенскомъ заводѣ разведенныи алкоголь не получалъ, во все время своего превращенія, никакой посторонней примѣси, и что кромѣ воздуха, поверхности дерева и угля, — потому что уголь иногда прибавляютъ къ буковымъ стружкамъ, — ничто не могло дѣйствовать на алкоголь. Либихъ прибавлялъ, что директоръ завода нисколько не вѣрилъ въ присутствіе микодермы и что, наконецъ, онъ, Либихъ, разсматривалъ стружки, служившія двадцать пять лѣтъ на заводѣ и не видѣлъ на ихъ поверхности никакихъ слѣдовъ грибной пленки.

Аргументація казалась неопровергимою. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, понять развитіе растенія, содержащаго азотъ и минеральныи элементы и питающагося водою и алкоголемъ?

«Вы не принимаете въ соображеніе, — отвѣчалъ ему Пастерь, — характеръ воды, служащей для разведенія алкоголя. Эта вода, какъ и всѣ обыкновенныи воды, даже самыя чистыя, содержитъ аммоніакальныи соли и минеральныи вещества, которыя могутъ питать растеніе, какъ я это первый прямо доказалъ. Наконецъ, Вы плохо разсматривали поверхность стружекъ подъ микроскопомъ. Если-бы Вы тщательно изслѣдовали отскребки съ поверхности стружекъ, микроскопъ Вамъ показалъ-бы въ нихъ маленькие членники микодермы, иногда даже соединенные въ очень нѣжную пленку, которая можетъ быть приподнята. Кромѣ того, — прибавилъ онъ, — я предлагаю Вамъ послать въ академическую комиссию, уполномоченную решить споръ, стружекъ, которыя Вы сами достанете на Мюнхенскомъ заводѣ въ присутствіи его директора, предварительно высушивши быстро эти стружки въ сушильнѣ. Я покажу членамъ комиссіи, что микодерма присутствуетъ на поверхности стружекъ.»

Либихъ не принялъ этого вызова. Въ настоящее время споръ уже рѣшенъ.

Вопросъ о самопроизвольномъ зарожденіи.

«Всякое сухое тѣло, становясь мокрымъ — говорилъ Аристотель — и всякое мокрое тѣло, становясь сухимъ, родятъ животныхъ.» Пчелы, по мнѣнію Виргилія, рождаются изъ испорченныхъ внутренностей молодаго быка. Въ эпоху Людовика XIV-го также еще не ушли далеко впередъ. Одинъ знаменитый врачъ-алхимикъ, Фанъ-Гельмонтъ, писалъ: «испаренія, которыя подымаются со дна болотъ, рождаютъ лягушекъ, слизней, пиявокъ, травы и еще много другихъ вещей.» Но самымъ необычайнымъ представляется настоящій рецептъ, который далъ Фанъ-Гельмонтъ для того, чтобы получить полный горшокъ мышей: «достаточно выжать грязную рубаху надъ отверстиемъ сосуда, содержащаго пшеничныя зерна; ферментъ, исходящій изъ грязной рубахи и измѣняемый запахомъ зеренъ, производить превращеніе пшеницы въ мышей, приблизительно послѣ двадцати и одного дня». Фанъ Гельмонтъ, утверждавшій, что самъ наблюдалъ этотъ фактъ, прибавлялъ съ увѣренностью:

«Мыши рождаются возмужальми; есть между ними самцы, есть и самки. Чтобы продолжать родъ, имъ только нужно спароваться.»

«Выройте — говорилъ онъ еще — яму въ кирпичѣ, положите въ нее истолченной травы базилика, приложите второй кирпичъ на первый, такъ чтобы яма была совершенно прикрыта; выставьте оба кирпича на солнце и, по прошествіи нѣсколькихъ дней, запахъ базилика, дѣйствуя какъ ферментъ, видоизмѣнить траву въ настоящихъ скорпионовъ.»

Одинъ итальянскій натуралистъ, Реди, былъ первымъ, внесшимъ въ этотъ вопросъ о самопроизвольномъ зарожденіи болѣе тщательное изслѣдованіе. Наблюдая червей въ мясе, находящемся въ состояніи гніенія, онъ доказалъ, что эти черви не рождаются самопроизвольно, но что они были личинками яичекъ мухъ. Реди также доказалъ, что достаточно прикрыть мясо тонкой кисеєю, прежде чѣмъ выставить на воздухъ, чтобы

воспрепятствовать червямъ родиться. Такъ какъ ни одна муха не можетъ сѣсть на защищеное мясо, то на немъ нѣтъ отложенныхъ яицъ и, вслѣдствіе этого, ни личинокъ, ни червей. Но въ тотъ моментъ, когда вопросъ о самопроизвольномъ зарожденіи началъ терять значеніе и его могущество все болѣе и болѣе ограничивалось, этой доктринѣ, укрывшайся въ маленькихъ закоулкахъ, привнесло новую и сильную помощь открытие микроскопа. Созерцая этотъ міръ маленькихъ животныхъ, сторонники самопроизвольнаго зарожденія торжествовали.

«Мы могли ошибаться,—говорили они,—относительно происхожденія мышей, червей; но возможно ли допустить, чтобы происхожденіе микроскопическихъ существъ не было дѣломъ самопроизвольнаго зарожденія? Какъ иначе объяснить ихъ присутствіе и ихъ размноженіе во всякой мертвой животной или растительной средѣ, находящейся на пути къ разложенію?»

Бюффонъ поддержалъ ученіе о самопроизвольномъ зарожденіи авторитетомъ своего имени. Онъ воздвигнулъ даже цѣлую систему для поддержанія этой гипотезы. Въ 1845 г. два аббата вели между собою оживленный споръ, оспаривая и защищая этотъ вопросъ. Въ то время какъ Недгамъ, англійскій католическій священникъ, раздѣлялъ ученіе о самопроизвольномъ зарожденіи, итальянскій священникъ Спаланцани энергично нападалъ на него. Но хотя Спаланцани остался въ глазахъ публики побѣдителемъ, однако его побѣда была болѣе виѣшняя, нежели дѣйствительная, болѣе на словахъ, чѣмъ на дѣлѣ.

Вопросъ всплылъ еще болѣе настойчиво, чѣмъ когда-бы то ни было въ 1858 г. Пуше, директоръ Музея естественной исторіи въ Руанѣ, корреспондентъ Академіи Наукъ, объявилъ этой Академіи, что ему удалось доказать — достовѣрно и несомнѣнно — существованіе микроскопическихъ организмовъ, явившихся на свѣтъ безъ зародышей и, слѣдовательно, безъ сходныхъ съ ними предковъ.

Какимъ образомъ Пастеръ вмѣшался въ этотъ споръ? Какъ дошелъ онъ до занятій этимъ, столь труднымъ вопросомъ, на первый взглядъ кажущимся столь отдаленнымъ отъ

его работъ? Результаты его изслѣдований о броженіяхъ сдѣлали это для него какъ-бы долгомъ. Пастеръ пришелъ къ этому вопросу рядомъ логическихъ выводовъ. Пусть вспомнятъ, напримѣръ, тотъ опытъ, въ которомъ Пастеръ выставляетъ на лѣтній жаръ подсахаренную воду, смѣшанную съ фосфатами калія и магнезія и небольшимъ количествомъ сѣрно-кислого аммонія и угле-кислой извести. При этихъ условіяхъ, часто замѣчаютъ развитіе молочного броженія, т. е., что сахаръ превращается въ молочную кислоту, которая соединяется съ угле-кислою извѣстью, чтобы образовать молочно-кислую извѣсть. Эта соль кристаллизуется въ длинныхъ иголкахъ, и иногда наполняетъ весь сосудъ въ то время, какъ рождается и размножается маленькое организованное существо — молочный ферментъ. Если продолжать дальше опытъ, то другое броженіе слѣдуетъ обыкновенно за этимъ. Появляются и размножаются подвижные вибріоны; молочно-кислая извѣсть исчезаетъ, въ массѣ опять показывается жидкость и молочно-кислая извѣсть замѣщается масляно-кислою. Какой рядъ странныхъ явлений! Какимъ образомъ появилась жизнь въ этой подсахаренной средѣ, съ такимъ несложнымъ вначалѣ составомъ и, повидимому, столь отдаленной отъ всякаго проявленія жизни? Этотъ молочный ферментъ, эти масляно-кислые вибріоны,—откуда явились они? Произошли ли они сами по себѣ или изъ зародышей? А эти зародыши сами откуда?

Этотъ вопросъ о происхожденіи живыхъ организованныхъ ферментовъ сдѣлался для Пастера самымъ важнымъ и наиболѣе затруднительнымъ вопросомъ въ процессѣ броженія, потому что во всѣхъ броженіяхъ онъ наблюдалъ, какъ устанавливается извѣстное соотношеніе между химическимъ дѣйствиемъ разложенія и присутствіемъ микроскопическихъ существъ. Въ виду подобныхъ фактовъ необходимо было разъяснить эти затрудненія. Нѣмецкое ученіе — теорія Либиха — было распространено повсюду. Но этой системѣ въ броженіи играла главную роль не жизнь, но азотистое, органическое вещество: альбуминъ, фибринъ, казеинъ и пр., или жидкости, содержащія вещества этого рода, какъ напр. молоко, кровь, моча, — которыхъ достаточно

было выставить на воздухъ, чтобы они сдѣлались ферментами. Короче говоря, ферменты суть мертвыя химическія вещества, находящіяся на пути къ разложенію.

Пастеру казалось крайне необходимымъ выяснить вопросъ о самопроизвольномъ зарожденіи микроскопическихъ существъ въ процессѣ броженія. Онъ полагалъ, что, не изслѣдовавши этого вопроса, онъ не можетъ идти впередъ.

Въ октябрѣ 1857 г. Пастеръ былъ приглашенъ въ Парижъ. Послѣ того какъ онъ уже былъ невѣроятно молодымъ деканомъ, ему теперь препоручили, въ возрастѣ 35 лѣтъ, руководство научныхъ занятій въ высшей Нормальной Школѣ. Но хотя это было очень лестно, но не доставляло Пастеру того, чего онъ всего болѣе желалъ. Такъ какъ онъ не имѣлъ каѳедры, то и не имѣлъ никакой лабораторіи. Это происходило въ злополучное время для науки и высшаго образованія, въ то время, когда Клодъ Бернаръ занималъ тѣсную и сырую лабораторію, когда Бертело, уже известный великими работами, былъ только препараторомъ въ Коллежъ де-Франсъ, когда одинъ министръ народнаго просвѣщенія сказалъ Пастеру:

«Такой статьи въ бюджетѣ нѣтъ, чтобы Вамъ назначить ежегодно по 1500 франковъ въ видѣ расхода на опыты.»

Пастеръ, не колеблясь, устроилъ на свой собственный счетъ лабораторію на одномъ изъ чердаковъ Нормальной Школы; но легко себѣ представить, какою скромностью долженъ былъ отличаться подобный уголокъ въ подобномъ мѣстѣ. Жизнь свою Пастеръ дѣлилъ между профессорскими занятіями и опытами въ лабораторіи; онъ выходилъ лишь за тѣмъ, чтобы побесѣдовать о своихъ ежедневныхъ изслѣдованіяхъ съ Біо, Дюма, де-Сенармонъ и Баларомъ. Въ особенности Біо былъ его близкимъ другомъ. Когда Біо узналъ, что Пастеръ намѣренъ заняться темнымъ вопросомъ о самопроизвольномъ зарожденіи, онъ горячо отговаривалъ его отъ вступленія на подобный путь.

«Вы оттуда не выберетесь, — сказалъ онъ ему, — и потеряете свое время.» Когда же Пастеръ рискнулъ сдѣлать нѣсколько робкихъ замѣчаній, стараясь доказать, что ему необхо-

димо въ ряду своихъ изслѣдований заняться также ѣтимъ вопросомъ, то Біо былъ возмущенъ. Одаренный, — какъ объ неемъ высказался Сенъ-Бёвъ — всѣми качествами любознательности, остроумія, точности, логики и ясности, словомъ,—всѣми существенными и второстепенными достоинствами, Біо смотрѣлъ на намѣреніе Пастера, какъ на дерзкую погоню за приключеніями и безуміе.

Болѣе смѣлый, нежели Біо, но всегда осторожный, Дюма заявилъ Пастеру, не особенно, впрочемъ, настаивая, что онъ никому не совѣтоваль-бы долго заниматься подобнымъ предметомъ. Одинъ де-Сенармонъ взялъ подъ свою защиту Пастера, и сказалъ Біо :

“Оставьте Пастера. Если онъ ничего не найдетъ на томъ пути, на который выступаетъ, то будьте увѣрены, что онъ на немъ не останется. Но,—прибавилъ онъ,— я буду удивленъ, если онъ на немъ ничего не откроетъ.”

Пуше прямо приступилъ къ вопросу:

“Противники самопроизвольного зарожденія — сказалъ онъ — предполагаютъ, что зародыши микроскопическихъ существъ находятся въ воздухѣ, что воздухъ ихъ уносить и переносить на разстоянія. Но что скажутъ эти противники, если я вызову зарожденіе нѣсколькихъ организованныхъ существъ, замѣнивъ атмосферный воздухъ искусственнымъ?”

Пуше считалъ тогда свой опытъ очень остроумнымъ. Онъ наполнилъ стеклянку кипящею водою, съ величайшою предосторожностью закупорилъ ее герметически и, опрокинувъ, погрузилъ ее въ чашу со ртутью. Когда вода вполнѣ охладилась, онъ откупорилъ стеклянку подъ металломъ и ввелъ во внутрь полъ литра чистаго кислорода, этого газа, составляющаго жизненную часть воздуха, одинаково необходимаго какъ для жизни микроскопическихъ существъ, такъ и для жизни большихъ животныхъ и растеній.

Итакъ, въ сосудѣ заключались лишь чистая вода и кислородъ. Пуше ввелъ тогда маленький пучекъ сѣна, вѣсящий нѣсколько граммовъ. Пучекъ заключался въ закупоренной при-

шлифованной пробкой стеклянкѣ и находился предъ тѣмъ въ сушильниѣ, которая въ теченіи долгаго времени нагрѣвалась до температуры свыше 100 градусовъ. Но прошествіи восьми дней въ этомъ настоѣ сѣна развивалась плѣсень. «Откуда явилась она?» побѣдоносно восклицалъ Пуше. Конечно, не изъ кислорода, который Пуше получилъ изъ химического соединенія при температурѣ бѣлаго каленія. Вода, которая была влита въ состояніи кипѣнія, одинаковымъ образомъ была лишена зародышей, такъ какъ при подобной температурѣ — думаль онъ — всякий зародышъ сгорѣлъ-бы. Сѣно также не могло болѣе содержать ихъ, такъ какъ оно было взято изъ сушильни, нагрѣтой до 100 градусовъ. Но такъ какъ некоторые думали, что извѣстные существа, будучи нагрѣты до 100 градусовъ, все таки сохраняютъ жизне способность, то Пуше нагрѣвалъ сѣно до 200 или 300 градусовъ,—до какой угодно температуры.

Пастеръ омрачилъ триумфъ Пуше.

«Да — сказалъ Пастеръ въ одной знаменитой лекціи, прочитанной имъ въ 1864 г. въ Сорбоннѣ, передъ громадной публикою, состоявшей изъ ученыхъ философовъ, свѣтскихъ дамъ, духовныхъ лицъ и литераторовъ (Александръ Дюма былъ на первомъ планѣ) — публикою, жаждущею истины и взволнованною этимъ вопросомъ — да, опытъ, такимъ образомъ постановленный, безупреченъ, но только въ тѣхъ пунктахъ, которые привлекли вниманіе автора на себя. Я Вамъ докажу, что тутъ есть одна ошибка, которой Пуше не замѣтилъ, которую всего менѣе подозрѣвалъ, которую никто до него не подозрѣвалъ, и эта ошибка дѣлаетъ его опытъ вполнѣ неточнымъ, такимъ-же плохимъ, какъ опытъ Фань-Гельмента съ горшкомъ и грязнымъ бѣльемъ: я Вамъ покажу, какимъ путемъ мыши забрались. Я докажу, что во всякомъ опытѣ подобнаго рода, слѣдуетъ абсолютно запретить употребленіе чашки со ртутью. Я, паконецъ, докажу Вамъ, что это ртуть вносить въ сосудъ зародыши, или скорѣе (чтобы мое выраженіе согласовалось съ доказаннымъ фактомъ) пыль, которая носится въ воздухѣ.»

Чтобы сдѣлать видимой ту пыль, которая носится въ воздухѣ, Пастеръ, удаливъ свѣтъ изъ зала, произилъ водворив-

шуюся темноту лучемъ свѣта. Тогда въ этомъ лучѣ появились, танцуя и кружась, тысячи мелкихъ пылинокъ.

«Если бы мы имѣли время слѣдить за ними — продолжалъ Пастеръ — то мы увидѣли-бы, что онѣ, хотя и дѣлаютъ различныя движения, все же болѣе или менѣе скоро падаютъ внизъ. Такимъ образомъ покрываются пылью всѣ предметы: эта мебель, этотъ столъ, ртуть въ этой чашѣ. Сколько пыли попало въ эту ртуть съ тѣхъ поръ, какъ она вышла изъ своего рудника, независимо отъ той, которая виѣдряется во внутрь металла безпрестанно, путемъ различныхъ манипуляцій, которымъ онъ подвергается въ лабораторії! Невозможно коснуться этой ртути, положить въ нее руку, стеклянку, не вводя во внутрь чаши пылинокъ, находящихся на поверхности. Вы тотчасъ увидите, какъ это происходитъ.»

Тогда, бросивъ среди глубокой тьмы лучъ свѣта на чашу со ртутью и на жидкій металлъ, представлявшій свой обычный блескъ, Пастеръ посыпалъ пылью ртуть. Затѣмъ онъ взялъ стеклянную палочку и погрузилъ ее во ртуть. Тогда пылинки тронулись и направились къ тому мѣсту, гдѣ была погружена стеклянная палочка. Всѣ онѣ проникли въ пространство между палочкою и ртутью.

«Да — воскликнулъ Пастеръ, дрожащимъ и суровымъ голосомъ, въ которомъ чувствовалась вся правота убѣжденнаго ученаго — да, г. Пушѣ удалилъ зародыши изъ воды, съна, но онъ не удалилъ тѣхъ пылинокъ, которыхъ находились на поверхности ртути. И вотъ гдѣ кроется причина ошибки, вотъ то, что опровергаетъ всю систему!»

Пастеръ произвелъ опыты, вполнѣ сходные съ тѣми, которые сдѣлалъ Пушѣ, но удаливъ абсолютно всѣ поводы къ ошибкамъ, которыхъ послѣдній не замѣтилъ. Онъ также взялъ стеклянныи шаръ, но съ длинной шейкою, которую онъ изогнулъ и сообщилъ съ платиновой трубкою, помѣщеною въ горнѣ, такъ что ее можно было нагрѣвать до высокой температуры, даже близкой къ красному каленію. Въ шаръ онъ вливалъ жидкости, весьма способныя къ гнѣнію, напр., мочу. Въ то время,

какъ дѣйствовалъ горнъ, окружавшій платиновую трубку, Пастеръ кипятилъ мочу въ теченіи нѣсколькихъ минутъ; потомъ онъ охлаждалъ жидкость, не удаляя огня, согрѣвавшаго платиновую трубку. Когда шаръ, содержащий мочу, охлаждался, вънѣшній воздухъ въ него входилъ, но предварительно прошелъ черезъ накаленную до красна платиновую трубку. При такихъ условіяхъ, моча приходила въ соприкосновеніе съ наимѣстѣмъ воздухомъ, но всѣ зародыши, которые только были въ немъ взвѣшены, были уже сожжены.

При произведенномъ подобнымъ образомъ опыте моча никогда не измѣняется, она только испытываетъ непосредственное и весьма слабое окисленіе, дѣлающее ея цвѣтъ нѣсколько насыщеннымъ, но никакимъ образомъ не переходитъ въ гненіе. Если желаютъ продѣлать этотъ опытъ съ щелочными жидкостями, какъ молоко, то температура кипѣнія должна быть нѣсколько высшая, что легко осуществить съ помощью аппарата, только что описаннаго. Нужно соединить свободный конецъ платиновой трубы съ стеклянouю трубкою, изогнутою подъ прямымъ угломъ и погруженную на нѣсколько дециметровъ въ глубокую чашу со ртутью, пока продолжается кипѣніе молока. Кипѣніе совершается тогда подъ высшимъ давленіемъ, нежели атмосферное, и, следовательно, при температурѣ выше 100 градусовъ.

Но еще надо было установить, что пыль, носящаяся въ воздухѣ, содержитъ зародыши низшихъ организмовъ. Пастеръ помѣстилъ въ трубку ватную пробку и втянулъ, съ помощью маленькаго насоса, воздухъ, который долженъ былъ пройти трубку, где онъ, такъ сказать, фильтровался, оставляя всю свою пыль на ватѣ. Взявъ тогда часовое стеклишко, Пастеръ налилъ на него каплю воды, въ которую погрузилъ на минуту пробку, и, когда вата сдѣлалась слегка влажною, размялъ ее и выдавилъ изъ нея на стеклянную пластинку загрязнившуюся каплю воды. Затѣмъ Пастеръ еще прибавилъ на стеклишко вторую и третью каплю и, такимъ образомъ, извлекъ и собралъ на пластинкѣ почти всю пыль, которая содержалась въ ватѣ. Если затѣмъ разсматривать подъ микроскопомъ каплю, взятую съ

пластиинки, то замѣчають кусочки сажи, питочки льна, шелка, бумаги, — все то, что можно было бы назвать мертвой пылью, и среди этой мертвой пыли появляются живыя пылинки, т. е. существа, принадлежащія растительному или животному царству, яйца инфузорій и споры тайнобрачныхъ. Зародыши, микроско-пическая животная, клочки плѣсени — все это находится рас-пространеннымъ въ воздухѣ и готово упасть въ подходящую для нихъ среду и быстро расплодиться.

Однако, вѣрно-ли то, что эти маленькия тѣла, которыхъ встрѣчаются среди аморфной пыли и которыхъ собираются на ватной пробкѣ, суть зародыши микроскопическихъ существъ? Если внесенная Пастеромъ въ опытъ Пуше поправка и без-упречна, то можетъ быть объясненіе, данное Пастеромъ, це строго доказательно. Въ виду вопроса о происхожденіи жизни, всѣ гипотезы были вѣроятны, пока истина не выяснилась въ полномъ свѣтѣ. Поэтому можно было возразить Пастеру: «Да, если воздухъ, содержащий зародыши, прошелъ черезъ платино-вую трубку, и затѣмъ пришелъ въ соприкосновеніе съ такою жидкостью, какъ моча, предварительно вскипяченная, то ясно, что этотъ воздухъ не вызоветъ ни броженія, ни гніенія, ни образованія организмовъ, потому что зародыши этихъ послѣднихъ, которые были взвѣшены въ воздухѣ, потеряли всю жизненную силу, когда они проходили черезъ накаленную до красна платиновую трубку. Но по какому праву Вы говорите о зародышахъ? Кто Вамъ сказалъ, что необходимо, какъ Вы пред-полагаете, предварительное существование зародышей для того, чтобы вызвать появление микроскопического существа въ гніющей или бродящей жидкости? Не можетъ-ли заключаться первый двигатель (*primum movens*) жизни микроскопическихъ существъ весь въ подходящей средѣ, приведенной въ дѣятельное состоя-ніе извѣстною жидкостью, магнетизмомъ, электричествомъ, даже озономъ? Пропуская воздухъ черезъ Вашу, накаленную до красна платиновую трубку, Вы разрушаете все это, и безплодіе Вашего шара съ мочею не представляется, поэтому, ничего удивительнаго».

Сторонники самопроизвольного зарожденія часто приводили это разсужденіе, казавшееся очень грознымъ. Поэтому Пастерь

счель необходимымъ подобрать еще больше, чѣмъ до того было, доказательствъ того, что ватная пробка, черезъ которую онъ фильтровалъ воздухъ, была дѣйствительно переполнена зародышами.

Придумавъ остроумныя экспериментальныя приспособленія, онъ посыпалъ ватные пробки, наполненные пылью изъ воздуха, въ вышеозначенныя жидкости, какъ напр. въ мочу, обезпложенную кипяченіемъ. Въ этихъ жидкостяхъ появлялась жизнь, даже въ большихъ размѣрахъ, чѣмъ если-бы онъ были подвергнуты свободному соприкосновенію съ атмосфернымъ воздухомъ. Изъ чего, однако, состояла эта пыль въ пробкахъ? Только изъ аморфныхъ частицъ шерсти, обрывковъ ваты, крахмала и, кроме того, изъ очень маленькихъ тѣлъ, которая по своей прозрачности и строенію сходны съ зародышами микроскопическихъ существъ. Ссылаясь на присутствіе какихъ-бы то ни было невѣсомыхъ жидкостей оказывалось, такимъ образомъ, невозможнымъ.

Опасаясь все таки, что можетъ явиться еще послѣднее сомнѣніе, не оказываетъ-ли вата, какъ органическое вещество, какое-либо вліяніе на оплодотвореніе настоевъ, Пастеръ замѣнилъ ватные пробки пробками изъ горнаго льна, предварительно накаленного до-красна. Результатъ оказался тотъ-же.

Пастеръ пожелалъ еще болѣе удалить всякую гипотезу о присутствії чего-либо неизвѣстнаго въ обыкновенномъ воздухѣ, что могло-бы, помимо всякаго микроскопического зародыша, обусловить жизнь и размноженіе бесконечно-малыхъ существъ. Онъ началъ рядъ простыхъ, но доказательныхъ опытовъ. Вливъ настой, легко подвергающійся порчѣ, иначе говоря, весьма благопріятный появленію микроскопическихъ существъ, въ стеклянныи шаръ съ длинной шейкою, онъ вытянулъ эту шейку на паяльной трубкѣ такъ, что она пріобрѣла очень маленький діаметръ, и въ тоже время онъ движениемъ руки, передаваемымъ расплавленному стеклу, сдѣлалъ ее извилистою, подобно лебединной шеѣ. Окончность этой шейки осталась открытою. Онъ затѣмъ подвергъ жидкость въ теченіи нѣсколькихъ минутъ ки-

пачею, пока изъ оконечности шейки водяные пары не начали выходить въ изобилии. При этихъ условіяхъ, жидкость въ шарѣ, какъ бы она склонна не была къ гиенію, сохраняется безкапчно безъ всякаго измѣненія. Можно даже брать шаръ въ руки, переносить съ мѣста на мѣсто, подвергать всѣмъ перемѣнамъ температуры временъ года, помѣщать въ теплое мѣсто съ температурою отъ 30 до 40 градусовъ: жидкость остается прозрачною, какъ въ первое время. Едва обнаруживается слабое непосредственное окисленіе, чисто химическое, въ составныхъ частяхъ жидкости. Внѣшній воздухъ, вступая съ силою въ первыя минуты, скоро попадаетъ въ шаръ, но встрѣчасть жидкость съ температурою, близкой къ кипѣнію. Когда-же жидкость настолько охладилась, что не можетъ болѣе лишать зародышей ихъ жизненности, то вступленіе воздуха уже совершается медленно, и зародыши, способные дѣйствовать на жидкость и вызвать появленіе организованныхъ продуктовъ, отлагаются въ еще влажныхъ извилинахъ, не приходя въ соприкосновеніе съ жидкостью.

Если послѣ недѣль, мѣсяцевъ и даже нѣсколькихъ лѣтъ пребыванія въ тепломъ мѣстѣ отдать движеніемъ напилника шейку шара въ ея части, оставшейся горизонтальною, то плѣсень, мукоры, бактеріи начинаютъ показываться послѣ двадцати четырехъ или сорока восьми часовъ, совершенно также, какъ если-бы это были свѣжіе настои, подвергающіеся соприкосновенію съ обыкновеннымъ воздухомъ. Тѣ-же опыты могутъ быть продѣланы съ жидкостями, нѣсколько щелочными, каково молоко, — только надобно вскипятить молоко при температурѣ выше 100 градусовъ.

Великій интересъ метода Пастера состоитъ въ томъ, что онъ окончательно и неопровергимо доказываетъ, что происхожденіе жизни въ настояхъ, которые доводились до кипѣнія, исключительно зависитъ отъ плотныхъ частичекъ, находящихся въ взвѣшенномъ состояніи въ воздухѣ. Ни газы, ни различные жидкости, ни электричество, магнетизмъ, озонъ, ни разныя извѣстныя и неизвѣстныя вещи — ничто въ обыкновенномъ атмосферномъ воздухѣ не въ со-

стояніи вызвать гніенія или броженія настоевъ, кроме этихъ взвѣшенныхъ плотныхъ частичекъ.

Наконецъ, чтобы окончательно убѣдить самые предубѣжденные умы и не оставить неопровергнутымъ ни одного противорѣчія, Пастеръ показалъ одинъ изъ тѣхъ шаровъ съ извилистой шейкою, которые онъ приготовилъ и сохранилъ въ теченіи мѣсяцевъ и лѣтъ. Шаръ былъ покрытъ пылью.

«Если — сказалъ онъ — Вы снимете немного этой наружной пыли осколкомъ фарфора, стекла или платины и доведете ее до жидкости такимъ образомъ, что вы вложите маленький осколокъ, на которомъ пыль сидѣть, въ извилистую шейку и, осторожно опрокинувъ шаръ, заставите осколокъ упасть въ жидкость, то на другой день настой, бывшій совершенно прозрачнымъ, помутится и измѣнится, подобно настоямъ, приведеннымъ въ соприкосновеніе съ обыкновеннымъ воздухомъ.»

Если опрокинуть шаръ такъ, чтобы капелька настоя приблизилась къ оконечности изогнутой части шейки, къ тому мѣсту, где осѣли пылинки, и затѣмъ возвратить эту капельку обратно въ шаръ для того, чтобы она пришла въ соприкосновеніе съ настоемъ, то результатъ будетъ такимъ-же. Порча произойдетъ, микроскопическіе организмы размножатся. Наконецъ, если взять одинъ изъ этихъ шаровъ, не подвергшихся никакой порчѣ въ теченіи мѣсяцевъ и лѣтъ, и сильно встряхнуть, такъ, чтобы виѣшній воздухъ вступилъ въ большомъ количествѣ и съ силою, и если, послѣ пѣсколькихъ подобныхъ встряхиваній, помѣстить шаръ въ теплое мѣсто, то жизнь тотчасъ проявится.

Въ 1860 г. Академія Наукъ назначила премію, условія которой она опредѣлила въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

«Пролить новый свѣтъ на вопросъ о самопроизвольномъ зарожденіи съ помощью хорошо обставленныхъ опытовъ». Академія прибавляла, что она требуетъ точныхъ и строгихъ опытовъ, изученныхъ при различныхъ условіяхъ, однимъ словомъ, такихъ опытовъ, изъ которыхъ можно было бы вывести результаты, свободные отъ всякой путаницы, вытекающей изъ этихъ-же

опытовъ. Пастеръ получилъ премію и, надо признаться, никто не заслужилъ ее больше, чѣмъ онъ. Однако, въ его глазахъ предметъ еще представлялъ нѣкоторыя неясности. Въ горячихъ спорахъ, которые вызывалъ вопросъ о самопроизвольномъ зарожденіи, сторонники ученія о жизні безъ зародышей приводили постоянно одно возраженіе, опиравшееся на общераспространенное мнѣніе, господствовавшее со времени знаменитой работы Ге-Люссака относительно консервовъ Аппера. Ге-Люссакъ пришелъ къ заключенію, что для консервированія животныхъ и растительныхъ веществъ по способу Аппера обязательно было отсутствие кислорода.

«Можно въ этомъ убѣдиться, — говорилъ онъ — если подвергнуть анализу воздухъ изъ бутылокъ, въ которыхъ заключаются консервированные вещества. Въ немъ нѣтъ больше кислорода и, стало быть, отсутствие этого газа есть необходимое условіе для сохраненія животныхъ и растительныхъ веществъ.»

Вскорѣ это предположеніе окрѣпло еще болѣе, и въ наукѣ сдѣлалось ходачимъ мнѣніемъ, что малѣйший пузырекъ кислорода или воздуха, приведенный въ соприкосновеніе съ консервомъ, былъ въ состояніи вызвать его порчу. Вслѣдствіе этого сторонники самопроизвольного зарожденія, гетерогенисты, формулировали свои возраженія Пастеру въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «какимъ образомъ Вы допускаете существование такого количества зародышей микроскопическихъ существъ, что всякий самомалѣйший пузырекъ воздуха содержитъ зародыши, могущіе развиться во вскихъ органическихъ настоихъ? Если-бы такъ было, то воздухъ былъ-бы запруженъ органическими зародышами.» Пуще говорилъ и писалъ, что тогда въ воздухѣ стоялъ-бы густой туманъ — «плотный, какъ желѣзо».

Но Пастеръ доказалъ, что объясненіе, данное опыту Ге-Люссака, и слѣдствіе, изъ него выведенное, о возможности порчи консервовъ маленькимъ количествомъ кислорода, были ошибочны. Ге-Люссакъ ошибся, говоря, что отсутствие кислорода есть необходимое условіе для консервированія. Если, по прошествіи нѣкотораго времени, консервъ Аппера и не содер-

житъ кислорода, то это, весьма просто, зависить отъ того, что этотъ кислородъ поглощается мало-по-малу составными частями консерва, всегда болѣе или менѣе расположеными къ химическому окислению; но, въ дѣйствительности, весьма легко имѣть консервы Аппера съ большимъ или меньшимъ количествомъ кислорода въ сосудахъ. Пастеръ не замедлилъ убѣдиться, что объясненіе, данное опыту Ге-Люссака, грѣшило и въ другомъ пунктѣ. Онъ убѣдился въ ложности мнѣнія, что маленькое количество воздуха способно вызвать всегда развитіе микроскопическихъ организмовъ.

Болѣе распространенные въ городахъ, нежели въ поляхъ, зародыши становятся болѣе рѣдкими по мѣрѣ того, какъ удаляться отъ жилищъ. На горахъ ихъ меньше, чѣмъ въ долинахъ, и, начиная съ извѣстной высоты, они становятся и вовсе рѣдкими.

Опыты, произведенныя Пастеромъ для того, чтобы сдѣлать эти факты очевидными, были крайне несложны. Онъ взялъ рядъ шаровъ, вмѣстимостью приблизительно въ $\frac{1}{4}$ литра, и вытянулъ ихъ шейки на паяльной трубкѣ, предварительно наполнивъ ихъ до половины жидкостью, подвергенною гнѣнію. Затѣмъ онъ кипятилъ жидкость въ теченіи нѣсколькихъ минутъ и во время кипяченія, когда паръ съ силою выходилъ изъ тонкой части шейки, онъ замыкалъ эту тонкую часть при помощи паяльной трубки. Такимъ образомъ изготовленные, шары легко могутъ быть переносимы. Вслѣдствіе того, что въ нихъ нѣтъ воздуха, такъ какъ заключавшійся въ нихъ въ началѣ былъ изгнанъ водяными парами, вѣшній воздухъ, въ моментъ когда отламываются ихъ тонкій конецъ, бурно устремляется въ нихъ со всѣми взвѣщенными въ немъ зародышами. Если ихъ опять запереть, проведши черезъ пламя, и затѣмъ предоставить ихъ самимъ себѣ, то легко отличить тѣ шары, которые подвергаются порчу. Пастеръ констатировалъ, что каково-бы ни было мѣсто, въ которомъ опытъ производился, извѣстное количество шаровъ совсѣмъ не портилось. Не слѣдовало, однако, открывать ихъ въ помѣщеніи, гдѣ только-что была поднята пыль, напри-

мѣръ, послѣ того какъ чистили щеткою мебель или подметали комнату. Въ этихъ случаяхъ всѣ шары портились, вслѣдствіе большаго количества поднятыхъ и взвѣшенныхъ въ воздухѣ зародышей.

Пастеръ отправился съ запасомъ шаровъ въ Арбуа. Часть изъ нихъ онъ открылъ въ полѣ, далеко отъ жилищъ, часть у подножья возвышеностей, составляющихъ первое плоскогорье Юры; третья серія въ двадцать шаровъ была открыта на горѣ Пупэ, 850 метровъ надъ уровнемъ моря, и, наконецъ, двадцать шаровъ были перенесены на Монтанверъ, близъ Меръ-де-глѣсъ на высотѣ 2000 метровъ. Онъ отвезъ потомъ всю свою коллекцію въ Парижъ и, въ ноябрѣ 1860 г., представилъ ихъ въ бюро Академіи Наукъ.

Изъ двадцати первыхъ шаровъ, открытыхъ въ полѣ, восемь содержало организованные продукты. Изъ двадцати, открытыхъ на плоскогорье Юры, только пять было испорчено, и, наконецъ, изъ послѣднихъ двадцати, открытыхъ на Монтанверѣ при довольно сильномъ вѣтре, дувшемъ изъ глубокихъ ущелій ледника, только одинъ былъ испорченъ.

Если сдѣлать подобный рядъ опытовъ на аэростатѣ, то легко можно убѣдиться, что воздухъ высшихъ слоевъ атмосферы совершенно лишенъ зародышей. Само-собою разумѣется, что надоѣно принять мѣры, чтобы предохранить себя отъ пылинокъ, могущихъ быть занесенными на снастяхъ аэростата и самими воздухоплавателями.

Но мы еще не разсказали обо всемъ. До сихъ поръ всѣ эти столь убѣдительные опыты касались лишь органическихъ жидкостей, хотя и весьма склонныхъ къ порчу, но которыхъ подвергались температурѣ кипѣнія или даже температурѣ выше 100 градусовъ. Сторонники самопроизвольного зарожденія могли считать себя вправѣ сказать, что если-бы приводили въ соприкосновеніе съ чистымъ воздухомъ натуральныя органическія жидкости въ томъ состояніи, какъ ихъ приготовила растительная и животная жизнь, то дѣло вышло бы иначе. Тогда только жизнь проявилась-бы самопроизвольнымъ зарожденіемъ микроскопическихъ существъ.

Ни одинъ изъ противниковъ Пастера не формулировалъ этого аргумента; но Пастеръ, который въ себѣ самомъ имѣть противника, всегда присутствующаго, всегда на сторожѣ, уступающаго только силѣ собранныхъ доказательствъ, — самъ себѣ сдѣлалъ это возраженіе. Онъ только тогда успокоился, когда ему удалось опровергнуть его вполнѣ. Освободивъ — при помощи остроумныхъ экспериментальныхъ приспособленій — воздухъ отъ всѣхъ живыхъ зародышей, онъ привелъ въ соприкосновеніе съ этимъ чистымъ воздухомъ жидкости, наиболѣе подверженныя гніенію, а именно — венозную или артеріальную кровь, или мочу. Жидкости эти онъ извлекалъ прямо изъ венъ, артерій и мочеваго пузыря совершенно здоровыхъ животныхъ. Никакого разложения не послѣдовало. Постепенно совершалось химическое поглощеніе маленькихъ количествъ кислорода, но не появилось ни броженія, ни гніенія, ни малѣйшаго развитія бактерій, вибріоновъ и плѣсени. Только тогда Пастеръ могъ на законномъ основаніи воскликнуть въ своей знаменитой лекціи въ Сорбоннѣ:

«Нѣтъ, въ настоящее время не существуетъ ни одного обстоятельства, допускающаго мысль, что микроскопическія существа появляются на свѣтѣ безъ зародышей, безъ сходныхъ съ ними предковъ. Тѣ, которые утверждаютъ это, были жертвою заблужденія, дурно произведенныхъ опытовъ, переполненныхъ ошибками, которыхъ они не могли замѣтить или избѣжать. Самопроизвольное зарожденіе не больше, какъ химера.»

Пастеръ не былъ единственнымъ, высказавшимъ такое рѣшительное убѣжденіе. Флурансъ, постоянный секретарь Академіи Наукъ, произнесъ однажды передъ всею Академіею слѣдующія слова, съ авторитетомъ предсѣдателя суда, произносящаго приговоръ:

«Пока у меня не составилось мнѣнія, я ничего не говорилъ; теперь оно составилось — и я его высказываю. Опыты должны быть признаны рѣшительными. Если самопроизвольное зарожденіе дѣйствительно существуетъ, то что требуется для того, чтобы получить микроскопическихъ животныхъ? Воздуха и жидкостей, подверженныхъ гніенію. Но Пастеръ соединяетъ воздухъ и эти

жидкости—и ничего не происходитъ. Слѣдовательно, самопроизвольного зарожденія нѣтъ. Сомнѣваться еще въ этомъ — значитъ не понимать вопроса.»

Но нѣкоторые противники еще сомнѣвались. Когда Пастеръ заявилъ о результатахъ своихъ опытовъ и представилъ Академіи серіи своихъ шаровъ, Пуше и Жоли заявили, что если Пастеръ открывалъ свои шары на Юрѣ и Мерѣ-де-Гласѣ, то они были на Маладетта, и что результаты Пастера не были вѣрны.

Пастеръ потребовалъ судей у Академіи. Одна только комиссія рѣшила споръ. Комиссія была назначена и, съ одной и другой стороны, позиціи были заняты.

«Я утверждаю,—объявилъ Пастеръ,—что во всякомъ мѣстѣ можно найти среди атмосферы извѣстный объемъ воздуха, не содержащей ни яицъ, ни споръ и не вызывающей никакой жизни въ растворахъ, способныхъ къ гніенію».

Жоли, съ своей стороны, писалъ: «Если только одинъ изъ Вашихъ шаровъ останется неиспорченнымъ, то мы прямодушно признаемъ наше пораженіе.» Наконецъ Пуше, столь-же откровенный, столь-жѣ убѣжденный, какъ и Пастеръ, сказалъ: «Я утверждаю, что гдѣ я не взялъ бы кубической дециметръ воздуха, какъ только я его приведу въ соприкосновеніе съ подверженной гніенію жидкостью, заключенною въ герметически закрытой колбѣ, послѣдняя всегда наполнится живыми организмами».

Это двойное заявленіе, волновавшее въ то время весь научный міръ, происходило въ январѣ 1864 г. Торопясь приступить къ дѣлу, Пастеръ ожидалъ съ нетерпѣніемъ времени, когда комиссія назначить это изслѣдованіе воздуха, которое должно было все рѣшить; но Пуше ходатайствовалъ объ отсрочкѣ, желая, какъ онъ говорилъ, дождаться времени наступленія жаровъ Пастеръ. удивился, но рѣшился, однако, подождать. 15-го іюня комиссія и противники встрѣтились.

«Такъ какъ весь споръ вертится около одного простаго факта — объявила комиссія — то одинъ только опытъ долженъ быть произведенъ, и имъ однимъ заключится споръ.»

Несмотря на эту оговорку, сторонники самопроизвольного зарожденія пожелали начать съизнова весь рядъ своихъ опы-

товъ. Напрасно комиссія пыталась доказать имъ, что это про-
длило-бы судъ такъ же надолго, какъ тянулся и самъ споръ,
и повторила еще разъ, что дѣло было въ одномъ фактѣ и,
чтобы установить этотъ фактъ, достаточно было одного лишь
опыта, — гетерогенисты ничего и слышать не хотѣли. Пуше и
Жоли удалились.

«Несомнѣнно, — рассказывалъ Жаменъ, правдивый и свѣ-
дущій историкъ этихъ споровъ, — что гетерогенисты сами себя
осудили, какъ-бы они ни старались объяснить свое удаленіе.
Если-бы они были увѣрены въ фактѣ, который они торжест-
венно взялись доказать, подъ опасеніемъ быть признанными
побѣжденными, они постарались-бы это сдѣлать, такъ какъ
это было-бы торжествомъ ихъ ученія. Только въ тѣхъ вопро-
сахъ, въ которыхъ человѣкъ не увѣренъ, онъ даетъ себя осу-
дить заочно, удаляясь отъ вызова.»

Ученіе о винѣ.

Покончивши, такимъ образомъ, съ вопросомъ о самопроиз-
вольномъ зарожденіи, который былъ лишь побочнымъ вопро-
сомъ, какъ-бы навязаннымъ его уму, — Пастеръ опять вер-
нулся къ броженіямъ. Руководимый своими послѣдними изслѣ-
дованіями обѣ уксусѣ и другими болѣе мелкими наблюденіями,
онъ предпринялъ изслѣдованіе причинъ, вызывающихъ болѣзни
вина. Объясненія этихъ измѣненій въ томъ видѣ, какъ ихъ въ
то время давала наука, покоились только на гипотезахъ. Всѣ,
начиная отъ Шаптала и кончая Либихомъ и Берцеліусомъ, ду-
мали, что вино есть жидкость, различныя составныя части ко-
торой находятся въ постоянномъ и медленномъ взаимодѣйствіи.
Вино — обыкновено говорили — безпрестанно измѣняется.
Когда броженіе виноградного сока уже закончилось, равновѣсіе
между различными составными частями жидкости еще не уста-
новлено. Для того, чтобы эти составныя части слились другъ
съ другомъ, требуется еще время. Если развитіе взаимодѣйствія
идеть неправильно, то вино заболѣваетъ. Иначе говоря, это
было то же ученіе о самопроизвольности. Эти сужденія, такъ

какъ они не опирались на доказательныхъ опытахъ, не могли удовлетворить Пастера, послѣ того какъ онъ съ очевидностью доказалъ, что ничего не существуетъ самопроизвольнаго, какъ въ явленіяхъ броженія, такъ и въ настоящихъ и органическихъ жидкостяхъ животнаго или растительнаго происхожденія.

Пастеръ прежде всего показалъ, что вино не столько измѣняется, сколько предполагали. Несомнѣнно, что въ винѣ, которое представляетъ смѣсь различныхъ веществъ, между которыми находятся кислоты и алкоголь, должны современемъ образовываться сложные эфиры и должны развиваться различные реакціи между другими одновременно находящимися въ жидкости составными частями. Невозможно было отвергать справедливости этихъ фактовъ, основанныхъ на общихъ законахъ, подтвержденныхъ и разслѣдованныхъ новѣйшими работами. Но, по мнѣнію Пастера, изъ этихъ фактовъ дѣлали ложное примѣненіе, когда ими хотѣли объяснить старѣніе и болѣзни винъ, однимъ словомъ, всѣ тѣ главныя измѣненія хорошаго и дурнаго свойства, которыя, очевидно, совершаются въ винахъ. Вскорѣ ему сдѣлалось ясно, что старѣніе вина существенно обусловливается явленіями окисленія въ зависимости отъ кислорода воздуха, который растворяется и проникаетъ въ вино. Онъ представилъ очевидныя тому доказательства. Я здѣсь приведу только одно изъ нихъ. Молодое вино, если его влить въ стекляній сосудъ, герметически закупоренный, сохраняетъ свой кислый вкусъ; оно не улучшается, оно не старѣетъ. Кромѣ того, Пастеръ указалъ на то, что технические пріемы винодѣлія — всѣ имѣютъ въ виду необходимость: съ одной стороны, окисленія вина до надлежащей степени, и съ другой, предохраненія его отъ порчи. Что касается самихъ причинъ этой порчи, то Пастеръ, всегда слѣдя предвзятой идеѣ и затѣмъ стараясь ее контролировать со всею строгостью экспериментальнаго метода, задалъ себѣ вопросъ, не находятся ли болѣзни вина въ зависимости отъ организованныхъ ферментовъ, отъ маленькихъ микроскопическихъ растеній. Въ этой порчѣ, думалось ему, должны быть замѣщаны вліянія, чуждыя нормальному составу вина.

Это предположение оправдалось. Подъ его руками обнаружилось, что порча винъ соотвѣтственно зависитъ отъ присутствія и размноженія микроскопическихъ растеній. Эти растенія, встрѣчая въ винѣ условія, благопріятствующія ихъ развитію, портить его, извлекая изъ него собственно для нихъ необходимую пищу, или, главнымъ образомъ, потому, что образуютъ новые продукты, которые представляютъ собою самый результатъ размноженія этихъ паразитовъ въ винѣ.

Весь свѣтъ знаетъ, что такое *кислое вино*, *острое вино*, *скисшее вино*. Прежніе опыты Пастера самымъ яснымъ образомъ доказали, что никогда еще не встрѣчалось какого-либо количества вина, которое сдѣлалось бы кислымъ, острымъ, словомъ, превратилось бы въ уксусъ, безъ того чтобы здѣсь не присутствовалъ маленький микроскопической грибокъ, обозначенный имѣнемъ *грибной пленки*. Это маленькое растеніе и есть необходимый посредникъ закисанія, сгущенія кислорода воздуха и его притяженія къ алкоголю вина, когда послѣднее превращается въ уксусъ. Шапталь, опубликовавшій цѣлую книгу объ искусствѣ винодѣлія, зналъ о существованіи этого уксуснаго цвѣта, но это въ его глазахъ были лишь «зачатки растительности», вліяніе которыхъ на качество жидкостей ничѣмъ не давало себя чувствовать. Кромѣ *уксусной пленки* которая представляетъ признакъ закисанія, существуетъ еще грибокъ именуемый *винной пленкой* или *цельтомъ*. Послѣдняя, сама по себѣ, не вносить ничего вреднаго, и развивается предпочтительно на молодыхъ винахъ, еще не устоявшихся, сохранившихъ еще вяжущія свойства, которыя они имѣли въ первое время послѣ ихъ фабрикаціи. Потребности этихъ двухъ сортовъ пленокъ настолько различны, что если даже посѣять уксусный цвѣтъ (*mucoderma aceti*) на поверхности молодаго вина, то развитія его не воспослѣдуется. Обратно, *винная пленка*, будучи посѣяна на винахъ, состарившихся въ бочкахъ или бутылкахъ, также не разовьется. *Винная пленка*, нисколько не портить вина, отъ ея присутствія оно не дѣлается кислымъ. По мѣрѣ того, какъ вино старѣеть, винный цвѣтъ (*mucoderma vini*) начинаетъ исчезать — вино «обнажается», какъ говорится спе-

циальнымъ терминомъ. Говоря физиологически, вино теряетъ свою способность питать *винную пленку*, которая, постепенно лишаясь нужной ей пищи, увядаетъ и атрофируется. Но именно въ это время можетъ появиться *уксусный цвѣтъ* и развиться съ тѣмъ большею легкостью, что она свою первую пищу черпаетъ довольно долго въ самихъ клѣткахъ *винного цвѣта*. Объ *уксусной пленке*, столь много говорилось на первыхъ страницахъ этой книги, что не представляется надобности опять къ ней вернуться.

Есть еще одна, весьма обыкновенная, болѣзнь, поражающая вина, когда сильный лѣтній жаръ начинаетъ чувствоватьться въ погребахъ. Тогда говорить, что вина *испортились, взошли, имѣютъ порчу*. Вино слегка мутится и приобрѣтаетъ вкусъ приторный и въ то же время острый. Если его вливаютъ въ стаканъ, то маленькие и очень нѣжные пузырьки газа подымаются къ поверхности, гдѣ образуютъ какъ-бы вѣнчикъ. Держа стаканъ между глазами и свѣтомъ, можно различить, при малѣйшемъ движеніи, шелковистыя струйки, перемѣщающіяся и движущіяся въ жидкости въ различныхъ направленихъ. Если вино, которое портится, заключается въ бочкахъ, то нерѣдко замѣчается, что дно бочки нѣсколько выпячивается, а иногда происходитъ просачивание на мѣстахъ связей клепокъ. Если проѣлать втулочное отверстіе, то вино бьетъ ключемъ, почему эта болѣзнь вина и называется «*la poussée*».

Авторы, писавшіе о винѣ, приписывали эту болѣзнь подымающимся вверхъ подонкамъ. Они полагали, что осадокъ, постоянно существующій въ большемъ или меньшемъ количествѣ въ самыхъ нижнихъ частяхъ бочки, подымается и распространяется по всей массѣ вина.

Это совершенно невѣрно. Если иногда и совершается это явленіе, т. е. осадокъ подымается въ массу вина, то причиною его бываетъ внезапное уменьшеніе атмосферного давленія, напр. во время грозы. Такъ какъ вино, съ момента своего броженія, содержитъ въ растворенномъ видѣ много угольной кислоты, то понятно, что пониженіе барометрическаго давленія освобождаетъ пузырьки угольной кислоты. Эти пузырьки, подымаясь изъ самой

нижней части бочки, могутъ приподнять тогда часть осадка, который смѣшиваются съ виномъ и дѣлаетъ его мутнымъ. Но дѣйствительная причина болѣзни, которая, собственно говоря, называется болѣзнью «свернувшагося (испорченаго) вина», зависитъ отъ совершенно другихъ условій. Муть эта всегда, безъ исключенія, зависитъ отъ присутствія маленькихъ, чрезвычайно тонкихъ ниточекъ; онѣ имѣютъ приблизительно $\frac{1}{1000}$ миллиметра въ диаметрѣ. Длина ихъ весьма различная. Это онѣ образуютъ при взбалтываніи вина шелковистыя струйки,двигающіяся въ различныхъ направленіяхъ. Часто осадокъ въ бочкѣ оставляетъ множество этихъ очень длинныхъ ниточекъ, впутанныхъ однѣ въ другія и образующихъ липкую массу, которая оказывается подъ микроскопомъ состоящей только изъ этихъ маленькихъ ниточекъ. Дѣйствуя на нѣкоторыя составныя части вина, въ особенности на винный камень, этотъ ферментъ освобождаетъ угольную кислоту. То явленіе, что при открытіи бочки вино бываетъ ключемъ, происходитъ оттого, что при закрытой бочкѣ внутреннее давленіе увеличивается отъ образования угольной кислоты. Равнымъ образомъ, этимъ объясняется шипѣніе и вѣнчикъ изъ маленькихъ пузырьковъ газа, когда испорченное вино вливается въ стаканъ. Однимъ словомъ, болѣзнь «испорченаго вина» — ни что иное, какъ броженіе, вызванное организованнымъ ферментомъ, который, безъ всякаго сомнѣнія, первоначально происходитъ изъ зародышей, захваченныхъ съ поверхности виноградныхъ кистей или изъ нѣкоторыхъ испорченныхъ ягодъ винограда, которые попадаются во время уборки. Въ весьма рѣдкихъ случаяхъ не находятъ этого паразита въ осадкѣ вина на днѣ бочки, но этотъ паразитъ лишь тогда вреденъ, когда онъ размножается въ очень большомъ количествѣ. Чтобы воспрепятствовать этому размноженію, Пастеръ придумалъ весьма простое предохранительное средство, одинаково примѣнимое и къ другимъ болѣзнямъ вина, — болѣзни горечи и болѣзни сущенія.

Множество винъ приобрѣтаетъ съ возрастомъ вкусъ горечи, болѣе или менѣе выраженный, иногда до такой степени, что они становятся негодными къ употребленію. Всѣ красныя

вина, безъ исключенія, подвержены этой болѣзни; но предпочтительно она поражаетъ вина лучшихъ лозъ и въ особенности самыя тонкія вина Коть-Дора. И эта работа опять таки совершается маленькими нитевидными грибками. И они не только производятъ горечь въ винѣ, которая мало-по-малу лишаетъ его всѣхъ достоинствъ, но еще, кромѣ того, образуютъ осадокъ въ бутылкахъ, который никогда не пристаетъ къ стеклу и дѣлаетъ мутнымъ все вино. Въ этомъ именно осадкѣ и носятся ниточки этого грибка.

Если бѣлая вина не такъ боятся болѣзни горечи, то они расположены, и въ особенности бѣлая вина бассейна Луары и Орлеана, къ болѣзни сгущенія. Вино теряетъ свою прозрачность; оно дѣлается невкуснымъ и приторнымъ; оно тянется, какъ масло. Болѣзнь проявляется какъ въ бочкахъ, такъ и въ бутылкахъ, наилучшимъ образомъ закупоренныхъ. Пастеръ уѣдился, что сгущеніе вина производится также особыеннымъ ферментомъ, который подъ микроскопомъ представляется въ видѣ ниточекъ, подобно ферментамъ прежде описанныхъ болѣзней, но отличающихся по своему строенію и физіологическому дѣйствію на вино.

Вкратцѣ, послѣ наблюдений Пастера порча вина не должна ни въ какомъ случаѣ быть приписана естественнымъ реакціямъ среди его составныхъ частей, которые происходили-бы вслѣдствіе извѣстнаго внутренняго и вполнѣ самопроизвольнаго движенія, и на которыхъ вліяли-бы лишь перемѣны температуры и атмосфернаго давленія. Порча эта, напротивъ, находится въ исключительной зависимости отъ развитія микроскопическихъ организмовъ, зародыши которыхъ существуютъ въ винѣ съ момента первоначального броженія, когда это вино только приготавлялось. Какое изобиліе зародышей всякаго рода вводится въ винодѣльческій чанъ! Какихъ измѣненій не встрѣчается въ листьяхъ, въ той или другой ягодѣ испорченного винограда! Сколько различныхъ органическихъ пылинокъ на вѣточкахъ гроздей, на поверхности ягодъ, на приборахъ, употребляемыхъ винодѣлами! Сколько различного рода плѣсени! Множество этихъ зародышей очевидно остается бесплодными въ винѣ, составъ котораго, въ

одно и то же время кислый, алкогольный и не содержащий воздуха, такъ мало способствуетъ жизни. Но слѣдуетъ ли удивляться, что нѣкоторые изъ этихъ вѣнчихъ, столь многочисленныхъ зародышей, обладающихъ въ больше или меньше выраженной степени характеромъ анаэробіи, — находять въ томъ или другомъ состояніи вина подходящія условія для своего существованія и размноженія?

Причина всѣхъ этихъ измѣненій была найдена. Оставалось воспрепятствовать развитію всѣхъ этихъ паразитовъ. Первые попытки Пастера имѣли предметомъ подысканіе такихъ веществъ, которыя, не обладая особыеннымъ запахомъ и вкусомъ, въ то же время были бы и безвредны, но присутствіе которыхъ противилось бы жизни этихъ болѣзненныхъ ферментовъ. Успѣхъ, на этой дорогѣ, былъ въ зависимости отъ слишкомъ многихъ условій, чтобы его легко было осуществить. Послѣ многихъ безплодныхъ попытокъ, Пастеръ напалъ на мысль прибѣгнуть къ дѣйствію высокой температуры. Онъ не замедлилъ убѣдиться въ томъ, что достаточно нагрѣть вино, въ теченіи нѣсколькихъ только минутъ, до температуры въ 55 или 60 градусовъ, чтобы предохранить его отъ всякой послѣдовательной порчи. Сначала его опыты касались болѣзни горечи. Онъ досталъ вина лучшихъ Бургундскихъ лозъ, вина Бонскія и Помарскія различныхъ годовъ — 1858, 1862 и 1863. Двадцать пять бутылокъ были оставлены стоямъ въ теченіи сорока восьми часовъ, чтобы дать возможность всѣмъ взвѣшенному въ винѣ маленькимъ плотнымъ частицамъ осесть. Какъ-бы прозрачно ни было вино, оно всегда образуетъ осадокъ, хотя и слабый. Пастеръ затѣмъ слилъ съ осадка вино съ тщательной осторожностью, при помощи сифона съ весьма слабой тягой. Эта послѣдняя предосторожность была необходима, чтобы не приподнять и не увлечь образовавшагося осадка. Когда въ каждой бутылкѣ не оставалось болѣе одного кубического сантиметра жидкости, Пастеръ взбалтывалъ бутылку, чтобы осадокъ распредѣлился въ этомъ маленькомъ количествѣ жидкости, потомъ изслѣдовалъ послѣдовательно подъ микроскопомъ каждый изъ этихъ бутылочныхъ остатковъ. Онъ ясно замѣчалъ присутствіе нѣкоторыхъ ниточекъ ферментовъ. Вина,

однако, не обнаруживали ни малейшаго вкуса горечи. Но зародышъ возможной болѣзни тамъ находился, и легко понять, что болѣзнь дастъ себя знать вкусу лишь тогда, когда маленькой грибокъ достигнетъ достаточно большого развитія.

Пастеръ подогрѣлъ тогда, не откупоривая, по бутылкѣ изъ каждого сорта этихъ Бонскихъ и Помарскихъ винъ. Нагреваніе совершалось до 60 градусовъ. По охлажденіи этихъ бутылокъ, онъ ихъ помѣстилъ въ горизонтальномъ положеніи, рядомъ съ не нагрѣтыми бутылкамиъ этихъ же винъ, также лежавшими горизонтально. Тѣ и другія оставались въ погребѣ, температура котораго въ лѣтнєе время колебалась между 13 и 17 градусами. Черезъ каждые пятнадцать дней Пастеръ приходилъ производить осмотръ. Не откупоривая бутылокъ, онъ ихъ подымалъ такимъ образомъ, чтобы можно было, помѣстивъ бутылки между глазомъ и свѣтомъ, разматривать желобокъ ихъ дна и констатировать самомалѣйшее образованіе осадка. Менѣе чѣмъ въ шесть мѣсяцевъ, въ особенности въ винахъ 1863 г., началъ образовываться во всѣхъ не нагрѣтыхъ бутылкахъ очень явный колеблющійся осадокъ. Осадокъ этотъ постепенно увеличивался. При изслѣдованіи подъ микроскопомъ, осадокъ оказался состоящимъ изъ организованныхъ ниточекъ, иногда смѣшанныхъ съ небольшимъ количествомъ красящаго вещества, осѣвшаго изъ раствора. Въ нагрѣтыхъ бутылкахъ не появилось никакого осадка.

Первоначальная идея о нагреваніи винъ не принадлежитъ Пастеру. Тѣ, кто любятъ доискиваться, кому принадлежитъ честь первого открытия, найдутъ въ работахъ латинскихъ агрономовъ различные способы сохраненія винъ, основанные всѣ на примѣненіи высокой температуры. Иногда, чтобы сохранить вино на долго, прибавляли къ нему, во время его приготовленія, различныя количества варенаго винограднаго сока, доведеннаго до половины или двухъ третей своего объема, въ которомъ настаивались: касатикъ, мирра, корица, древесная смола и другія снадобья. Но если ссылаться на болѣе близкіе примѣры, то Апперъ, консервы котораго стали такъ популярны, разсказываетъ, что онъ послалъ въ Санть-Доминго нѣсколько

бутылокъ Бонского вина, предварительно нагрѣтыхъ въ водяной банѣ до 70 градусовъ, и сравнилъ, по ихъ возвращеніи во Францію, двѣ бутылки этого вина съ бутылкою этого-же вина, оставшееся въ Гаврѣ, и одною бутылкою того-же вина, оставшееся въ его погребѣ — двѣ послѣднихъ не подверглись операциіи нагрѣванія. Превосходство вина, возвратившагося изъ Санть-Доминго, было неоспоримо. Ничто не могло сравниться съ его тонкостью и его букетомъ. Но Апперъничъ не упоминаетъ о томъ, чтобы оставшіяся во Франціи двѣ бутылки были испорчены или больны. Въ этомъ замѣчаніи нисколько не видно полноты наблюденія, это было простое констатированіе факта, что длинное путешествіе, — это было раньше извѣстно — соединенное съ примѣненіемъ высокой температуры, имѣло отличное дѣйствіе на Бонское вино. Этотъ случай былъ преданъ забвенію, такому полному забвенію, что только въ 1865 г. Пастеръ, занявшиись историческими изысканіями, чтобы составить свое *ученіе о винѣ*, случайно наткнулся на исторію съ Санть-Домингскими бутылками и поспѣшилъ разсказать ее Академіи. Но по поводу вопроса о нагрѣваніи винъ Пастеръ имѣлъ еще споръ о первенствѣ, на который онъ вовсе не разсчитывалъ. Одинъ бургундскій виноградарь-винодѣль, г. Вернетъ, предложившій первоначально, какъ предохранительный способъ, замораживаніе вина, а затѣмъ не особенно опредѣленно говорившій о высокой температурѣ, какъ о другомъ способѣ консервируванія, — заявилъ претензію на участіе въ изобрѣтеніи способа Пастера. «Если, — говорилъ Вернетъ — подвергши опыту съ высокой температурою нѣсколько образцовъ винъ, подлежащихъ отправкѣ, замѣчаютъ, что эти вина выносятъ пробу, тогда ихъ можно отправить; въ противномъ случаѣ слѣдуетъ отъ этого воздержаться.» По мнѣнію Вернета, вино обязано своею способностью выдерживать нагрѣваніе своему составу, своему здоровому состоянію, своей хорошей конституціи. Пастеру не трудно было доказать, что эти утвержденія были въполномъ противорѣчіи съ опытомъ. Никогда вино не портится отъ умѣренного примѣненія высокой температуры виѣ доступа воздуха, и именно его тогда нужно подвергнуть нагрѣванію,

когда оно не совсѣмъ здорово, потому что эта операциѣ не больше портить его, какъ если-бы оно было вполнѣ здорово. Всѣ вина могутъ подвергаться дѣйствію высокой температуры, нисколько не боясь порчи, и одной минуты нагрѣванія до нужнаго градуса достаточно, чтобы обеспечить сохраняемость вина, каково-бы оно ни было. Благодаря этой операциѣ, самое слабое вино, наиболѣе склонное къ закисанію, къ сгущенію, — вино, которому угрожаетъ сдѣлаться горькимъ, обеспечивается отъ той порчи, которой оно могло-бы подвергнуться.

Ничего нѣть проще, какъ осуществить нужныя условія для нагрѣванія бутылокъ. Послѣ того, какъ пробка прочно перевязана, чтобы воспрепятствовать ей выскочить, бутылки помѣщаются въ водянную баню. Полезно, чтобы бутылки опускались въ проволочной коробкѣ. Вода должна подняться до шейки (*cordeline*). Посреди бутылокъ помѣщается бутылка съ водою, куда погружается шарикъ термометра. Какъ только термометръ показываетъ 55 — 60 градусовъ, корзина съ бутылками вынимается изъ бани. Было-бы неблагоразумно тотчасъ вставить другую коробку: холодные бутылки могли-бы лопнуть въ очень горячей водѣ; ожидаются, пока вода нѣсколько остынетъ, такъ чтобы бутылки второй коробки попали только въ тепловатую воду.

Но хотя Пастеръ и предусмотрѣлъ до мельчайшихъ подробнѣстей все, что нужно было для того, чтобы предохранить вино отъ порчи или чтобы пріостановить таковую, но онъ чувствовалъ, что еще не относились съ полнымъ довѣріемъ къ дѣйствительности этого способа, который долженъ былъ, какъ предполагали, вредить или вкусу, или цвѣту, или прозрачности вина. Спросивъ прежде мнѣнія знатоковъ, которые, если только дѣлали различіе, то высказывались по совѣсти въ пользу нагрѣтыхъ винъ, Пастеръ пожелалъ имѣть болѣе рѣшающее мнѣніе. Онъ обратился сначала къ маклерамъ и къ купцамъ, весьма опытнымъ въ искусствѣ улавливанія малѣйшихъ качествъ въ винахъ, но затѣмъ устроилъ большой опытъ съ пробою винъ. 16-го Ноября 1865 г. — дегустаторы*) не забыли числа —

*) Лица, пробующія вкусъ вина.

собралась въ Нормальную школу подъ-коммиссія, назначенная коммиссіей, представительницею оптовой торговли винами въ Парижѣ, чтобы дать свое заключеніе объ очень почтенномъ количествѣ образцовъ. Послѣ цѣлаго ряда оцѣнокъ, эти заслуженные дегустаторы, хотя и не признали превосходства ненагрѣтаго вина надъ нагрѣтымъ, но указывали, тѣмъ не менѣе, на едва замѣтный оттѣнокъ вкуса, который, говорили они, ускользнетъ отъ вниманія девяти десятыхъ потребителей. Тогда Пастеръ, опасаясь, чтобы въ умахъ большинства членовъ комиссіи не оставалось легкаго предубѣжденія противъ операциіи нагрѣванія, и полагая, что при опредѣленіи оттѣнковъ вкуса небольшую роль играетъ воображеніе, просилъ комиссію разрѣшить ему не указывать въ слѣдующемъ сеансѣ, какой образчикъ взять изъ нагрѣтаго вина и какой изъ ненагрѣтаго. Коммиссія, руководившаяся лишь желаніемъ узнать истину, послѣшила на это согласиться. Сомнѣніе, которымъ винамъ отдать предпочтеніе — нагрѣтымъ или ненагрѣтымъ, — оказалось забавнымъ, до того оно было безусловно. Нечего и говорить, что ненагрѣтые вина не подверглись ни малѣйшей порчѣ, а отличались только тѣмъ, что не подверглись простой операциіи нагрѣванія. Одинъ разъ Пастеръ, изумленный необыкновенной тонкостью вкуса этихъ дегустаторовъ, прибѣгъ къ маленькому обману. Онъ предложилъ имъ два совершенно одинаковыхъ образца, взятыхъ изъ одной и той же бутылки. Оказалось превосходство, правда легкое, но ясно выраженное, одного стакана надъ другимъ. Коммиссія, намекая въ своемъ докладѣ на эту послѣднюю пробу, первая милостиво согласилась, что разница между нагрѣтымъ и ненагрѣтымъ виномъ незначительна, и если существуетъ, то не замѣтна; воображеніе — прибавляя докладчикъ — также имѣло большое вліяніе на пробу, такъ какъ даже сами члены комиссіи попались во время опыта въ маленькую ловушку.

Такимъ образомъ Пастеръ, прежде объяснивши причины, обусловливающія порчу винъ, нашелъ потомъ практическій способъ съ ними бороться съ увѣренностью и успѣхомъ. Благодаря примѣненію высокой температуры, онъ съумѣлъ, не вліяя

ни на цвѣтъ, ни на вкусъ винъ, сохранить ихъ прозрачность и сдѣлать ихъ на бесконечное время способными не портиться въ закрытыхъ сосудахъ. Если эти вина, будучи выставлены надолго на воздухъ, могли снова подвергнуться порчѣ, то это зависѣло отъ того, что воздухъ приносилъ имъ новые живые зародыши тѣхъ ферментовъ, отъ которыхъ они избавились во время акта нагрѣванія. Но эти, являющіеся изъ воздуха, болѣзнетворные зародыши такъ ничтожны по сравненіи съ заключающимися въ самомъ винѣ, что почти можно сказать, что нагрѣваніе дѣлаетъ вино неспособнымъ портиться, даже если его потомъ подвергнуть соприкосновенію съ воздухомъ. Итакъ, одинъ изъ величайшихъ экономическихъ вопросовъ былъ рѣшенъ, благодаря ряду опытовъ, въ которыхъ не было ничего случайного, произведенныхъ, какъ выражался однажды Дюма, съ глубокимъ пониманіемъ законовъ природы и отмѣннымъ знаніемъ способовъ, которыми наука владѣетъ, чтобы сдѣлать эти законы очевидными. Вина могли быть сохранены и перевозимы во всѣ страны, не теряя ни вкуса, ни букета. Эти лабораторныя работы должны были, благодаря широкому примѣненію, — потому что вскорѣ изобрѣтены были большия аппараты для нагрѣванія вина въ бочкахъ, — сдѣлаться общественнымъ благодѣяніемъ.

Бользни шелковичныхъ червей.

Наблюдали-ли вы когда-нибудь, въ пѣкоторыхъ департаментахъ Юга, разводку шелковичныхъ червей? Отъ существованія этого драгоценнаго насѣкомаго зависитъ жизнь населенія. Въ каждомъ домѣ можно встрѣтить плетенки, по которымъ ползутъ эти черви. Ихъ размѣщаются по всему жилищу до самой кухни, и часто они занимаютъ, даже въ достаточныхъ семьяхъ, лучшія комнаты. Тамъ, гдѣ разведеніе совершается въ широкихъ размѣрахъ, высятся, въ громадныхъ сараяхъ, подъ крышами изъ раздвинутой черепицы, цѣлые этажи этихъ плетенокъ, по которымъ ползаютъ тысячи и тысячи червей на подстилкахъ, которыхъ они по инстинкту никогда не покидаютъ.

Повсюду находятся большія или маленькія червоводни. Люди при встрѣчѣ не говорятъ другъ-другу: какъ вы поживаете? но говорятъ: какъ они поживаютъ? Почто встаютъ, чтобы дать имъ поѣсть или чтобы поддержать въ помѣщеніи нужную теплоту. И какое беспокойство вызывается при малѣйшей перемѣнѣ погоды! Не черезъ-чуръ ли влаженъ листъ тутового дерева? Сoverшится ли благополучно пищевареніе? Пищевареніе!.. Важное обстоятельство для здоровья червей, которые всю свою жизнь только и дѣлаютъ, что ёдятъ! Ихъ аппетитъ становится въ особенности непасытнымъ въ теченіи послѣднихъ дней выкормки. Тогда всѣ хозяева день и ночь на ногахъ. Постоянно приносятся мѣшки съ листьями, которые разбрасываются по подстилкамъ. Шумъ, производимый червями, перетирающими листья, часто напоминаетъ шумъ дождя, падающаго на вѣтвицы деревья. Съ какимъ нетерпѣніемъ ожидается моментъ, когда, совершивши свою послѣднюю линьку (линніе), черви съ туловищемъ, вздутымъ отъ шелка, взберутся на коконники съ тѣмъ, чтобы запереться въ свою золотую темницу и превратиться въ куколокъ! Какой праздникъ въ тѣ дни, когда собираютъ коконы, когда происходитъ, какъ выразился Оливье де Серъ, сборъ шелка!

Подобно всѣмъ земледѣльческимъ урожаямъ, этотъ сборъ также подверженъ большому риску. Почти всегда онъ оплачивается труды шелковода, иногда даже широко оплачиваетъ. Но въ 1849 г., послѣ исключительно хорошаго года и когда подобный фактъ нельзя было объяснить никакимъ атмосферическимъ влияніемъ, погибли почти совершенно всѣ червоводни; на нихъ обрушилась болѣзнь, мало-по-малу принявшая размѣры эпидеміи. Добрая часть червей, едва развившихся или уже дождшихъ до своего послѣдняго линнія, была поражена. Какую-бы фазу червь ни переживалъ, онъ все подвергался болѣзни.

Почти пѣть школьнника, который не выростилъ-бы на диѣ своего пюпитра пяти или шести шелковичныхъ червей, кормя ихъ, за неимѣніемъ листьевъ тутового дерева, нѣсколькими листьями салата или, въ крайнемъ случаѣ, козельца. Поэтому

едва-ли нужно напоминать, какъ появляется, ростеть и превращается шелковичный червь. Онъ рождается, выходя изъ своего яичка, называемаго греной (*graine*), — настолько оно сходно съ маленькимъ растительнымъ зерномъ, — весною, съ первыхъ теплыхъ дней. Онъ тогда вѣситъ только одинъ или полтора милиграмма. Мало-по-малу его величина и дѣятельность становятся больше. На седьмой день послѣ рожденія онъ останавливается на одномъ листѣ и кажется какъ-бы заснувшимъ. Въ такомъ положеніи онъ остается почти тридцать часовъ. Вскорѣ его голова начинаетъ болтаться, какъ-будто она не въ состояніи уже держаться на остальной части тѣла, и подъ кожею этой головы появляется вторая голова, совершенно новая. Какъ-бы вылѣзая изъ чехла, червь освобождается изъ своей старой изсохшей кожи. Вотъ показались его переднія лапки, а вотъ и ложныя лапки, которыхъ онъ имѣть сзади. Наконецъ, червь весь вышелъ. Онъ минутку отдыхаетъ и принимается за ъду. По прошествіи нѣсколькихъ дней — новый сонъ, новая кожа, новая линька, затѣмъ третья, затѣмъ четвертое превращеніе. Спустя приблизительно восемь дней послѣ четвертой линьки, червь перестаетъ кушать, его тѣло становится болѣе тонкимъ, болѣе прозрачнымъ, онъ стремится оставить свою подстилку, подымаетъ голову, кажется беспокойнымъ. Достаточно тогда вставить нѣсколько засохшихъ прутьевъ вереска, чтобы онъ за нихъ уцѣпился, взобрался на нихъ и уже не сходилъ больше съ нихъ. На этихъ прутьяхъ онъ завиваетъ свой коконъ и превращается въ куколку. Послѣ того какъ всѣ черви въ червоводнѣ покончили завивку своего шелка, коконы были заморены въ «паровикѣ», и затѣмъ высушены на солнцѣ, — ихъ передаютъ въ прядильню. Если желаютъ сохранить часть коконовъ, чтобы получить яйца, то вмѣсто того, чтобы заморить, ихъ соединяютъ въ четки, въ «низанки», употребляя специальное выраженіе. Спустя приблизительно три недѣли, бабочка выходитъ изъ своей куколки, пробиваетъ коконъ при помощи жидкости, которую она выпускаетъ изъ своего рта и которая имѣть свойства настолько размягчать шелкъ, что бабочка можетъ пройти черезъ коконъ. Едва она успѣла расправить и

испытать свои крылья, какъ самцы и самки совокупляются въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ. Затѣмъ самки кладутъ свои яйца (грену). Онѣ могутъ ихъ класть отъ четырехъ до шести сотъ. Вотъ всѣ фазы, которыя проходитъ шелковичный червь въ теченіи двухъ мѣсяцевъ.

Вернемся, однако, къ той болѣзни, которая опустошила червоводни въ 1849 г. Ея симптомы были разнообразны и измѣнчивы. Иногда болѣзнь проявлялась внезапно. Многія яйца оказывались безплодными или черви умирали въ первые дни послѣ своего рожденія. Часто вылупливаніе совершалось превосходно, черви достигали своей первой линьки, но эта линька происходила плохо. Большое число червей, принимая мало пищи при всякомъ кормленіи, отставали въ ростѣ по сравненіи съ другими, имѣли нѣсколько глянцовитый видъ и черноватую окраску. Вместо нормальныхъ червей, проходящихъ одновременно всѣ фазы этой первой линьки, обнаруживалось замѣтное неравенство, которое становилось все явственнѣе съ каждой послѣдующей линькою. Далеко отъ того, чтобы видѣть на столяхъ червей, такъ сказать, изобилующими, какъ будто они увеличиваются въ числѣ, всюду замѣчались пустыя мѣста. Каждое утро съ подстилокъ снимались трупы.

Иногда болѣзнь проявлялась при болѣе жестокихъ условіяхъ. До третьей и даже до четвертой линьки все шло весьма хорошо; равенство и здоровье червей не оставляло ничего желать, но съ четвертаго линянія начинались опасенія шелковода. Черви не бѣлѣли, они сохраняли ржавый оттѣнокъ. Ихъ аппетитъ уменьшался, они даже удалялись отъ предлагаемыхъ имъ листьевъ. На ихъ тѣлѣ появлялись пятна: черныя пятна, разсѣянныя неправильно на головѣ, на кольцахъ, на рогѣ. Тутъ и тамъ замѣчались мертвые черви. Приподымая подстилку, находили ихъ въ большомъ числѣ. Всякая пораженная червоводня была уже погибшая. Въ 1850 и 1851 г.г. неудачи повторились. Нѣкоторые шелководы, опечаленные, приписывали эти явленія плохой грѣнѣ и выписали другую изъ за-границы.

Все сначала пошло какъ нельзѧ лучше. 1853-й г., когда во Франціи выводилось много этой чужой грены, былъ одинъ

изъ самыхъ производительныхъ въ этомъ столѣтіи. Воздѣлано было до 26 миллионовъ килограммовъ коконовъ, что составило доходъ въ 130 миллионовъ франковъ. Но въ слѣдующемъ году, когда испытали грену, снесенную бабочками этихъ красивыхъ разводокъ иностранаго происхожденія, культивированныхъ во Франціи, то вскорѣ замѣтили странное вырожденіе. Эта грана не была лучше французской. Пришлось подлинно бороться съ эпидемію. Но какъ защищаться отъ нея? Слѣдовало ли постоянно обращаться за чужими сѣменами? А если эпидемія захватить Италію, Испанію и другія шелководныя страны?

То, чего опасались, дѣйствительно произошло. Болѣзнь распространилась; Испанія и Италія были поражены. Пришлось посыпать за сѣменами на Архипелагскіе острова, въ Грецію и Турцію. Грены эти, вначалѣ доброкачественныя, въ свою очередь заболѣли на своей родинѣ, эпидемія распространилась и туда. Тогда начали выписывать ихъ изъ Сиріи и Кавказа. Бичъ все слѣдовалъ по пятамъ за торговлею гренами. Въ 1864 г. всѣ сѣмена, изъ какой страны Европы они ни прибыли-бы, были больны или подозрительны. На окраинѣ Востока одна Японія еще оставалась здоровою.

Сельско-хозяйственные общества, правительства, весь свѣтъ былъ озабоченъ бѣдствіемъ и его все больше захватывающимъ шествіемъ. Это было, какъ говорили, нѣчто въ родѣ холеры шелковичныхъ червей. Каждый годъ публиковались сотни брошюръ. Предлагались самыя странныя средства,— всѣ, какъ увѣрялось, самыя вѣрныя, начиная отъ сѣрнаго цвѣта, золы и сажи, которыми слѣдовало обсыпать или червей, или листья тутового дерева, до обкуриванія хлорнымъ газомъ, дегтемъ, сѣрнистой кислотою. Прописывали червямъ даже вина, рома и абсента, а послѣ абсента совѣтовали попробовать креозотъ и ляписъ. Въ 1863 г. министръ земледѣлія отъ имени правительства подписалъ договоръ съ однимъ итальянцемъ, который предложилъ продать способъ, могущій уничтожить болѣзнь шелковичнаго черва. По этому договору онъ, министръ, обязался, въ случаѣ если дѣйствительность способа будетъ признана, исходатайствовать вознагражденіе въ 500,000 франковъ.

итальянскому шелководу. Опыты производились въ двѣнадцати департаментахъ, но не дали никакого благопріятнаго результата. Въ 1865 г. сборъ коконовъ упалъ до 4 миллионовъ килограммовъ. Это составляло потерю въ 100 миллионовъ франковъ.

Отчаянная петиція была подана въ Сенатъ, подписанная 3600 мэрами, муниципальными совѣтниками и землевладѣльцами шелководныхъ департаментовъ. Великій научный авторитетъ, которымъ пользовался Дюма, его знакомство съ шелководною промышленностью, его сочувствіе къ страданіямъ одного изъ наиболѣе пораженныхъ департаментовъ — Гарда, его родины, — все это содѣйствовало тому, что онъ избранъ былъ докладчикомъ комиссіи. Въ то время, какъ онъ редактировалъ свой докладъ, ему пришла мысль предложить Пастеру заняться изслѣдованіями, какимъ образомъ отвратить эпидемію, съ которой никто не могъ совладать.

Пастеръ сначала отклонилъ это предложеніе. Это происходило въ тотъ моментъ, когда результаты его изслѣдованій объ организованныхъ ферментахъ открывали ему широкій путь впереди; это было въ тотъ моментъ, когда онъ открылъ, какъ практическое примѣненіе своихъ послѣднихъ изслѣдованій, истинную теорію фабрикаціи уксуса и причину болѣзней вина; это было, наконецъ, въ тотъ моментъ, когда безконечно-малая существа показались ему, послѣ того какъ онъ бросилъ свѣтъ на вопросъ о самопроизвольномъ зарожденіи, безконечно великими. Всюду онъ находилъ ихъ присутствіе, то въ видѣ дѣятелей, на которыхъ возложена задача возвратить атмосферѣ все то, что отжило, то въ видѣ главныхъ виновниковъ заразныхъ болѣзней. И ему предлагали оставить этотъ путь, въ которомъ онъ былъ увѣренъ, который представлялъ со всѣхъ сторонъ безграничные горизонты — и оставить для того, чтобы пуститься на невѣдомую дорогу, быть можетъ, безвыходную. Не придется ли потерять ему мѣсяцы или даже годы въ безплодныхъ усиляхъ?

Дюма настаивалъ.

«Я отдалъ бы все, — говорилъ онъ своему прежнему ученику, ставшему его собратомъ и другомъ, — чтобы только при-

влечь ваше вниманіе къ вопросу, который занимаетъ мою бѣдную родину. Несчастіе превосходитъ все, что вы себѣ можете представить.

— Но пріймите во вниманіе, прошу васъ, — отвѣтилъ ему Пастеръ, — что я никогда не занимался шелковичными червями.

— Тѣмъ лучше, — возразилъ ему Дюма, — что вы ничего не знаете о предметѣ: вы будете держаться тѣхъ только выводовъ, которые вами получатся изъ вашихъ собственныхъ наблюдений.

Пастеръ далъ убѣдить себя, не столько вѣскостью этого аргумента, сколько для того, чтобы представить своему знаменитому учителю доказательство своего глубокаго уваженія.

Разъ давши обѣщаніе и принявши рѣшеніе отправиться на Югъ, Пастеръ спросилъ себя, какой методъ будетъ наиболѣе пригоденъ для решения задачи. Конечно, среди путаницы фактовъ и мнѣній, не было недостатка въ гипотезахъ. Въ теченіи семнадцати лѣтъ онѣ возникали со всѣхъ сторонъ.

Одною изъ новѣйшихъ и наиболѣе пространныхъ работъ объ ужасной эпидеміи была работа, представленная Академіей Наукъ Катрфажемъ. Одинъ параграфъ въ этомъ мемуарѣ обратилъ на себя особенное вниманіе Пастера. Катрфажъ рассказывалъ, что итальянскіе натуралисты, а — именно Филиппи и Корнала, встрѣтили у червей и у бабочекъ шелковичныхъ червей маленькия тѣльца, видимыя только подъ микроскопомъ, всѣ одинаковыя по виду и величинѣ. Натуралистъ Лебертъ увѣрялъ, что ихъ постоянно находили въ больныхъ червяхъ. Докторъ Озимо, изъ Падуи, замѣтилъ даже эти тѣльца въ нѣкоторыхъ гренахъ шелковичныхъ червей, а докторъ Витадини предложилъ даже изслѣдовать грены подъ микроскопомъ, чтобы имѣть здоровыя яички. Катрфажъ отмѣтилъ фактъ о тѣльцахъ только мимоходомъ, сомнѣваясь въ его значеніи и даже въ его точности. Это сомнѣніе могло-бы удалить изъ головы Пастера мысль о томъ, чтобы разслѣдовать значеніе этихъ маленькихъ тѣлецъ, но, среди общаго смѣщенія понятій, Пастеръ тѣмъ охотнѣе привязался къ идеѣ объ изученіи этихъ маленькихъ тѣлецъ, что дѣло шло объ органическомъ элементѣ, видимомъ

только подъ микроскопомъ. Этотъ приборъ оказалъ Пастеру столько услугъ въ его трудныхъ опытахъ о броженіяхъ, что онъ соблазнился мыслью еще взяться за него, какъ за средство къ изслѣдованію.

I.

6-го Июня 1865 г. Пастеръ поѣхалъ въ Алэ. Волненіе, которое онъ испытывалъ на самихъ мѣстахъ, гдѣ бѣдствіе свирѣпствовало со всею своею силою, и его возбужденіе въ виду задачи, которую надо было рѣшить, — скоро заставили его забыть жертвы, которыя онъ принесъ, бросивъ свою лабораторію въ Нормальной Школѣ. Онъ далъ себѣ слово не возвращаться въ Парижъ, прежде чѣмъ онъ не исчерпаетъ вполнѣ предмета и не восторжествуетъ надъ бѣдствіемъ.

Спустя нѣсколько часовъ по своемъ пріѣздѣ, онъ уже могъ констатировать присутствіе тѣлецъ въ нѣкоторыхъ червяхъ и могъ ихъ показать предсѣдателю и нѣкоторымъ членамъ землемѣрческаго комитета, которые ихъ никогда не видѣли. На другой день онъ устроился въ маленькомъ домикѣ, въ трехъ километрахъ отъ Алэ. Тамъ заканчивались два маленькихъ выводка. Это были почти послѣдніе; всюду коконы уже образовались. Одинъ изъ этихъ выводковъ, происшедшій изъ гренъ, привезенныхъ въ томъ-же году изъ Японіи, былъ очень успешный. Другой, происшедшій также изъ японскихъ гренъ, но уже воспроизведенныхъ въ этой мѣстности, достигъ четвертой линьки и имѣлъ самый плохой видъ. Но, странное дѣло, разматривая подъ микроскопомъ множество куколокъ и бабочекъ изъ отдѣленія, которое такъ радовало владѣльца, Пастеръ постоянно находилъ тѣлецъ, между тѣмъ какъ изслѣдованіе червей плохаго отдѣленія обнаруживало ихъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ. Это двойное обстоятельство поразило Пастера своею странностью. Онъ тотчасъ послалъ людей во всѣ окрестности Алэ, чтобы розыскать какіе-либо остатки запоздавшихъ выводковъ. Онъ считалъ крайне важнымъ выяснить, было-ли присутствіе тѣлецъ въ куколкахъ и бабочкиахъ въ удачныхъ выводкахъ и отсутствіе этихъ-же тѣлецъ въ червяхъ плохихъ

выводковъ случайнымъ явленіемъ или общимъ фактомъ. Онъ не замедлилъ убѣдиться, что это часто бываетъ. Но что должно было происходить, когда черви въ плохой червоводнѣ завивали свой коконъ? Пастеръ убѣдился, что въ куколкахъ, особенно въ возмужавшихъ куколкахъ, тѣльца встречались часто. Что касается бабочекъ, вышедшихъ изъ этихъ коконовъ, то не было ни одной, которая ихъ не имѣла-бы, и тѣльца въ нихъ были въ изобиліи.

Преслѣдуя свою предвзятую мысль о томъ, что между болѣзнью и тѣльцами могло существовать соотношеніе, Пастеръ заявилъ въ сообщеніи, представленномъ землемѣльческому комитету въ Алѣ, 26-го Іюня 1865 г., спустя двадцать дней послѣ своего прїѣзда, что напрасно искали, какъ то прежде дѣлали, признакъ болѣзни, т. е. тѣльца, въ яичкахъ или въ червахъ. И тѣ и другіе могли заключать въ себѣ зародышъ болѣзни, не представляя ясныхъ тѣлецъ, видимыхъ подъ микроскопомъ. Болѣзнь преимущественно развивается въ куколкахъ и бабочкиахъ, и въ нихъ-то и слѣдуетъ ее искать. Наконецъ, заключилъ Пастеръ, мы тутъ имѣемъ вѣрный способъ обзаведенія здоровою греною, если мы только будемъ прибѣгать къ бабочкамъ, свободнымъ отъ тѣлецъ.

Пастеръ поспѣшилъ примѣнить этотъ новый способъ полученія чистыхъ гренъ. Хотя болѣзнь была общераспространенная, онъ встрѣтилъ, однако, послѣ пѣсколькоихъ дней усидчивыхъ микроскопическихъ наблюденій, бабочекъ, не содержащихъ тѣлецъ. Онъ аккуратно сохранилъ ихъ грену, также какъ и грену, полученную отъ пары, содержащихъ много тѣлецъ, рѣшивъ подождать, что дадутъ въ слѣдующемъ году эти грены, изъ которыхъ первая, вѣроятно, не содержала, а вторая содержала тѣльца. Тогда можно будетъ имѣть, хотя и въ малыхъ размѣрахъ, выводки съ самаго начала здоровые и другіе больные, сравненіе которыхъ съ выводками промышленными, болѣе или менѣе пораженными болѣзнью, дастъ толчекъ къ совершенно новымъ точкамъ зрењія.

«Кто знаетъ, — сказалъ себѣ Пастеръ — не заключается-ли даже спасеніе шелководства въ примѣненіи на практикѣ этого

производства чистыхъ гренъ, при помощи бабочекъ, свободныхъ отъ тѣлецъ?»

Едва Пастеръ далъ знать сначала земледѣльческому комитету въ Алѣ, а потомъ Академіи Наукъ о результатахъ первыхъ наблюденій и о заключеніяхъ, которые изъ нихъ вытекали, какъ со всѣхъ сторонъ поднялась критика безъ конца. Ему возражали, что работами многихъ итальянскихъ ученыхъ несомнѣннымъ образомъ установлено, что тѣльца были нормальной составной частью нѣкоторыхъ червей, и въ особенности всѣхъ бабочекъ въ болѣе позднемъ возрастѣ; что другие авторы доказали, что достаточно подвергнуть червей голоданью — и во всѣхъ ихъ тканяхъ появятся эти знаменитыя тѣльца; что докторъ Гаэтано Кантони уже сдѣлалъ опытъ съ выводками, происшедшими изъ гренъ бабочекъ, не содержавшихъ тѣлецъ, и окончательно потерпѣлъ неудачу.

«Ваши усилия окажутся тщетными, — писалъ знаменитый итальянскій энтомологъ Корналіа, — отобранныя Вами яйца дадутъ здоровыхъ червей, но эти черви заболѣютъ отъ всюду господствующей эпидемической заразы.»

Всякій другой, на мѣстѣ Пастера, былъ-бы поколебленъ, но Пастеръ былъ не изъ тѣхъ людей, которые теряются, при встрѣчѣ съaprіорными взглядами и болѣе или менѣе смѣлыми увѣреніями. Онъ далъ себѣ слово не бросать своей предвзятой мысли, пока опытъ не выскажется со всею рѣшительностью. Всякое научное изслѣдованіе, чтобы быть успешно начатымъ и завершеннымъ, должно имѣть исходной точкою предвзятую мысль, гипотезу, въ вѣрности и значеніи которой надо стараться убѣдиться путемъ опыта. Чтобы судить о важности фактовъ, сообщенныхъ Пастеромъ, нужно было установить, существуетъ ли соотношеніе между тѣльцами и господствующею болѣзнью, какъ между причиной и слѣдствіемъ. Вотъ гдѣ былъ главный пунктъ, подлежащий выясненію.

Но если Пастеръ не колеблясь открылъ путь, по которому слѣдовало идти, онъ однако вступилъ на него со свойственнымъ ему благоразумiemъ экспериментатора. Въ продолженіи пяти лѣтъ онъ возвращался въ Алѣ, гдѣ проживалъ по нѣсколько мѣся-

цевъ. Маленький домикъ, спрятанный между деревьями, известный подъ именемъ Понъ-Жиске, сдѣлался одновременно его жилищемъ и червоводией. Онъ окружены горами, гдѣ высятся уступы, засажденные шелковичными деревьями. Уединеніе было полное. Госпожа Пастеръ и ея дочь превратились въ шелководницъ, и относились серьезно къ своему дѣлу, не только собирая листья тутового дерева, но еще принимая участіе во всѣхъ предпринимаемыхъ опытахъ. Помощники Пастера изъ учениковъ Нормальной Школы, — Дюкло, Жерне, Мальо и Роленъ, также прибыли сюда, чтобы сгруппироваться вокругъ своего учителя. Такимъ образомъ, въ этомъ заброшенномъ углу Севеній образовалась колонія, съ жаромъ искавшая разрѣшенія темной задачи и средствъ къ исцѣленію или предупрежденію болѣзни, истощавшей въ теченіи долгаго времени одинъ изъ главныхъ источниковъ народнаго богатства.

Одною изъ первыхъ заботъ Пастера было разрѣшеніе вопроса о заразительности болѣзни. На счетъ этой заразительности было построено множество гипотезъ, но было сдѣлано весьма мало опытовъ, и изъ сдѣланныхъ опытовъ ни одинъ не былъ рѣшающимъ. Поэтому и мнѣнія были весьма различны. Одни полагали, что заразительность несомнѣна, но большая часть сомнѣвались въ ея существованіи или отрицали ее. Нѣкоторые считали ее случайнымъ явлениемъ. Говорили, наприм., что болѣзнь сама по себѣ не заразительна, но она становится таковою въ присутствіи и при осложненіи другими болѣзнями, которыхъ обладаютъ заразительностью. Эта гипотеза была удобна и давала возможность объяснять противорѣчивые факты. Когда нѣкоторые, видя, что здоровые черви, будучи нечаянно или нарочно примѣшаны къ больнымъ червямъ, все погибали, утверждали, что болѣзнь заразительна, то другие тотчасъ отвѣчали діаметрально противоположными наблюденіями.

Какъ-бы мнѣнія не расходились, однако весь свѣтъ выриль въ существование вредоносной среды, ставшей эпидемическою вслѣдствіе какого-то скрытаго вліянія. Строгими опытами Пастеру вскорѣ удалось доказать, что болѣзнь была абсолютно заразительна.

Вотъ каковъ былъ одинъ изъ его первыхъ опытовъ. Онъ взялъ очень хорошихъ червей, свободныхъ отъ тѣлецъ, и когда они кончили свою первую линьку, далъ имъ въ пищу листья съ примѣсью тѣлецъ. Сдѣлано было это очень просто: онъ растеръ одинъ шелковичный червь, разжидилъ его небольшимъ количествомъ воды и провелъ по всей поверхности листьевъ кистью, намоченной въ этой жидкости. Въ теченіи нѣсколькихъ дней ничто не обнаруживало, чтобы черви хотя сколько-нибудь подверглись какой-либо внутренней болѣзни. Черви достигали второй линьки въ тотъ же промежутокъ времени, что и контрольные черви, которые не были заражены. Вторая линька прошла безъ всякаго запозданія: это доказывало, что всѣ черви, и зараженные и контрольные, приняли одинаковое количество пищи. Казалось, что паразита нѣтъ. Такъ дѣло шло еще нѣсколько дней. Даже третья линька прошла безъ особенно замѣтной разницы между обѣими частями червей. Но вскорѣ наступила глубокая перемѣна. Тѣльца, которая до этого времени существовали только въ кишечныхъ оболочкахъ, не замедлили появиться и въ прочихъ органахъ. Начиная со второго дня послѣ третьей линьки, т. е. двѣнадцатаго послѣ зараженія, замѣтная разница отличала зараженныхъ червей отъ незараженныхъ. Черви контрольные, очевидно, чувствовали себя лучше. Разматривая зараженныхъ въ лупу, можно было замѣтить на ихъ головѣ и кольцахъ множество маленькихъ пятенъ, которыхъ до того времени не были замѣтны. Пятна показывались на внѣшнихъ покровахъ, когда внутренніе покровы кишечного канала содержали уже достаточно большое число тѣлецъ. Именно эти тѣльца и замедляли пищеварительная отправлениія и препятствовали усвоенію поглощенной пищи. Отсюда и разница между червями. Послѣ четвертой линьки передъ глазами наблюдателя уже имѣлась полная картина болѣзни въ томъ видѣ, какъ она постоянно проявляется въ промышленныхъ черводонияхъ, а именно, въ видѣ пятенъ на кожѣ, вслѣдствіе которыхъ болѣзни дано было имя «пебрины» (pebrine). Крестьяне говорили, что черви были какъ-бы обсыпаны перцемъ. Многіе изъ червей были переполнены тѣльцами. Тѣ, которые образовали

свой коконъ, дали бабочекъ, которые представляли, такъ сказать, кучу тѣлецъ.

Сколько поучительного въ этомъ простомъ опытѣ! Тѣльце, попавшее въ кишечный каналъ одновременно съ пищею для червей, можетъ, стало быть, внести заразу въ этотъ кишечный каналъ и последовательно во всѣ ткани. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ болѣзнь могла имѣть продолжительный инкубационный (скрытый) періодъ, такъ какъ она проявлялась только на двѣнадцатый день. Наконецъ, пятна на кожѣ, далеко не представляя собою всей сути болѣзни, суть результатъ дѣйствія тѣлецъ, развившихся внутри черва. Они представляютъ отдаленный признакъ болѣзни. «Ахъ, — сказалъ себѣ при этомъ наблюденіи Пастеръ — если-бы сдѣлать сближеніе между этими пятнами и известными болѣзнями человѣка, при которыхъ на тѣлѣ появляются пятна или кровоизлѣянія, сколько интересныхъ выводовъ представилось-бы подготовленному уму!»

Пастеръ не преминулъ воспроизвести много разъ этотъ любопытный опытъ, видоизмѣня его условія. То онъ вводилъ пищу съ тѣльцами въ выводокъ здоровыхъ червей тотчасъ послѣ ихъ рожденія, то при второй, то при третьей линькѣ. Иногда эта ъда съ тѣльцами подавалась червямъ въ моментъ, когда они приступали къ завиванію своего кокона. Постоянно обнаруживались въ вѣрномъ воспроизведеніи всѣ тѣ несчастія, которыя наблюдались въ черводоняхъ, со всею ихъ распространенностью и разнообразными формами. Пастеръ создавалъ по своему желанію то или другое явленіе пебрины. Когда онъ заражалъ свѣжими тѣльцами совершенно здоровыхъ червей послѣ ихъ четвертой линьки, то эти черви, хотя и нѣсколько разъ поѣли листьевъ съ тѣльцами въ перемежку съ чистыми листьями, все-таки завивали свой коконъ. Можно было думать, что зараженія въ этихъ случаяхъ не происходило. Но это была обманчивая внѣшность. Зараженіе обнаруживалось въ высшей степени въ куколкахъ и бабочекъ. Многія куколки умирали, не успѣвъ превратиться въ бабочекъ, и ихъ тѣло было, такъ сказать, исключительно составлено изъ тѣлецъ. Образовавшіяся-же бабочки, вышедшия изъ своихъ коконовъ, имѣли самый пла-

чевый видъ. Болѣзнь могла даже до такой степени развиться, что совокуплѣніе и кладка яицъ становились невозможными.

Вѣрный правиламъ экспериментальнаго метода, Пастерь заботливо воспроизвелъ тѣ же опыты съ тѣми, назначеными для контроля, червями, изъ среды которыхъ брались черви для зараженія. Этимъ первымъ здоровымъ червямъ онъ давалъ ъсть не зараженные тѣльцами листья, а такие, которые были смазаны прозрачною кашкою изъ остатковъ бабочекъ и червей, свободныхъ отъ тѣлецъ. Эта ъда не разстраивала обычного здоровья червей. Можно ли было представить лучшее доказательство того, что одно только тѣльце было причиной, вызывающей пебрину?

Всѣ эти опыты, видоизмѣнявшіеся — повторяю опять — до безконечнаго, бросили живой свѣтъ на болѣзнь и дали точное представлѣніе о томъ, что происходило въ промышленныхъ выводкахъ. Начиная отъ болѣзни, которая обрушивалась съ первыхъ дней послѣ рожденія червей на червоводню и поражала ее, до невидимой болѣзни, которая, такъ сказать, запиралась въ коконѣ — все теперь выяснилось. Такъ, одно изъ послѣдствій бѣдствія, наиболѣе возбуждавшее удивленіе и разстроивавшее всѣ усиленія шелководовъ, было то, что невозможно было добыть производительныхъ гренъ даже тогда, когда пробовали добывать ихъ изъ коконовъ въ тѣхъ червоводняхъ, которыя съ точки зрѣнія производства коконовъ могли считаться весьма удачными. Въ слѣдующемъ году оказалось почти навѣрное, что сѣмена этихъ прекрасныхъ червоводенъ были лишены производительности. Большинство земледѣльческихъ комитетовъ и практиковъ, не допуская мысли о томъ, чтобы болѣзнь существовала въ червоводняхъ, столь удовлетворительныхъ по изобилію продуктовъ и красотѣ коконовъ, не хотѣли вѣрить, чтобы причиной неудачи были сами сѣмена. Отсюда возникало заблужденіе за заблужденіемъ и даже прискорбные промахи. Часто можно было видѣть, какъ самые почтенные шелководы употребляли для гренажа (полученія грены) очень красивый сборъ коконовъ на томъ основаніи, что они въ червяхъ не наблюдали ни выраженныхъ пятенъ пебрины, ни тѣлецъ — даже въ періодъ, когда черви взбирались на коконники, каковой актъ совершался ими при наи-

лучшихъ условіяхъ. И однако, въ слѣдующемъ году они, къ своему огорченію, видѣли, что выводки, вышедши изъ этихъ гренъ, всѣ погибали. Эти обстоятельства, способныя вызвать отчаяніе и придать бѣдствію таинственный характеръ, находили себѣ естественное объясненіе въ фактахъ экспериментальнаго зараженія.

Однако, въ виду того, что шелководъ никогда не заражаетъ прямо червей, давая имъ юсть листья, къ которымъ нарочно примѣшивались бы тѣльца, могъ возникнуть вопросъ, какимъ образомъ подобные факты совершаются при промышленныхъ выводкахъ. Пастеръ на замедлилъ разрѣшить этотъ вопросъ.

Въ выводкѣ, гдѣ находятся содержащіе тѣльца черви, эти послѣдніе безпрестанно доставляютъ заражающій материалъ, который падаетъ на листья и загрязняетъ ихъ. Этотъ заражающій материалъ ничто иное, какъ изверженія больныхъ червей, которые подъ микроскопомъ оказываются переполненными тѣльцами, захваченными изъ стѣнокъ кишечного канала, въ которомъ именно они размножаются. Легко понять, что изверженія, падающія на листъ, пачкаютъ его тѣмъ легче, что черви, ползая, прижимаютъ эти изверженія тяжестью своего тѣла къ листу. Таково одно изъ условій естественнаго зараженія. При помощи изверженій содержащихъ тѣльца червей, изверженій, раздавленныхъ и разбавленныхъ нѣсколькими каплями воды, которая Пастеръ потомъ кистью намазывалъ на листья тутового дерева, назначенные только на одинъ обѣдъ, заражалось столько червей, сколько угодно.

Пастеръ констатировалъ также существованіе другой причины, вызывающей естественное и непосредственное зараженіе. Шесть переднихъ лапокъ тѣла червей заканчиваются острыми крючечками, при помощи которыхъ черви другъ другу прокалываютъ кожу. Представимъ себѣ теперь здороваго червя, перелѣзающаго черезъ тѣло червя, содержащаго тѣльца. Крючечки первого черва, проникая черезъ кожу второго, могутъ загрязниться тѣльцами, помѣщающимися непосредственно подъ этою кожею, и способны занести болѣзнь на другихъ здоровыхъ червей, которыхъ онъ дальше уколетъ. Чтобы доказать экспериментально, какъ это сдѣлалъ Пастеръ, существованіе этого

способа зараженія, достаточно взять червей и заставить ихъ ранить другъ друга. Наконецъ, зараженіе на разстояніи, черезъ посредство воздуха и той пыли, которую онъ разноситъ, представляетъ фактъ, который также не трудно доказать. Достаточно, подметая червоводню и простирая плетенки, поднять пыль изъ изверженій, содержащихъ тѣльца, и высохшихъ остатковъ мертвыхъ червей и дать этой пыли осесть на плетенки, гдѣ находятся здоровые черви, чтобы эти черви, по прошествію известного времени, обнаружили заболѣваніе. Совершенно здоровые черви, если они помышаются въ одной червоводнѣ съ больными, хотя и на довольно большомъ разстояніи отъ послѣднихъ, все-таки заразятся.

Итакъ, послѣ столькихъ рѣшающихъ опытовъ, невозможно было не видѣть въ пебринѣ болѣзни по существу заразительной. Однако, между фактами, приводившимися въ пользу незаразительности, былъ одинъ, который трудно было объяснить. Существовало много примѣровъ удачныхъ выводковъ, хотя они производились въ червоводняхъ, въ которыхъ въ предшествовавшемъ году пебрина совершенно воспрепятствовала успѣху. Но Пастеръ доказалъ, что если пыль можетъ служить элементомъ зараженія, то лишь при условіи, что она еще свѣжая. Матеріалъ, содержащий тѣльца, высыхая, теряетъ свою заразительную силу, если можно такъ выразиться. Достаточно нѣсколькихъ недѣль, чтобы этотъ матеріалъ сдѣлался безобиднымъ. Такимъ образомъ, пыль одного года не вредитъ разводкамъ слѣдующаго года. Болѣзнь гаснетъ на мѣстѣ. Что обусловливаетъ ея передаваемость, такъ это единственно тѣ тѣльца, которые заключаются въ яичкахъ будущихъ разводокъ.

И что можетъ быть легче, какъ понять присутствіе паразита-тѣльца въ сѣмени! Яичко зарождается въ ту чудную фазу жизни шелковичного червя, когда послѣдній, окончивъ завивку своего кокона, превращается въ немъ въ куколку, засыпаетъ и распадается, такъ сказать, въ известного рода блокъ и желтокъ, изъ которыхъ выйдетъ вполнѣ сформировавшаяся бабочка — подобно тому, какъ цыпленокъ выходитъ изъ своего яйца. Представимъ себѣ теперь, что нарожденіе этой новой

лучшихъ условияхъ. И однако, въ слѣдующемъ году они, къ своему огорченію, видѣли, что выводки, вышедшиѣ изъ этихъ грецъ, всѣ погибали. Эти обстоятельства, способныя вызвать отчаяніе и придать бѣдствію таинственный характеръ, находили себѣ естественное объясненіе въ фактахъ экспериментальнаго зараженія.

Однако, въ виду того, что шелководъ никогда не заражаетъ прямо червей, давая имъ ъсть листья, къ которымъ нарочно примѣшивались бы тѣльца, могъ возникнуть вопросъ, какимъ образомъ подобные факты совершаются при промышленныхъ выводкахъ. Пастеръ на замедлилъ разрѣшить этотъ вопросъ.

Въ выводкѣ, гдѣ находятся содержащіе тѣльца черви, эти послѣдніе безпрестанно доставляютъ заражающій матеріалъ, который падаетъ на листья и загрязняетъ ихъ. Этотъ заражающій матеріалъ ничто иное, какъ изверженія больныхъ червей, которые подъ микроскопомъ оказываются переполненными тѣльцами, захваченными изъ стѣнокъ кишечнаго канала, въ которомъ именно они размножаются. Легко понять, что изверженія, падающія на листъ, пачкаютъ его тѣмъ легче, что черви, ползая, прижимаютъ эти изверженія тяжестью своего тѣла къ листу. Таково одно изъ условій естественнаго зараженія. При помощи изверженій содержащихъ тѣльца червей, изверженій, раздавленныхъ и разбавленныхъ нѣсколькими каплями воды, которая Пастеръ потомъ кистью намазывалъ на листья тутового дерева, назначенные только на одинъ обѣдъ, заражалось столько червей, сколько угодно.

Пастеръ констатировалъ также существованіе другой причины, вызывающей естественное и непосредственное зараженіе. Шесть переднихъ лапокъ тѣла червей заканчиваются острыми крючечками, при помощи которыхъ черви другъ другу прокалываютъ кожу. Представимъ себѣ теперь здороваго червя, перелѣзающаго черезъ тѣло червя, содержащаго тѣльца. Крючечки первого черва, проникая черезъ кожу второго, могутъ загрязниться тѣльцами, помѣщающимися непосредственно подъ этою кожею, и способны занести болѣзнь на другихъ здоровыхъ червей, которыхъ онъ дальше уколетъ. Чтобы доказать экспериментально, какъ это сдѣлалъ Пастеръ, существованіе этого

способа зараженія, достаточно взять червей и заставить ихъ ранить другъ друга. Наконецъ, зараженіе на разстояніи, черезъ посредство воздуха и той пыли, которую онъ разноситъ, представляетъ фактъ, который также не трудно доказать. Достаточно, подметая червоводню и простищая плетенки, поднять пыль изъ изверженій, содержащихъ тѣльца, и высохшихъ остатковъ мертвыхъ червей и дать этой пыли осѣсть на плетенки, гдѣ находятся здоровые черви, что-бы эти черви, по прошествію извѣстнаго времени, обнаружили заболѣваніе. Совершенно здоровые черви, если они помышаются въ одной червоводнѣ съ больными, хотя и на довольно большомъ разстояніи отъ послѣднихъ, все-таки заразятся.

Итакъ, послѣ столькихъ рѣшающихъ опытовъ, невозможно было не видѣть въ пебринѣ болѣзни по существу заразительной. Однако, между фактами, приводившимися въ пользу незаразительности, былъ одинъ, который трудно было объяснить. Существовало много примѣровъ удачныхъ выводковъ, хотя они производились въ червоводняхъ, въ которыхъ въ предшествовавшемъ году пебрина совершенно воспрепятствовала успѣху. Но Пастерь доказалъ, что если пыль можетъ служить элементомъ зараженія, то лишь при условіи, что она еще свѣжая. Матеріалъ, содержащий тѣльца, высыхая, теряетъ свою заразительную силу, если можно такъ выразиться. Достаточно нѣсколькихъ недѣль, чтобы этотъ матеріалъ сдѣлался безобиднымъ. Такимъ образомъ, пыль одного года не вредитъ разводкамъ слѣдующаго года. Болѣзнь гаснетъ на мѣстѣ. Что обусловливаетъ ея передаваемость, такъ это единственно тѣ тѣльца, которыя заключаются въ яичкахъ будущихъ разводокъ.

И что можетъ быть легче, какъ понять присутствіе паразита-тѣльца въ сѣмени! Яичко зарождается въ ту чудную фазу жизни шелковичного червя, когда послѣдній, окончивъ завивку своего кокона, превращается въ немъ въ куколку, засыпаетъ и распадается, такъ сказать, въ извѣстнаго рода бѣлокъ и желтокъ, изъ которыхъ выйдетъ вполнѣ сформировавшаяся бабочка — подобно тому, какъ цыпленокъ выходитъ изъ своего яйца. Представимъ себѣ теперь, что нарожденіе этой новой

жизни происходит не при нормальныхъ своихъ условіяхъ, а въ сосѣдствѣ съ паразитомъ, который также ищетъ въ этихъ веществахъ, необходимыхъ для его жизни и превращеній, элементовъ для своей пищи и размноженія. Онъ будетъ тамъ, этотъ паразитъ, въ тотъ моментъ, когда яички бабочки-самки, нѣжныя и мягкія какъ блокъ, едва начнутъ обрисовывать свои контуры. Бѣда этимъ яичкамъ, если они тогда захватятъ нѣсколько частичекъ тѣльца или зародышей.

Напрасно покровы этихъ яичекъ со временемъ мало-помалу сдѣлаются твердыми и ороговѣютъ: врагъ уже будетъ на мѣстѣ и позднѣе проявится въ зародышѣ шелковичнаго червя.

Вотъ какимъ образомъ происходитъ то, что эта ужасная эпизоотія въ одно и то же время заразительна и наслѣдственна, и это даетъ намъ также возможность понимать существование этого двойнаго признака въ нѣкоторыхъ извѣстныхъ болѣзняхъ людей и животныхъ.

II.

Когда Пастеръ въ первый разъ прибылъ въ Алѣ, эпидемія шелковичныхъ червей всѣми приписывалась одной причинѣ — пебринѣ, и пебрина называлась «болѣзнью». Этимъ словомъ все было сказано. Оно указывало, что здѣсь имѣлось дѣло съ единственнымъ бѣствіемъ, неуловимымъ по своей природѣ и своему началу, готовымъ опустошить всѣ выводки. Что-бы ни произошло, какая-бы причина ни разрушила червоводню, во всемъ обвинялась «болѣзнь». Одно изъ самыхъ разительныхъ доказательствъ того, что зло приписывалось одной пебринѣ, мы находимъ въ предложеніи преміи въ 5000 флориновъ, учрежденной въ 1868 г. австрійскимъ правительствомъ, въ вознагражденіе изобрѣтателю лучшаго предохранительнаго или цѣлитльнаго средства, способнаго остановить пебрину, «эпидемическую болѣзнь, поражающую шелковичнаго червя».

Если теперь бросить взглядъ на принципы, которые только что установлены, то прійдемъ къ заключенію, что пебрина должна была считаться уже побѣжденною. Пастеромъ было доказано, что бабочки, свободныя отъ тѣлецъ, не рождаютъ ни

одного яйца, которое содержало бы тѣльца. Онъ же, кромѣ того, доказалъ, что грену, если ее выводить отдельно, вдали отъ загрязненной грены, не производитъ ни червей, ни куколокъ, ни бабочекъ, загрязненныхъ тѣльцами. Такимъ образомъ, уже легко становилось увеличить число червоводенъ, избавленныхъ отъ пебрины. Этимъ обезпечивалось производство шелка и производство грены. Чтобы удостовѣриться въ чистотѣ грены, нужно было только прибѣгнуть къ микроскопическимъ изслѣдованіямъ бабочекъ-производительницъ. Эти изслѣдованія могли производить женщины, молодыя девушки и даже дѣти. Достаточно было растереть бабочку въ нѣсколькихъ капляхъ воды и помѣстить на поле микроскопа одну каплю этой кашицы, чтобы ясно увидѣть тѣльца, если они только были. Итакъ, казалось, что съ бѣдствиемъ уже было покончено. Но Пастеръ вскорѣ убѣдился, что всеобщая вѣра въ существование одной единственной болѣзни не оправдывалась. Если опыты 1866 года показали ему всю силу болѣзни, обусловливаемой тѣльцами, и дали возможность указать способъ для предохраненія отъ нея, то вслѣдъ за тѣмъ его экспериментальный методъ вскорѣ выяснилъ ему, что пебрина далеко не была единственной причиной, отъ которой страдало шелководство.

Этотъ послѣдній результатъ былъ добытъ въ 1867 году. Съ точки зрењія опытовъ, гдѣ этотъ долженъ быть заченъ, вдвойнѣ для Пастера. Подъ вліяніемъ глубокой симпатіи къ страданіямъ и несчастіямъ, которыхъ онъ былъ свидѣтелемъ въ продолженіи двухъ лѣтъ, и въ тоже время сгорая нетерпѣніемъ одолѣть бѣдствіе, Пастеръ началъ въ Февралѣ, Мартѣ и Апрѣлѣ мѣсяцахъ, еще до большихъ промышленныхъ выводковъ, рядъ опытовъ надъ червями, которые развивались при искусственной теплотѣ и кормились листьями тутового дерева, доставленными изъ теплицъ.

И вотъ, во время этихъ раннихъ опытовъ, Пастеръ наблюдалъ, что изъ 16 кладокъ яицъ, произшедшихъ отъ родителей, не содержавшихъ тѣлецъ, пятнадцать удались, а шестнадцатая почти цѣликомъ погибла между четвертою линькою и всползаніемъ на кокошки. Несмотря на то, что черви все время

имѣли самый красивый видъ, они вдругъ повымерли. Въ выводкѣ изъ 100 червей, каждый день снимали 10, 15, 20 мертвыхъ, которые чернили и подвергались гиеню съ необыкновенной быстротою, часто уже въ теченіи двадцати четырехъ часовъ. Иногда они представлялись мягкими, дряблыми, похожими на пустую и морщинистую кишку. Справившись у авторовъ, пи-савшихъ о шелковичномъ червѣ, Пастеръ уже не могъ сомнѣваться въ томъ, что у него передъ глазами характерный примѣръ болѣзни, называемой сонной болѣзнью (*morts-flats*) — «флашери». Эти черви не только никогда не обнаруживали пятенъ пебрины, но, кромѣ того, нигдѣ въ ихъ тѣлѣ не замѣтно было присутствія тѣлецъ. Что еще казалось знаменительнѣе, это то, что тѣльца одинаково отсутствовали какъ въ куколкахъ, такъ и въ бабочкахъ тѣхъ рѣдкихъ червей, которые въ состояніи были завить свой коконъ. Хотя приведенный случай относился лишь къ одной кладкѣ яицъ, произшедшей отъ родителей, свободныхъ отъ тѣлецъ, однако у Пастера явились сомнѣнія въ существованіи одной единственной болѣзни, а также въ необходимой зависимости между пебриною и флашери.

Эти первыя подозрѣнія нашли вскорѣ подтвержденіе при помоши выводковъ Апрѣля и Мая мѣсяцевъ. Представились многочисленные случаи флашери. Уже не могло оставаться сомнѣнія въ независимости между двумя болѣзнями: пебриною и флашери. Выводки, даже въ высшей степени пораженные флашери, происходили отъ гренъ, снесенныхъ родителями, свободными отъ тѣлецъ, и сами давали производителей, также свободныхъ отъ паразита. Присматриваясь ко множеству промышленныхъ выводковъ, Пастеръ не замедлилъ констатировать, что то, что происходило въ его лабораторіи, было очень общимъ явленіемъ и что, вопреки обычному мнѣнію, двѣ болѣзни были причиной бѣдъ: пебрина и флашери. Пебрина очевидно была болѣе распространена, но флашери также имѣла свою долю, и даже большую долю, въ бѣдствіи.

Здѣсь также, при этомъ новомъ изслѣдованіи, микроскопъ пришелъ на помощь Пастеру. Если во время выкармливанія шелковичного червя, когда средняя температура всегда доста-

точно высока, взять листъ тутоваго дерева, растереть его въ ступкѣ, примѣшивая къ нему нѣсколько капель воды, и представить эту жидкость самой себѣ, то, уже спустя двадцать четыре часа, ее находятъ переполненною маленькими микроскопическими организмами. Нѣкоторые изъ нихъ неподвижны и походятъ на маленькия палочки, или на зернышки, спаянныя концами, на подобіе четокъ; другіе, болѣе или менѣе подвижные, изгибающіеся, производящіе червообразныя движения, изъ породы вибріоновъ, которые встрѣчаются почти во всѣхъ органическихъ состояніяхъ, находящихся на пути къ порчѣ. Откуда появляются эти микроскопические организмы? Достаточно припомнить факты, относящіеся къ такъ называемому самопроизвольному зарожденію, чтобы знать, что эти зародыши находились на поверхности растертаго листа или лежали въ видѣ пыли на предметахъ, которые служили къ растиранію этого листа — на ступкѣ, на пестѣ, на капляхъ прибавленной воды.

Однако довольно странное обстоятельство! Если вскрыть пищеварительный каналъ червя во время полнаго пищеваренія, то растертый листъ, наполняющій его отъ одного конца до другаго, не обнаружитъ никакихъ микроскопическихъ организмовъ. Тамъ окажутся только клѣтки ткани листа, зеленая клѣтки хлорофилла и остатки воздухоносныхъ путей. Подъ вліяніемъ жидкостей, выдѣляемыхъ желѣзками, испещряющими оболочки кишечного канала, зародыши организмовъ перевариваются или же ихъ развитіе останавливается. Пищеварительныя отправленія шелковичныхъ червей отличаются такою большою энергией, что ими все захватывается и разрушается, какъ это дѣлается съ самими листьями.

Но пусть только, по тому или другому обстоятельству, пищевареніе червя замедлится или простоятъ, — тогда эти виѣшіе зародыши, поглощенные въ кишечный каналъ одновременно съ пищею червя, дадутъ мѣсто размноженію микроскопическихъ существъ, которые постоянно образуются въ листѣ, искусственно растертомъ въ небольшомъ количествѣ воды. И какія причины не могутъ только препятствовать этимъ пищеварительнымъ отправленіямъ червя, столь важнымъ для суще-

ства, которое въ промежуткѣ одного мѣсяца изъ полумилитрамма вѣса достигаетъ вѣса въ 5, 6, 7 и 8 граммъ! Пастеръ констатировалъ, что во всѣхъ случаяхъ, когда червь поражался флашери, въ его пищеварительномъ каналѣ находился рядомъ съ пищею тотъ или другой, или даже всѣ тѣ микроскопическіе организмы, которые постоянно встрѣчаются въ растертомъ листѣ. «Всякій мертвенный червь — говорилъ Пастеръ, резюмируя какъ-бы въ афоризмѣ рядъ своихъ наблюденій, — есть червь съ плохимъ пищевареніемъ, и обратно: всякий червь съ плохимъ пищевареніемъ обреченъ на погибель отъ сонной болѣзни или же даетъ развитіе куколкѣ или бабочки, жизнь которыхъ не протечетъ нормально вслѣдствіе тѣхъ пораженій, которыя причинены организованными ферментами.»

Признаки болѣзни при флашери крайне разнообразны, также какъ и при пебринѣ. Все зависитъ отъ силы болѣзни, то есть отъ изобилія и природы паразитовъ, развившихся въ кишечномъ каналѣ, и все также зависитъ отъ періода жизни червя, въ который это броженіе начало обнаруживаться. Самые опасные изъ всѣхъ этихъ ферментовъ суть тѣ, которые принадлежатъ къ семье вибріоновъ. Если они появляются въ первые фазы жизни червя, то онъ быстро погибаетъ. Онъ скоро подвергается разложенію и иногда превращается въ кусочекъ гнили. Но часто болѣзнь проявляется при особенно печальныхъ и несчастныхъ условіяхъ для шелковода. Червоводня имѣла самый прекрасный видъ до періода всползанія на коконники; смертность едва достигала двухъ или трехъ на сто, что не имѣть значенія; линьки совершились съ полной правильностью. Но, вдругъ, черезъ нѣсколько дней послѣ четвертой линьки, черви дѣлаются вялыми; они съ трудомъ ползаютъ, медленно берутся за листъ, когда имъ его бросаютъ на плетенки. Если нѣкоторые изъ нихъ всползли на коконники, то вытягиваются на вѣточкахъ съ тѣломъ, наполненнымъ пищею, которой они не въ состояніи переварить. Иногда они такъ остаются безъ движенія до самой смерти, или свисаютъ и удерживаются лишь своими ложными ножками. Тѣ рѣдкія бабочки, которая успѣли пробить свой коконъ, не содержатъ ни малѣйшаго тѣльца;

онѣ могутъ откладывать грену, но эта грана, рожденная отъ ослабленныхъ родичей, дастъ въ слѣдующемъ году потомство, которому будетъ грозить флашери. Въ этомъ смыслѣ флашери можетъ считаться наследственнаю болѣзнью, хотя паразиты кишечнаго канала, отъ которыхъ она зависитъ, никогда не переходятъ въ грену или въ червей, которые рождаются изъ послѣдней. Черви лишь поражены въ своей жизнеспособности и, не имѣя силъ сопротивляться всѣмъ вліяніямъ, могущимъ вредить ихъ пищеварительнымъ отправленіямъ, они имѣютъ плохіе шансы достигнуть полнаго развитія.

Черезъ-чуръ большое скопленіе червей въ червоводнѣ, слишкомъ значительное повышеніе температуры во время линекъ, гроза, располагающая органическія вещества къ броженію, употребленіе въ пищу разогрѣтаго или смоченнаго листа, въ особенности смоченнаго туманомъ или утреннею и вечернею росою, которая скапливаютъ на листѣ зародыши, взвѣшенныя въ большой массѣ воздуха — вотъ сколько причинъ способно уменьшить дѣятельность пищеварительныхъ отправленій червя, и вызвать, вслѣдствіе броженія листа въ кишечномъ каналѣ, флашери. Часто также флашери зависитъ отъ промаховъ, совершенныхъ шелководомъ при уходѣ, требуемомъ его драгоценною «скотиною», какъ выражались въ XVI столѣтіи.

Въ одной китайской книжѣ о выкормкѣ шелковичныхъ червей находится рядъ маленькихъ практическихъ совѣтовъ. «Лице, ухаживающее за шелковичными червями, — говоритъ это руководство, написанное прекраснымъ шелководомъ, — должно носить простое, а не двойное платье: оно тогда будетъ регулировать температуру червоводни по тому чувству холода и тепла, которое оно будетъ испытывать. Если оно будетъ чувствовать холода, то сообразитъ, что и червямъ холодно, и увеличитъ огонь; если ему будетъ жарко, то сдѣлаетъ заключеніе, что и червямъ жарко, и уменьшить сообразно этому огонь.»

До опытовъ Пастера ничего не знали о заразительныхъ свойствахъ флашери. Эта заразительность можетъ превышать, съ точки зрѣнія продолжительности опасности, заразительность самой пебрины. И дѣйствительно, въ пебришъ высушеннаго тѣльца

теряютъ свою заразительность въ промежуткѣ нѣсколькихъ недѣль. Пебрина не въ состояніи передаваться съ одного года на другой, при посредствѣ пыли изъ тѣлца въ червоводнѣ. Напротивъ, зародыши микроскопическихъ организмовъ, вызывающіе броженіе листа тутового дерева, а особенно вибріоны, сохраняютъ свою жизненность въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Пыль въ червоводнѣ, зараженной флашери, представляется подъ микроскопомъ переполненною кистами или спорами вибріоновъ. Кисты или споры спятъ, подобно красавицѣ въ спящемъ лѣсу, до того времени, пока капля воды не упадетъ на нихъ, разбудить и вызоветъ ихъ къ жизни. Отложившись на листъ, который пойдетъ въ пищу, эти зародыши вибріоновъ проникаютъ въ пищеварительный каналъ червей, развиваются, размножаются и нарушаютъ пищеварительная отправленія червей, если только эти отправленія не имѣютъ такой силы, чтобы тотчасъ простоять развитіе этихъ зародышей и переварить ихъ. Послѣднее и бываетъ, когда черви находятся въ полномъ здравіи. Тутъ происходитъ борьба за жизнь, и черви часто остаются побѣдителями.

Когда Пастеръ давалъ совершенно здоровымъ червямъ юду изъ листьевъ, покрытыхъ сухою пылью, взятою изъ червоводни, которая въ предшествовавшемъ году была заражена пебриною и флашери, онъ у нихъ вызывалъ флашери, но никогда не пебрину; онъ еще скрѣе вызывалъ первую изъ этихъ болѣзней, если онъ имъ давалъ юду изъ листьевъ, загрязненныхъ содержимымъ кишечнаго канала червей, больныхъ флашери. Подобно тому, какъ и при пебринѣ, — изверженія червей, пораженныхъ флашери, загрязняя листья на подстилкѣ, вносятъ болѣзнь въ здоровыхъ червей или увеличиваютъ опасное броженіе въ каналѣхъ червей, которые уже частью захвачены болѣезнью.

Чтобы предохранить червей отъ случайного заболѣванія флашери, достаточно гигиеническаго ухода. Что касается наслѣдственной флашери, или, лучше говоря, той, которая легко передается, благодаря уменьшенію жизнеспособности въ яйцѣ и въ зародышѣ, то Пастеръ, прибѣгнувши еще разъ къ микроскопу, нашелъ противъ нея средство. Благодаря микроскопу, можно

себѣ дать отчетъ въ состояніи здоровья червей, куколокъ и бабочекъ, предназначенныхъ къ производству гренъ, которую хотятъ употребить для выводковъ. Все вниманіе должно быть обращено на полное отсутствіе ферментовъ въ кишечномъ каналѣ червей и въ желудочномъ расширениі куколокъ, въ этомъ маленькому расширениі, въ которое превращается весь кишечный каналъ червя и его болѣе или менѣе измѣнившееся содержимое. Но если не располагаютъ временемъ, нужнымъ для этихъ микроскопическихъ изслѣдований паразитныхъ ферментовъ, то можно довольствоваться простымъ наблюденіемъ надъ червями въ концѣ ихъ послѣдняго превращенія. Пастеръ особенно настаивалъ на этомъ наблюденіи надъ червями въ тотъ періодъ, когда они всползаютъ на коконники.

«Если я быль-бы шелководомъ, — писалъ онъ въ своей прекрасной книгѣ о болѣзни шелковичнаго червя, — я никогда не выводилъ-бы гренъ, рожденной отъ червей, которыхъ я не наблюдалъ бы много разъ въ теченіе послѣднихъ дней ихъ жизни, что-бы убѣдиться въ ихъ крѣпости или въ ихъ проворствѣ въ моментъ, когда они прядутъ свой шелкъ. Употребляйте грену, происходящую отъ бабочекъ, черви которыхъ всползали проворно на коконники, не давая смертности отъ флашери между четвертою линькою и всползаніемъ, и не содержали ни одного тѣльца пебрины, — и всѣ выводки у васъ будутъ удачны!»

III.

Вотъ мы, наконецъ, пришли къ заключенію этого длиннаго изслѣдованія. Весь мракъ, покрывавшій вначалѣ болѣзни шелковичнаго червя, былъ отнынѣ разсѣянъ. Пастеръ такъ хорошо изучилъ какъ причины болѣзней, такъ и разнообразныя ихъ проявленія, что онъ былъ въ состояніи вызывать по своему произволу то пебрину, то флашери; онъ могъ постепенно увеличивать силу болѣзни, устроить такъ, чтобы она проявилась въ такой-то день, почти въ такой-то часъ. Но что нужно было, чтобы перенести въ практическую жизнь результаты его лабораторныхъ работъ?

Уже съ самаго начала бѣствія и послѣ нѣкоторыхъ колебаній, которыя вскорѣ были разсѣяны, пришли къ заключенію, что всю болѣзнь слѣдуетъ приписать дурному качеству гренѣ. Употребленное палліативное средство, состоявшее въ дальнихъ поискахъ за незараженными сѣменами, было и недостаточно и ненадежно. Это значило искать очень далеко и платить очень дорого за грену, въ которой нельзя было быть увѣреннымъ. Спасеніе шелководства могло только получиться изъ знанія способовъ, способныхъ возвратить туземнымъ гренамъ ихъ первоначальныя качества.

Для рѣшенія этой задачи достаточно было тѣхъ результата́тъ, которые получены были Пастеромъ. Бороться съ флашери оказалось легкимъ дѣломъ, но нужно было еще бороться съ пебриою. Чтобы одолѣть эту грозную болѣзнь, Пастеръ изобрѣлъ рядъ крайне простыхъ пріемовъ.

Представимъ себѣ черводоню, имѣвшую полный успѣхъ. Линьки, всползаніе на коконники, — все не оставляетъ ничего желать. Коконы закончены, ожидается только выходъ бабочекъ. Онѣ являются, онѣ совокупляются. Вотъ, когда начинается роль шелковода, заботящагося о гренажѣ (полученіи гренѣ). Къ концу дня онѣ изолируютъ спаровавшихся бабочекъ и кладетъ каждую самку на маленькие лоскутки полотна, развѣшанные горизонтально. Самки кладутъ свои яички. По окончаніи кладки, берутъ каждую самку по очереди и прикалываютъ ее сквозь крылья къ загнутому углу лоскутка, гдѣ собраны нѣсколько сотенъ яичекъ, которыя она отложила. Можно было бы къ другому углу каждого лоскутка также приколоть и самца, но дознано, что дальнѣйшее изслѣдованіе самца не нужно: онѣ не передаетъ пебрины. Бабочка-самка, высохшая при свободномъ соприкоснovenіи съ воздухомъ, изслѣдуется на досугѣ, будетъ-ли это даже осеню или зимою. Ничего нѣть легче, какъ выяснить, заключаются-ли въ трупѣ тѣльца. Бабочку растираютъ въ ступкѣ, разбавляютъ небольшимъ количествомъ воды и разсматриваютъ подъ микроскопомъ каплю этой кашицы. Если находятъ малѣйшее тѣльце, то знаютъ, какой лоскутокъ полотна соотвѣтствуетъ изслѣдованной бабочекѣ, и сжигаютъ полотно и яички.

Собственно говоря, этотъ способъ полученія чистой грены есть только логическое и опытомъ подтвержденное развитіе тѣхъ первыхъ выводовъ, которые Пастеръ представилъ въ іюнѣ 1865 года земледѣльческому комитету въ Алѣ. Въ то время Пастеръ могъ только надѣяться, и то не безъ нѣкоторой робости, на отысканіе способа приготовленія здоровой грены въ очень маломъ количествѣ, необходимомъ для его изслѣдованій; но обстоятельства такъ сложились, что исходная точка, которая казалась чисто научною, заключала въ себѣ будущность метода, годаго къ широкому практическому примѣненію. Этотъ способъ гренажа теперь всюду принятъ. Въ Нижнихъ-Альпахъ, Ардешѣ, Гарѣ, Дромѣ и за-границею можно видѣть повсюду, во время гренажа, мастерскія, въ которыхъ женщины и молодыя дѣвушки сотнями заняты — съ замѣчательнымъ раздѣленіемъ труда и подъ строгимъ контролемъ, усиленнымъ еще искусствными помощниками, — растираніемъ бабочекъ, микроскопическимъ изслѣдованиемъ, сортировкою и распределеніемъ маленькихъ лоскутковъ, на которыхъ отложены грены.

Но если Пастеръ и возстановилъ богатства въ разоренныхъ краяхъ, если онъ и возвратился въ Парижъ, счастливый одержанною побѣдою, то онъ однако перенесъ столько трудовъ, онъ столько злоупотреблялъ микроскопомъ во время этихъ ежедневныхъ и разнообразныхъ опытовъ, что въ октябрѣ мѣсяцѣ 1868 г. онъ былъ пораженъ апоплектическимъ ударомъ и параличемъ всей половины тѣла. Въ моментъ, когда онъ видѣлъ уже приближающуюся смерть, онъ продиктовалъ своей женѣ послѣднее сообщеніе касательно изслѣдованій, которыя были такъ близки его сердцу. Это сообщеніе было передано Академіи Наукъ черезъ восемь дней послѣ ужаснаго удара.

Кончилось тѣмъ, что душа, въ такой степени господствующая надъ его тѣломъ, преодолѣла болѣзнь. Но, парализованный во всей лѣвой половинѣ тѣла, Пастеръ съ тѣхъ поръ не могъ больше вполнѣ пользоваться своими членами. Теперь еще, шестнадцать лѣтъ послѣ этого удара, онъ ходить, какъ инвалидъ; сколько однако походовъ этотъ инвалидъ еще долженъ быть совершилъ, и сколько побѣдъ еще ему было предназначено!

Рѣшительные опыты.

Продиктовавъ это научное сообщеніе, которое онъ уже считалъ послѣднимъ, Пастеръ на мгновеніе упалъ духомъ. «Я сожалѣю о томъ, что умираю — сказалъ онъ своему другу Сень-Клеръ Девилю, поспѣшившему навѣстить больнаго — я бы желалъ оказать больше услугъ моей родинѣ.»

Кончилось тѣмъ, что смерть удалилась, но Пастеръ, въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ, оставался вполнѣ парализованнымъ и не былъ способенъ сдѣлать ни малѣйшаго движенія. Пораженный въ такой степени, въ самый расцвѣтъ своихъ силъ, когда ему было всего сорокъ пять лѣтъ, онъ вполнѣ сознавалъ свое жестокое положеніе. Ясность ума, впрочемъ, не покидала его даже въ самое худшее время апоплексического удара. Онъ описалъ врачу, безъ дрожанія въ голосѣ, весь послѣдовательный ходъ паралича. Но упрекая себя въ томъ, что, опредѣляя такъ точно свою болѣзнь, онъ этимъ увеличиваетъ печаль своей жены, онъ ужъ потомъ ни слова не вымолвилъ о своемъ положеніи, какъ пациента и больнаго. Иногда даже, когда его два любезныхъ препаратора, Жерне и Дюкло, преданность которыхъ въ теченіе этихъ печальныхъ дней могла быть только сравнена съ превосходностью самой госпожи Пастеръ, — говорили ему о дальнѣйшихъ работахъ, онъ принималъ участіе въ ихъ соображеніяхъ и показывалъ видъ, что придается вѣру ихъ надеждамъ. Кончилось однако тѣмъ, что эти надежды, дѣйствительно, сбылись.

Въ январѣ 1869 г. Пастеръ такъ былъ взволнованъ противорѣчіями, вызванными предложеніемъ имъ способомъ гренажа, что онъ, хотя еще не былъ въ состояніи протащиться по комнатѣ, задумалъ отправиться въ Алѣ. «Мы попытаемся сдѣлать — сказалъ онъ — ранніе опыты надъ шелковичными червями, пользуясь системою искусственныхъ выкормокъ, и сведемъ къ нулю послѣдняя возраженія. Тутъ рѣчь идетъ о научномъ вопросѣ и одномъ изъ элементовъ народнаго богатства».

Пришлось уступить его желанию. Но это было ужасное путешествие, полное беспокойства! На разстоянии нѣсколькихъ лѣтъ отъ Алѣ, въ Сенъ-Ипполитъ-дю-Форѣ, производились эти ранніе опыты. Здѣсь-то остановился Пастеръ. Онъ устроился, или, вѣрнѣе сказать, расположился со своимъ семействомъ и препараторами въ одномъ, болѣе чѣмъ скромномъ домѣ, въ одномъ изъ тѣхъ плохихъ, холодныхъ и вымощенныхъ плитами домовъ, какіе встрѣчаются въ провинціи. Сидя въ своемъ глубокомъ креслѣ, Пастеръ управлялъ опытами и провѣрялъ точность наблюдений, которыхъ онъ сдѣлалъ въ предшествовавшемъ году. Всякое изъ его предсказаній относительно судьбы той или другой червоводни оправдалось во всѣхъ малѣйшихъ подробностяхъ. Ближайшою весною онъ переѣхалъ въ Алѣ и прослѣдилъ за предпринятыми выводками во всѣхъ ихъ фазахъ, начиная отъ грены и кончая кокономъ. Онъ имѣлъ удовольствіе убѣдиться еще разъ въ пригодности предложенного имъ способа.

Но оппозиція все еще продолжалась: французское правительство не рѣшалось признать достоинство предложенного Пастеромъ способа гренажа, въ виду силы и упорства, съ которыми высказывались его противники. Въ дѣло вмѣшался императоръ. Онъ поручилъ маршалу Вайльяну предложить Пастеру отправиться въ Австрію, въ принадлежавшую императорскому принцу виллу Вицентину. На этой виллѣ, уже въ теченіе десяти лѣтъ, сборъ съ шелковичныхъ червей даже не покрывалъ расходовъ на покупку грены, которая тамъ употреблялась на выводки. Пастеръ съ радостью принялъ предложеніе, имѣя въ перспективѣ большой контрольный опытъ. Онъ проѣхалъ, лежа въ вагонѣ или будучи переносимъ въ креслѣ, черезъ Францію и Италію и, наконецъ, прїѣхалъ въ императорскую виллу близъ Триеста. Выводки изъ пастеровской грены удались на славу. Продажа коконовъ дала виллѣ чистаго барыша двадцать шесть тысячъ франковъ. Императоръ, убѣдившись въ практической цѣнности способа, возвелъ Пастера, въ іюлѣ 1870 года, въ званіе сенатора; но это назначеніе не успѣло появиться въ *Официальной газетѣ*; оно исчезло вмѣстѣ со многими другими дѣлами. Пастеръ, впрочемъ, совершенно не думалъ о титулѣ

сенатора. Онъ возвратился во Францію наканунѣ объявленія войны.

Будучи патріотомъ до глубины души, онъ съ острою болью прислушивался къ первымъ нашимъ несчастіямъ. Извѣстія о пораженіяхъ, слѣдовавшія другъ за другомъ съ такимъ мрачнымъ однообразіемъ, ввергли его въ отчаяніе. Въ первый разъ въ своей жизни онъ не имѣлъ болѣе силъ работать. Онъ жилъ, какъ побѣжденный, въ своемъ маленькомъ домѣ въ Арбуа. Часто, вошедши въ его комнату, можно было его видѣть съ лицомъ, орошеннымъ слезами. 18-го января 1871 года онъ написалъ декану медицинскаго факультета Боннскаго университета письмо, въ которомъ отразились и его печаль и его гордость, какъ француза. Въ немъ онъ проситъ принять обратно дипломъ нѣмецкаго доктора, которымъ онъ былъ пожалованъ въ 1868 г. медицинскимъ факультетомъ Боннскаго университета.*.) Въ то время, какъ онъ писалъ письмо, которое было воплемъ патріотизма, его сынъ, опредѣлившійся волонтеромъ и едва имѣя восемнадцать лѣтъ, храбро исполнялъ свой долгъ въ рядахъ западной арміи.

Изслѣдованія о пивѣ.

Война кончилась; мало по малу жизнь вступила въ свои права, явились желаніе работать. Пастеръ, наконецъ, почувствовалъ, послѣ двухъ лѣтъ болѣзни, начинающееся выздоровленіе. Это было какъ-бы тихое и спокойное возрожденіе. У него явились желаніе какъ можно скорѣе возвратиться въ Парижъ, вернуться въ свою лабораторію, привести въ исполненіе новые опыты, которые уже давно зародились въ его умѣ. Но въ此刻ъ, когда онъ хотѣлъ отправиться, вспыхнула коммуна. Тогда Дюкло, сдѣлавшійся профессоромъ факультета естественныхъ наукъ въ Клермонъ-Феранѣ, предложилъ своему учителю Клермонскую лабораторію. Пастеръ принялъ предложеніе. Торопясь начать изслѣдованіе, которое опять привело бы его къ броженіямъ, онъ приступилъ къ изученію болѣзней пива. Но не единствено

*.) См. въ приложеніяхъ.

потому онъ занялся подобнымъ предметомъ, что хотѣлъ создать связь между новыми и предыдущими изслѣдованіями; имъ руководила также идея, нѣсколько патріотическая: онъ мечталъ достигнуть успѣха путемъ лабораторныхъ работъ въ отрасли промышленности, въ которой Германія настъ превосходила. Онъ надѣялся, что со временемъ французское пиво, — благодаря научнымъ началамъ, которыми широко воспользуется торговля, — будетъ пользоваться одинаковою, если даже не болѣею, репутаціею, что и нѣмецкое.

Пиво гораздо больше расположено къ болѣзнямъ, нежели вино. Можно даже сказать, что существуютъ старыя вина, но не существуетъ старого пива. Оно, нѣкоторымъ образомъ, потребляется по мѣрѣ производства. Содержа меныше кислоты и алкоголя, нежели вино, пиво въ то же время богаче камедистыми и сахаристыми веществами, которые дѣлаютъ его болѣе подверженнымъ скорой порчѣ. Вслѣдствіе этого торговля этимъ напиткомъ находится въ постоянной борбѣ съ трудностью его сохраненія.

Производство пива отличается простотою. Пиво получается изъ муки проросшаго ячменя или солода, изъ которого приготавляется настой на постепенно усиливающемся огнѣ, каковой настой доводится до кипѣнія; потомъ къ нему прибавляютъ хмѣля для аромата. Когда настой солода и хмѣля, называемый пивнымъ сусломъ, готовъ, его подвергаютъ охлажденію, чтобы затѣмъ разлить по чанамъ или бочкамъ. Тогда оно подвергается алкогольному броженію.

Охлажденіе должно совершаться быстро. Пока сусло имѣетъ высокую температуру, опасаться нечего, оно остается здоровымъ; но если оно доходитъ до температуры ниже 70 градусовъ, а въ особенности до 25 — 35 градусовъ, то оно легко захватывается вредными ферментами, каковы ферменты уксусный, молочный и масляный. Послѣ того какъ сусло охладилось, его «заправляютъ» дрожжами, то есть прибавляютъ къ нему ферментъ или дрожжей, образовавшихся во время предшествовавшаго броженія пивнаго сусла. Заправка дрожжами вызывается необходимостью подвергнуть всю массу сусла, послѣ его охлажденія

и по возможности скорѣе, одному броженію — спиртному, единственно производящему настоящее пиво. Если бы съ этимъ сусломъ поступали такъ же, какъ съ винограднымъ сокомъ, если-бы его предоставили броженію безъ дрожжей, такъ называемому самопроизвольному броженію, то это броженіе никогда не было-бы чисто спиртнымъ, противоположно тому, что происходит съ винограднымъ сокомъ, который охраняется имѣющейся въ немъ кислотностью. Вместо пива чаще всего получался бы напитокъ кислый и гнилой. Развились-бы и расплодились-бы различныя броженія. Когда сусло перебродило и пиво готово, тогда снова возникаютъ опасенія, въ виду его свойства легко портиться, вслѣдствіе чего требуется, чтобы оно быстро было потреблено. Это условіе часто пагубно вліяетъ на торговлю этимъ напиткомъ. Поэтому, въ теченіе почти сорока лѣтъ, усовершенствованія въ производствѣ пива имѣли главною цѣлью устраненіе этой необходимости, такъ сказать, ежедневнаго производства, въ то время какъ спросъ на его потребленіе подверженъ различнымъ колебаніямъ.

Когда-то знали только одинъ сортъ пива — пива верхняго броженія. Пивное сусло, послѣ того какъ оно охладилось въ корытахъ (бакахъ), сливаются въ большой открытый чанъ при температурѣ въ 20 градусовъ и къ нему прибавляются дрожжи. Когда броженіе начинаетъ обнаруживаться на поверхности жидкости въ видѣ бѣлой легкой пѣнки, тогда сусло разливается въ ряды маленькихъ бочекъ, которые также размѣщены въ погребахъ или подвалахъ, съ температурою въ 18 — 20 градусовъ. Благодаря броженію, вскорѣ выступаетъ пѣна, которая дѣлается все болѣе и болѣе густою и вязкою. Она обусловливается обиліемъ дрожжей, въ ней заключенныхъ. Эти дрожжи, собираемыя потомъ въ обыкновенный желобъ, помѣщающійся подъ бочками, сохраняются, какъ закваска, для дальнѣйшихъ операций. Броженіе продолжается отъ трехъ до четырехъ дней. Пиво тогда готово и стало прозрачнымъ. Бочки тогда закрываются втулками и отправляются прямо къ торговцу или къ потребителю. Во время перевозки, извѣстное количество дрожжей, опустившееся на дно бочекъ, мутитъ пиво,

но достаточно нѣсколькихъ дней покоя, чтобы сдѣлать его снова прозрачнымъ и годнымъ къ питью или къ разливкѣ въ бутылки.

Эта система верхняго броженія, называемая такимъ образомъ потому, что она начинается при 18 — 20 градусахъ и подымается еще на 1—2 градуса, благодаря самому акту броженія, — примѣняется еще очень часто въ сѣверной Франціи, и особенно на англійскихъ пивоваренныхъ заводахъ. Эль, бѣлый эль (*pale-ale*) и горькое пиво (*bitter-beer*) суть всѣ пива верхняго броженія.

Низкое броженіе, почти исключительно примѣняемое въ Германіи и все болѣе и болѣе распространяющееся во Франції, состоитъ въ медленномъ броженіи при низкой температурѣ, во время которого дрожжи опускаются на дно чановъ или бочекъ. Пивное сусло послѣ своего охлажденія разливается по открытымъ деревяннымъ чанамъ, а заправка дрожжами производится приблизительно при 6 градусахъ Цельзія. Эта температура поддерживается въ продолженіе всего броженія, при помощи плавающихъ сосудовъ (*nageurs*) въ формѣ конусовъ или цилиндовъ, опрокинутыхъ въ бродильныхъ чанахъ и содержащихъ ледъ. Продолжительность броженія составляетъ десять, пятнадцать и даже двадцать дней. Дрожжи собираются, послѣ того какъ пиво слито, на днѣ бродильныхъ чановъ. Этотъ родъ пива, которое называется нѣмецкимъ или страсбургскимъ пивомъ, вообще цѣнится выше другихъ сортовъ, но оно требуетъ извѣстной обстановки, убыточной или, по меньшей мѣрѣ, не совсѣмъ удобной. Необходимы ледники, въ которыхъ температура въ теченіе всего года держалась бы только на нѣсколько градусовъ выше нуля. Отсюда необходимость громадныхъ запасовъ льда. Высчитано, что для одного гектолитра хорошаго пива, отъ начала охлажденія сусла до момента отпуска въ продажу, требуется 100 килограммовъ льда. Пиво низкаго броженія есть, т. наз., пиво въ прокѣ (*de garde*). Оно фабрикуется преимущественно зимою и сохраняется въ ледникахъ до лѣта.

Но не для того только, чтобы угодить вкусу потребителя, распространилась повсюду, за исключеніемъ Англіи, фабрикація пива низкаго броженія, но при этомъ имѣлась въ виду та выгода, что пиво, приготовленное холоднымъ путемъ, значительно

менѣе подвержено порчѣ, нежели другое. Примѣня ледъ, пивоваръ можетъ производить фабикацію зимою и въ началѣ весны, и въ состояніи удовлетворить спросу потребителя, не опасаясь, что пиво въ его огромныхъ бочкахъ будетъ поражено болѣзнями.

Всѣ эти болѣзни имѣютъ, какъ это доказалъ Пастеръ, исключительною причиною развитіе маленькихъ микроскопическихъ грибковъ, организованныхъ ферментовъ, попавшихъ вмѣстѣ съ пылинками, которая наносятся безпрерывно воздухомъ и которая грязнятъ всѣ вещества, первоначально употребленныя для фабикаціи. «Подъ выраженіемъ болѣзни сусла и пива я разумѣю — писалъ Пастеръ — тѣ глубокія измѣненія, которая извращаютъ свойства этихъ жидкостей до такой степени, что онѣ дѣлаются весьма противными на вкусъ, — въ особенности, если эти измѣненія совершились долгое время, — и которая заставляютъ сказать о пивѣ, что оно кисло, Ѣдко, испорчено, тягуче, гнило.» Опыты Пастера доказали, что пивное сусло, если оно доведено было до кипѣнія, сохраняется безконечное время, даже когда оно подвергалось дѣйствію наиболѣе высокой атмосферной температуры и приходило въ соприкосновеніе съ чистымъ воздухомъ, свободнымъ отъ низшихъ микроскопическихъ зародышей. Это пивное сусло, заправленное чистыми дрожжами, содержащими только обыкновенный спиртный ферментъ, безъ примѣси другихъ ферментовъ, не испытываетъ другихъ измѣненій, кромѣ тѣхъ, которая зависятъ отъ дѣйствія кислорода, и не развиваетъ кислой, горькой или гнилой жидкости. Если принять во вниманіе, что причины порчи пива тѣ же, что и для вина, и что зародыши ферментовъ, повсюду распространенные, всюду угрожаютъ пиву, то не должна ли была высокая температура показаться, съ первого взгляда, лучшимъ предохранительнымъ средствомъ? Но пиво представляеть собою жидкость, которая должна быть обязательно насыщенной угольною кислотою, и примѣненіе нагреванія къ большимъ массамъ жидкости удалило бы этотъ газъ. Пытаться сохранить его или ввести его вновь послѣ его удаленія — было бы весьма сложнымъ дѣломъ. Но всѣ эти затрудненія перестаютъ существовать, когда пиво уже разлито по бутылкамъ

Нагрѣваніе до температуры въ 50—55 градусовъ не только не лишаетъ пива его угольной кислоты, но ни-чуть не мѣшаетъ вторичному броженію совершаюся въ извѣстной мѣрѣ, почему можно производить нагрѣваніе, тотчасъ послѣ разливки по бутылкамъ. Такимъ образомъ, нагрѣваніе пива нашло примѣненіе въ Европѣ и Америкѣ въ большихъ размѣрахъ. Въ уваженіе къ трудамъ Пастера эта операциѣ носитъ название *Пастеризаціи*, а пиво называется *пастеризованнымъ* пивомъ.

Но Пастеръ не пожелалъ удовольствоваться однимъ разрушениемъ ферментовъ этихъ болѣзней; онъ хотѣлъ еще, главнымъ образомъ, воспротивиться ихъ прониканію. Если воспользоваться моментомъ, когда пивное сусло подвергается кипяченію, при которомъ зародыши болѣзней разрушаются дѣйствиемъ жара, и совершать охлажденіе сусла въ соприкосновеніи съ воздухомъ, свободнымъ отъ внешнихъ зародышей, которые сами дрожжи не могутъ занести, — то пиво будетъ произведено, при условіяхъ исключительной чистоты. Нѣкоторые пивовары, принявши за основаніе принципы, развитые Пастеромъ, устроили аппараты, дающіе возможность охлаждать пивное сусло, безъ доступа организмовъ воздуха, и производить броженіе этого сусла, при помощи наивозможнѣ чистыхъ дрожжей. На Амстердамской выставкѣ можно было видѣть на-половину наполненные бутылки, содержащія пиво абсолютно прозрачное, початое съ самаго открытия выставки. Это было французское пиво, сфабрикованное по принципамъ Пастера крупнымъ марсельскимъ пивоваромъ, г. Велтеномъ. Счастливое значеніе этихъ изслѣдований было всѣми признано. Якобсенъ, въ Копенгагенѣ, воздвигнуль въ почетной залѣ своей знаменитой лабораторіи бюстъ Пастера, сдѣланный Полемъ Дюбуа.

Заканчивая свои *изслѣдованія о пивѣ*, Пастеръ припомнилъ тѣ принципы, которые руководили его работами въ теченіе двадцати лѣтъ. Плодотворность и примѣнимость этихъ принциповъ казались ему безпредѣльными. «Этіологія заразныхъ болѣзней — писалъ онъ съ вполнѣ научнымъ убѣжденіемъ — находится, быть можетъ, наканунѣ дня, когда на нее, благодаря этимъ принципамъ, упадетъ неожиданный свѣтъ.»

Заразныя болѣзни.

Сибирская язва. — Септицемія (инилокровіе).

«Тотъ, кто съумѣетъ проникнуть въ сущность ферментовъ и процессовъ броженія, — сказалъ однажды физикъ Робертъ Бойль — въ состояніи будетъ скорѣе кого-либо другаго найти настоящее объясненіе для различныхъ болѣзненныхъ явленій, какъ при лихорадочныхъ процессахъ, такъ и въ другихъ болѣзняхъ. Очень вѣроятно, что, безъ основательнаго знанія теоріи броженій, никогда не будутъ точно поняты болѣзненные процессы.»

И дѣйствительно, медицинскія теоріи, и въ особенности теоріи, касающіяся происхожденія заразныхъ болѣзней, представляли собою во всѣ эпохи — отраженія теорій, изобрѣтенныхъ для объясненія явленій броженія. Когда Пастеръ предпринялъ въ 1856 году свои первыя изслѣдованія, идеи Либиха были въ полной силѣ. Его теорія господствовала повсюду и, какъ относительно броженія, заразное начало и болѣзненные процессы разматривались, какъ явленія, происходящія отъ особенного движения, свойственнаго веществамъ, находящимся на пути къ разложенію, и способнаго передаваться различнымъ составнымъ частямъ живаго организма.

Изслѣдованія Пастера о роли микроскопическихъ организмовъ въ процессахъ броженія измѣнили и эти воззрѣція. Пришлось вернуться обратно къ старой медицинской теоріи о паразитизмѣ и живомъ контагіи. Одинъ нѣмецкій профессоръ, д-ръ Траубе, изложилъ въ 1864 году въ одной изъ своихъ клиническихъ лекцій новую теорію аммоніакального броженія мочи.

«Уже давно, — сказалъ онъ, — считали слизь мочеваго пузыря причиной щелочнаго разложенія мочи. Думали, что растяженіе пузыря, происходящее отъ задержанія мочи, раздражаетъ стѣнки пузыря, вслѣдствіе чего образуется большее количество слизи, а эта слизь служитъ ферментомъ, разлагающимъ мочу своей особенной химической силой. Это мнѣніе (теорія Либиха) не можетъ устоять послѣ изслѣдованій Пастера. Этотъ послѣдній

наблюдатель доказалъ неопровергимымъ образомъ, что щелочное броженіе, какъ и спиртовое броженіе, уксусное, производится живыми организмами, присутствіе которыхъ при актѣ броженія есть необходимое условіе процесса.» И цитируя факты, подтверждающіе теорію Пастера, профессоръ Траубе дѣлаетъ слѣдующее заключеніе: «Не смотря на продолжительное задержаніе мочи, щелочное броженіе ея не произошло бы отъ усиленного выдѣленія слизи или гноя; оно начинается только съ момента появленія въ мочѣ зародышей вибріоновъ, попавшихъ въ пузырь извиѣ.»

Такимъ образомъ ясно видно, какъ вліяли двѣ противу-положныя теоріи, Либиха и Пастера, на объясненіе причинъ одной изъ самыхъ тяжелыхъ болѣзней мочеваго пузыря. Уже въ 1862 г., въ своемъ мемуарѣ о самопроизвольномъ зарожденіи Пастеръ заявилъ, вопреки всѣмъ принятymъ до тѣхъ поръ мнѣніямъ, что амміачное броженіе мочи происходитъ только отъ присутствія микроскопическаго грибка. Потомъ онъ убѣдился, что при болѣзняхъ пузыря никогда не бываетъ въ немъ амміачной мочи безъ присутствія этого грибка. Чтобы доказать, насколько при подобнаго рода изслѣдованіяхъ терапевтическій приемъ можетъ тотчасъ слѣдоватъ за научнымъ фактамъ, Пастеръ, убѣдившись предварительно со своимъ сотрудникомъ Жуберомъ въ томъ, что борная кислота препятствуетъ развитію этого аммоніакального бродила, посовѣтовалъ Гюйону, профессору парижскаго медицинскаго факультета по болѣзнямъ мочевыхъ органовъ, бороться съ опасной болѣзнью, — амміачнымъ разложеніемъ мочи, — впрыскиваніемъ въ пузырь раствора борной кислоты. Знаменитый хирургъ поспѣшилъ воспользоваться этимъ совѣтомъ и получилъ благопріятные результаты. Признавая, что вся честь этого нововведенія принадлежить Пастеру, Гюйонъ сказалъ въ одной изъ своихъ лекцій:

«Борная кислота имѣеть то громадное преимущество, что она можетъ быть употреблена въ очень сильныхъ растворахъ — 3-хъ и 4-хъ процентныхъ, не вызывая никакой боли. Поэтому борная кислота употребляется въ нашемъ отдѣленіи для промыванія пузыря постоянно и съ хорошими результатами.

Къ раствору же борной кислоты я прибѣгаю послѣ камнедробленія для опорожненія пузыря помошью большихъ промываній; я не дѣлаю ни одной операциіи камнедробленія, не прибѣгаю къ этому антисептическому средству, и никогда при дробленіи мочевыхъ камней я не употребляю для промыванія пузыря другаго средства. Я также доволенъ результатами промыванія борной кислотой въ широкихъ размѣрахъ пузыря и раны при камнесѣченіи. Я кончаю всегда операцию продолжительной ирригацией этимъ же 3-хъ или 4-хъ процентнымъ растворомъ.»

Эти идеи Пастера проникли не только во Францію и Германію. Самые важные терапевтические приемы извлечены изъ работъ Пастера однимъ хирургомъ въ Англіи. Съ 1865 года докторъ Листеръ въ Эдинбургѣ началъ блестящій рядъ своихъ побѣдъ въ хирургіи, достигнутыхъ помошью антисептика, принятой теперь повсюду. Вотъ что онъ писалъ Пастеру, въ февралѣ 1874 года, въ одномъ изъ писемъ, дѣлающихъ честь скромности и искренности этого великаго англійскаго хирурга.

«Я надѣюсь, что Вы прочтете съ нѣкоторымъ интересомъ то, что я писалъ объ одномъ организмѣ, который Вы первый изучили въ вашемъ мемуарѣ о молочномъ броженіи. Не знаю, попадались ли Вамъ на глаза англійскіе хирургические анналы. Въ случаѣ, если Вы ихъ читали, Вы должны были тамъ встрѣтить, отъ времени до времени, новости антисептической хирургіи, которую я стараюсь усовершенствовать въ теченіе послѣднихъ 9 лѣтъ. Позвольте мнѣ воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы сердечно поблагодарить Васъ за то, что Вашими блестящими изслѣдованіями Вы меня убѣдили въ вѣрности зародышевой теоріи гніенія и, такимъ образомъ, дали мнѣ возможность воспользоваться единственнымъ принципомъ, могущимъ привести къ успѣху антисептическій способъ.»

Пастеръ слѣдилъ съ особыннымъ интересомъ за этими новыми идеями и счастливыми примѣненіями, вызванными его работами. Это было только осуществленіемъ его надеждъ, которыя онъ всегда предчувствовалъ. И въ самомъ дѣлѣ, начиная съ 1860 года, онъ всегда выражалъ желаніе «быть въ состояніи довести свои изслѣдованія до того, чтобы подготовить путь къ

изслѣдованию причинъ происхожденія болѣзни." И открывая все новые и новые живые ферменты, онъ надѣялся дойти до познанія причинъ заразныхъ болѣзней.

Однако, онъ долго колебался, прежде чѣмъ рѣшился пойти по этому пути. «Я не врачъ, не ветеринаръ,» говорилъ онъ часто съ чувствомъ скромной неувѣренности. — Наступило однако время, когда, несмотря на всю свою нерѣшительность, онъ не могъ довольствоваться ролью простаго наблюдателя работъ, вызванныхъ его изслѣдованіями о броженіи, о само-произвольномъ зарожденіи и о болѣзняхъ вина и пива. Надежды, которыя возлагались на его методы, восхваленія, которыхъ они были предметомъ, — все это его обязывало идти впередъ. Тиндалль писалъ ему въ февралѣ 1876 года:

«Изучая вновь Ваши работы относительно организмовъ настоевъ, я имѣлъ случай возстановить въ своей памяти Ваши прежнія изслѣдованія; они оживили во мнѣ то восхищеніе, которое я испыталъ при первомъ чтеніи. Я намѣренъ защищать эти изслѣдованія до тѣхъ поръ, пока я разсью всѣ сомнѣнія, которыя могли-бы появиться относительно неоспоримой точности Вашихъ заключеній.»

«Впервые за всю исторію науки мы имѣемъ полное право питать вѣрную надежду, что по отношенію къ эпидемическимъ болѣзнямъ медицина скоро будетъ избавлена отъ эмпиризма и будетъ поставлена на дѣйствителльно научную почву. Когда этотъ знаменательный дѣпъ настанетъ, человѣчество, по моему мнѣнію, должно будетъ признать, что большей частью своей благородности оно обязано Вамъ.»

Пастеръ приступилъ къ изученію причинъ заразныхъ болѣзней, начавъ съ того, что старался изслѣдовать во всѣхъ ея подробностяхъ одну страшную болѣзнь, известную подъ именемъ сибирской язвы (*charbon.*^{*)}) Эта болѣзнь опустошаетъ каждый годъ всѣ стада не только во Франціи, но и въ Испаніи, Италии и Россіи, гдѣ она называется сибирской язвой, въ Египтѣ, гдѣ, говорятъ, она была въ древности одной изъ еги-

^{*)} Синонимы ея въ различныхъ мѣстностяхъ Россіи: горячка, тилей, овечій пострѣль, овечій тифъ, кровавая моча, кровь, далакъ.

петскихъ казней. Венгрия и Бразилія платятъ ей ежегодно страшную дань; одна Франція теряетъ въ пѣкоторые годы отъ этой болѣзни отъ 15 до 20 миллионовъ франковъ. Цѣлые вѣка протекли, и причина этого бича не была опредѣлена. Кромѣ того, такъ какъ эта болѣзнь не всегда является съ одинаковыми симптомами и различается у каждого вида животныхъ, которыхъ она поражаетъ, то были установлены нѣсколько ея видовъ, смотря по той или другой заболѣвшей породѣ. Сибирскую язву лошади считали не одинаковой съ этой же болѣзнию у коровъ, обѣ эти формы различали отъ сибирской язвы овецъ. У овецъ болѣзнь эта носила название селезеночнаго удара, у коровъ она называлась болѣзнию крови, у лошадей карбункулезной лихорадкой, у человѣка, наконецъ, она называлась злокачественнымъ прыщомъ (*pustula maligna*), злокачественнымъ отекомъ...

Только въ 1850 году появились первыя серьезныя данныя относительно природы этой болѣзни, ея сходства и отличія отъ другихъ болѣзней. Съ 1849 до 1852 года комиссія медицинскаго общества Эръ-и-Луары дѣлала большое количество прививокъ и другихъ опытовъ, установившихъ, что сибирская язва овецъ передается отъ одной овцы къ другой, отъ овцы къ лошади, коровѣ и кролику; сибирская язва лошади передается лошади и овцѣ; сибирская язва коровы передается овцѣ, лошади и кролику. Относительно злокачественнаго прыща человѣка не было тоже никакого сомнѣнія, что онъ долженъ имѣть ту же причину, что и сибирская язва животныхъ. И дѣйствительно, кто чаще всего поражается этой болѣзни? Пастухи разнаго рода стадъ, хлѣбоопашцы, прислуга на фермахъ, торговцы кожами, кожевники, промыватели шерсти, живодеры, мясники и всѣ, занимающіеся продуктами скотоводства. При дотрогиваніи къ зараженнымъ предметамъ достаточна самая маленькая ранка, самомалѣйшая ссадина на кожѣ для того, чтобы зараза могла проникнуть. Если иногда заболеваютъ люди, не имѣющіе дѣла съ вышеназванными предметами, то это оттого, что они живуть вблизи зараженныхъ стадъ. Зараза въ этихъ случаяхъ переносится извѣстнаго рода мухами. Если одна изъ этихъ мухъ

насосется крови трупа, павшаго отъ сибирской язвы, и потомъ укусить кого-нибудь, то этимъ сибирская язва привита.

Въ то самое время, когда медицинское общество Эръ-и-Луары дѣлало свои первые опыты, докторъ Райеръ, излагая въ 1850 г. въ бюллетеняхъ парижского біологического общества свои изслѣдованія, сдѣланныя совмѣстно съ Давеномъ по вопросу о контагіи сибирской язвы, говоритъ слѣдующее:

«Въ крови находять маленькия нитевидныя тѣла, длиною въ два красныхъ кровяныхъ шарика. Эти маленькия тѣла не обладаютъ произвольнымъ движениемъ.»

Вотъ, когда еще было сдѣлано первое наблюденіе относительно присутствія маленькаго паразитнаго тѣла при сибирской язвѣ. Удивительная вещь! никто не обратилъ никакого вниманія на эти маленькия нитевидныя тѣла въ крови труповъ, павшихъ отъ этой болѣзни. Райеръ и Давенъ тоже не занимались больше ими. Такъ прошло тринадцать лѣтъ. Прошло бы, можетъ быть, еще больше времени, если-бы Пастеръ своимъ каждымъ новымъ изслѣдованіемъ не дѣлалъ бы очевидной необходимости принять паразитарную теорію заразительныхъ болѣзней. Съ 1857 до 1860 года Пастеръ показалъ, какъ это было выше разсказано, что молочное броженіе, какъ и спиртовое, вызывается живымъ ферментомъ; въ 1861 году онъ открылъ, что ферментъ масляно-кислого броженія состоитъ изъ маленькихъ подвижныхъ нитей, имѣющихъ одинаковые размѣры съ нитями, открытыми Райеромъ и Давеномъ въ крови сибиреязвенныхъ животныхъ; въ 1862 году онъ заявилъ, что не бываетъ амміачного разложенія мочи безъ присутствія микроскопического организма; въ 1863 г. онъ установилъ, что тѣло здороваго животнаго защищено отъ проникновенія зародышей микроскопическихъ организмовъ, что кровь здороваго животнаго, взятая съ необходимыми предосторожностями изъ вены или артеріи, а также моча, взятая изъ пузыря, могутъ быть оставлены въ соприкосновеніи съ чистымъ воздухомъ безъ того, чтобы въ этихъ жидкостяхъ появилось гніеніе, и безъ того, чтобы тамъ появились какіе-нибудь микроскопические нитевидные организмы, подвижные или неподвижные. Все это были такие

факты, которые въ 1863 году обратили внимание Давеня, какъ онъ самъ сознается, на его собственное наблюдение 1850-го г.

«Пастеръ, — говорилъ Давень въ своемъ сообщеніи Академіи Наукъ, — опубликовалъ недавно замѣчательную работу о масляно-кисломъ ферментѣ, представляющемся въ видѣ маленькихъ цилиндрическихъ палочекъ, обладающихъ всѣми свойствами вибріонъ или бактерій. Нитевидныя тѣла, которыхъ я наблюдалъ въ 1850 г. въ крови овецъ, больныхъ сибирской язвой, имѣютъ громадное сходство съ этими вибріонами. Я приступилъ къ изслѣдованию вопроса, не будутъ ли тѣльца, подобные или аналогичныя тѣмъ, которыхъ производятъ масляное броженіе, при введеніи ихъ въ кровь животнаго, играть тоже роль фермента. Такимъ образомъ объяснилось бы легко то быстрое измѣненіе и зараженіе всей массы крови, происходящее у животнаго, которому, случайно или нарочно для эксперимента, попало въ вены нѣкоторое количество этихъ бактерій, этого, такъ сказать, фермента».

Но два года прошли, однако, прежде, чѣмъ Давень могъ раздобыть себѣ овцу, пораженную сибирской язвой. Только въ 1863 году онъ убѣдился сначала въ постоянномъ присутствіи паразита въ крови овецъ и кроликовъ, умершихъ отъ послѣдовательныхъ прививокъ кровью, взятой послѣ смерти или въ послѣдніе часы жизни больного сибирской язвой животнаго; потомъ онъ констатировалъ, что привитое животное, въ крови котораго еще не видно подъ микроскопомъ паразита, кажется совершенно здоровымъ, и что кровь, привитая при подобныхъ условіяхъ, не заражаетъ сибирской язвой.

«При теперешнемъ состояніи науки — заключилъ Давень — никто не подумаетъ искать причину этой заразы въ сторонѣ отъ этихъ маленькихъ организмовъ. Они — причина видимая, ощущимая; это организованное существо, обладающее жизнью, развивающееся и распространяющееся, подобно всѣмъ другимъ живымъ организмамъ. Вслѣдствіе ихъ присутствія и быстрого размноженія въ крови, они, вѣроятно, производятъ въ ней, подобно ферменту, измѣненія, быстро убивающія зараженный организмъ. Уже давно врачи и натуралисты — прибавилъ еще

Давенъ — полагали теоретически, что заразительные болѣзни, тяжелыя эпидемическія лихорадки, чума и т. под., вызываются невидимыми маленькими животными или ферментами, но я не знаю, было-ли до сихъ поръ хоть одно положительное наблюденіе, въ подтвержденіе этого взгляда.»

Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ опубликованія результатовъ Давена, два профессора пзъ Валь-де-Граса, Жальяръ и Лепла, опровергли предыдущіе выводы. Прививая кроликамъ и собакамъ различныя самопроизвольно разложившіяся жидкости, переполненные вибріонами, имъ не удавалось вызвать этимъ смерти животныхъ. Для положительныхъ результатовъ они должны были вводить въ кровь собакъ и кроликовъ много кубическихъ сантиметровъ очень гнилостной жидкости. И даже въ этомъ случаѣ, представлявшемъ не больше, какъ новое повтореніе старыхъ опытовъ Гаспара и Мажанди касательно дѣйствія гнилостныхъ продуктовъ, имъ не удавалось сдѣлать кровь заразительной.

Давену не стоило труда доказать, что Жальяръ и Лепла произвели свои опыты при совершенно другихъ условіяхъ; что у него, Давена, рѣчь не шла о бактеріяхъ или вибріонахъ какого-бы то ни было гниющаго настоя, но о бактеріяхъ, найденныхъ имъ въ крови овецъ, павшихъ отъ селезеночнаго удара (сибирской язвы).*

Жальяръ и Лепла отвѣтили на это совершенно новыми и неожиданными опытами. Они привили кроликамъ, какъ это желалъ Давенъ, кровь коровы, павшей близъ Шартра отъ сибирской язвы (*maladie de sang*). Кролики умирали быстро, но въ крови у нихъ не найдено никакихъ слѣдовъ бактерій, ни при жизни, ни послѣ смерти. Новая серія кроликовъ, зараженная кровью первыхъ, также умирала, но и у нихъ не найдено никакихъ паразитовъ въ крови. Жальяръ и Лепла послали Давену нѣсколько капель этой крови. Давенъ, обсуждая опыты своихъ противниковъ и подтверждая точность ихъ наблюдений, заключилъ, что эти два профессора употребляли кровь не настоящей сибирской язвы, а совершенно новой, неизвѣстной болѣзни, которую Давенъ предложилъ назвать *болѣзнью коровы*.

«Кровь, употребленная нами для опытовъ, — отвѣтили на это Жальяръ и Лепла, — была намъ доставлена директоромъ скотобойни изъ Сура близъ Шартра, а этотъ директоръ несомнѣнно компетентенъ въ распознаваніи сибирской язвы.»

Вполнѣ искренно убѣжденные Жальяръ и Лепла начали съизнова рядъ опытовъ, пользуясь на этотъ разъ кровью овцы, павшей отъ сибирской язвы, и присланной имъ очень опытнымъ ветеринаромъ города Шартръ, Буте (Boutet). Результаты получались у нихъ такіе-же, какъ и съ кровью вышеупомянутой коровы. Несмотря на возраженія Давена, не прибавившаго, впрочемъ, ничего къ фактамъ, уже прежде известнымъ, было довольно трудно разобраться въ этихъ дебатахъ, и не предубѣжденнымъ умамъ казалось, что Жальяръ и Лепла, продѣлавшіе точные опыты, подтверждаемые самимъ Давеномъ, наносили этимъ сильный ударъ мнѣнію Давена, и что, во всякомъ случаѣ, въ этомъ дѣлѣ требовалось еще новыхъ экспериментальныхъ дацныхъ.

Въ 1876 году нѣмецкій врачъ, докторъ Кохъ, занялся этимъ вопросомъ. Онъ подтвердилъ мнѣніе Давена, но ни на юту не выяснилъ вопроса и не убѣдилъ никого, потому что онъ ничѣмъ не разъяснилъ наблюдений Жальяра и Лепла, которыхъ онъ даже не удостоилъ упомянуть. Какъ разъ въ это время, когда въ Германіи появилась работа Коха, знаменитый физіологъ Поль Беръ старался, напротивъ, подтвердить мнѣніе Жальяра и Лепла.

«Я могу убить — сказалъ Поль Беръ — всѣ бактеридіи въ каплѣ крови сжатымъ кислородомъ, привить ее потомъ и произвести этимъ болѣзнь и смерть животнаго безъ появленія бактеридій въ крови. Слѣдовательно, бактеридіи не составляютъ ни причины, ни необходимаго слѣдствія сибирязвенной болѣзни. Здѣсь, очевидно, дѣло идетъ объ ядѣ, объ отравленіи.»

Это было также и мнѣніе Жальяра и Лепла. Пастеръ, признавая необходимымъ выяснить, на чьей сторонѣ правда, и, кромѣ того, страстно желая добиться болѣе рѣшительныхъ фактовъ, которые разъяснили-бы причины этой страшной болѣзни, рѣшился въ свою очередь заняться этимъ вопросомъ.

Докторъ Кохъ заявилъ въ своей работе, что маленькая нитевидная тѣла, указанныя впервые Давеномъ въ 1850 году, воспроизводятся двоякимъ образомъ: посредствомъ дѣленія, какъ наблюдалъ еще Давенъ, и еще другимъ способомъ — посредствомъ блестящихъ тѣлъ, т. е. споръ. Существование этого послѣдняго способа воспроизведенія было открыто Пастеромъ уже въ 1865 году, подтверждено вновь въ 1870 году и срисовано, какъ свойственное нитямъ фермента масляно-кислого броженія и всѣмъ ферментамъ гниенія. Неужели Кохъ не зналъ этого важнаго факта? Или, можетъ быть, онъ предпочелъ, умолчавши о немъ, сохранить за собою право кажущагося первенства?

Чтобы разрѣшить первую неясность, представившуюся его уму, чтобы решить вопросъ, должно-ли считать причиной сибирской язвы твердое тѣло или жидкость, связанную или не связанную съ нитями, открытыми Давеномъ, или че зависитъ-ли болѣзнь исключительно отъ присутствія и жизни этихъ нитей, — Пастеръ прибѣгнулъ къ методу, служившему ему руководителемъ въ теченіе 20 лѣтъ при изученіи микробовъ-ферментовъ. Этотъ методъ, хотя и очень деликатенъ, однако чрезвычайно простъ. Желалъ-ли онъ, напримѣръ, доказать, что микробъ-ферментъ масляно-кислого броженія составляетъ существенную причину этого разложенія, то для этого онъ приготовлялъ искусственную жидкость изъ фосфатовъ калія, магнезіи и сѣрно-кислого аммонія, прибавляя къ раствору вещество, способное бродить, и въ этой жидкости давалъ развиваться микробу-ферменту, посѣянному въ состояніи чистой культуры. Микробъ размножался и вызывалъ броженіе. Изъ этой жидкости можно пересадить ферментъ въ другую, изъ другой въ третью, составленную такимъ же образомъ и также способную бродить и т. д. Масляно-кислое броженіе послѣдовательно обнаруживается во всѣхъ посѣвахъ. Начиная съ 1857 года этотъ методъ былъ преобладающимъ въ его многочисленныхъ изслѣдованіяхъ. И въ данномъ частномъ случаѣ, съ сибирской язвой, Пастеръ памѣревался изолировать этого микрода изъ сибиризированной крови, культивировать его въ чистомъ видѣ въ искусственныхъ жидкостяхъ, и тогда приступить къ изученію его дѣйствія на животныхъ. Но такъ

какъ въ 1868 году, послѣ гемиплегического удара, Пастеръ пересталъ владѣть лѣвой рукой, то онъ принужденъ былъ, въ виду невозможности приступить самому къ продолжительнымъ серіямъ опытовъ, думать о пріисканіи себѣ преданнаго сотрудника. Онъ нашелъ его въ лицѣ бывшаго воспитанника Нормальной Школы, Жубера, нынѣ профессора физики въ коллежѣ Роленъ. Если Жуберь и подвергался опасности при этихъ опытахъ съ сибирской язвой, зато Пастеръ всегда присоединялъ его имя въ отчетахъ Академіи Наукъ къ чести изслѣдований и къ торжеству открытій.

30 апрѣля 1874 года Пастеръ читалъ въ Академіи Наукъ отъ своего имени и отъ имени своего сотрудника сообщеніе, въ которомъ было доказано неопровергимымъ образомъ, что бациллъ, котораго называли то бактеріей, то бактеридіей, то ниткой, то палочкой, — однимъ словомъ бациллъ, открытый Давеномъ и Райеромъ въ 1850 году, былъ дѣйствительно единственной причиной, единственнымъ производителемъ сибирской язвы.

Посѣянная въ мочѣ или въ водѣ пивныхъ дрожжей, предварительно стерилизованныхъ, то есть приготовленныхъ такимъ образомъ, что въ этихъ жидкостяхъ, при доступѣ чистаго воздуха безъ зародышей, не появляется гніенія, — посѣянная въ такой жидкости капля крови сибиреязвенного животнаго рождаетъ въ нѣсколько часовъ мириады бациллъ или бактеридій. Маленькая капля изъ этой первой культуры, посѣянная во вторую колбочку, содержащую такую же жидкость, какъ и въ первой, и приготовленную съ тѣми же предосторожностями относительно стерилизации и чистоты, оказывается не менѣе плодородной. Наконецъ, послѣ десяти, двадцати подобныхъ пересадокъ, культуры, — паразитъ, очевидно, освобожденъ отъ элементовъ, которые могли содержаться въ первоначальной каплѣ крови. Однако, если впрыснуть очень незначительное количество изъ послѣдней культуры подъ кожу кролику или овцѣ, то это ихъ убиваетъ въ два или самое большое, въ три дня со всѣми клиническими признаками натуральной сибирской язвы.

Можно было бы еще предположить, что этотъ паразитъ связанъ съ какимъ-нибудь растворимымъ ядомъ, произведеннымъ

имъ же въ культурной жидкости во время его жизни. Пастеръ понесъ свои культуры въ погребъ обсерваторіи, тѣмъ была совершенно постоянная температура; это обстоятельство дало возможность совершенно осѣсть на дно сосудовъ всѣмъ питамъ паразита. Однако, дѣлая потомъ сравнительные прививки прозрачной верхней жидкостью и осадкомъ со дна сосуда, онъ убѣдился, что только послѣдній вызываетъ болѣзнь и смерть. Слѣдовательно, только бактеридіи составляютъ причину сибирской язвы. Доказательство дано и оно теперь неоспоримо.

I.

Да, сибирская язва оказывается болѣзнью, производимою бактеридіями, подобно тому какъ чесотка производится чесоточнымъ клещемъ, какъ трихинозъ производится трихирами. Единственное различие заключается въ томъ, что паразитъ сибирской язвы виденъ только при помощи микроскопа съ довольно большимъ увеличеніемъ. Это, значитъ, первый примѣръ заразной болѣзни, причиненою микроскопическимъ существомъ. Эту страшную заразу Пастеръ уловилъ и изолировалъ. Въ этомъ микроскопическомъ паразитѣ, и въ немъ одномъ, лежитъ причина заразности сибирской язвы. Научный фактъ громадной важности былъ установленъ: зараза не можетъ состоять изъ аморфной матеріи, а изъ микроскопического живаго существа. Заразительность зависитъ отъ жизни яда.

Либихъ и всѣ химики и врачи, принимавши и поддержавши его теорію, совершенно отрицали дѣйствіе живой силы при всѣхъ броженіяхъ, какъ и при всѣхъ заразительныхъ и инфекціонныхъ болѣзняхъ. Находясь подъ влияниемъ своей гипотезы, они были введены въ заблужденіе ошибочнымъ сравненіемъ явленіями чисто химическаго порядка, казавшимися имъ сходными съ явленіями броженія и заразности.

«Прикосновеніемъ заразы спилиса — писалъ Либихъ — кровь подвергается такого рода измѣненію, вслѣдствіе котораго ея элементы опять производить эту заразу. Этотъ метаморфозъ не прекращается до тѣхъ поръ, пока не произойдетъ полнаго превращенія всѣхъ шариковъ крови, способныхъ къ разложенію.»

Эта шаткая теорія должна была рухнуть, подъ вліяніемъ многочисленныхъ опытовъ Пастера. Но въ ожиданіи другихъ открытій, которые доказали-бы неопровержимо, что всякая заразная болѣзнь зависитъ отъ микроскопического паразита, необходимо было разъяснить опыты, фактически вѣрные, заявленные Жальяромъ и Лепла, и привести ихъ въ согласіе съ не менѣе вѣрными данными, указанными Давеномъ. Кролики, которымъ Жальяръ и Лепла прививали каплю крови, взятой отъ коровы или овцы, умершихъ отъ сибирской язвы, умирали быстро и кровь этихъ кроликовъ была опять заразительна. Достаточно было привить безконечно малое количество этой крови другому кролику, чтобы этотъ тоже умиралъ. И, однако, изслѣдованіе этой крови, утверждаютъ Жальяръ и Лепла, не обнаруживало присутствія какого-либо микроскопического существа. Полю-Беру, съ своей стороны, удалось убить бактерії сжатымъ кислородомъ, и все-таки заразительность крови сохранилась.

Не существуетъ ли двоякаго рода заразы? Какъ выйти изъ этой темной области? Дѣло прояснилось вдругъ.

Пастеръ доказалъ уже нѣсколько лѣтъ до того, что тѣло животныхъ защищено отъ вступленія зародышей низшихъ организмовъ. Въ крови, въ мочѣ, въ мускулахъ, печени, селезенкѣ, почкахъ, въ головномъ и спинномъ мозгу и въ нервахъ не находятъ въ здоровомъ состояніи ни зародышей, ни какихъ бы то ни было известныхъ или неизвестныхъ частицъ, которыя въ состояніи были-бы превратиться въ бактеріи, вибріоны, монады или въ какіе-нибудь микробы. Только кишечный каналъ переполненъ продуктами, связанными съ массой зародышей и другими живыми образованіями на пути къ развитію и различнымъ физіологическимъ дѣйствіямъ. Кромѣ того, что температура кишечника благопріятна развитію и жизни микроскопическихъ организмовъ, онъ получаетъ еще безпрестанно материалы, переполненные зародышами этихъ организмовъ. Въ верхній отдѣль имѣетъ еще доступъ наружный воздухъ, такъ что до желудка доходятъ еще аэробные микробы, но въ глубокихъ частяхъ кишечного канала кислорода уже нѣть и тамъ могутъ развиваться только анаэробные. Если жизнь кишечныхъ стѣнокъ

противустоитъ прониканію черезъ нихъ живыхъ зародышей во внутренніе органы, то обстоятельства измѣняются послѣ смерти животнаго. Тогда уже неѣтъ никакого препятствія, которое мѣшало бы этимъ микробамъ проникать во внутренніе органы, и они начинаютъ дѣйствовать, слѣдя закону своего развитія и проявляя свойственное имъ разлагающее вліяніе. И въ самомъ дѣлѣ, анаэробами начинается актъ гніенія труповъ. Они проникаютъ въ органы и въ кровь, какъ только кровь лишается своего кислорода — что происходит довольно скоро, такъ какъ кислородъ красныхъ кровяныхъ шариковъ всасывается скоро различными процессами тлѣнія. Въ сибираязвенныхъ трупахъ гніеніе происходитъ еще быстрѣе, потому что кровь уже лишена въ моментъ смерти большей части своего кислорода вслѣдствіе болѣзни, и потому что кишечникъ самъ боленъ и покрытъ кровоподтеками, а иногда и большими кровоизліяніями. Неѣтъ ничего поразительнѣе того быстраго вздуванія и загниванія, почти немедленно слѣдующаго за смертью животныхъ, павшихъ отъ сибирской язвы. Изъ всѣхъ вибріоновъ, готовыхъ пройти изъ кишечнаго канала въ кровеносную сѣть брыжеечныхъ венъ, окружающихъ его, одинъ, кажется, беретъ перевѣсь, это именно — септическій вибріонъ. Другіе разсѣваются въ крови болѣе или менѣе медленно, — эти вибріоны могутъ быть названы вибріонами гніенія, по причинѣ производимаго ими выдѣленія очень зловонныхъ газовъ, при разложеніи азотистыхъ и сѣрныхъ органическихъ продуктовъ. Но септическій вибріонъ овладѣваетъ почти непосредственно трупомъ. Уже послѣ 12 или 15 часовъ кровь животнаго, умершаго отъ сибирской язвы и бывшая передъ смертью и неѣсколько ближайшихъ часовъ послѣ смерти исключительно наполненной только сибираязвеннымъ ядомъ, безъ примѣси какого-нибудь другаго паразита, дѣлается мѣстопребываніемъ одновременно и бацилла сибирской язвы, и септическаго вибріона. Тогда наступаютъ слѣдующія интересныя явленія, зависящія отъ противуположныхъ свойствъ этихъ двухъ микробовъ — септическаго вибріона анаэробнаго и сибираязвенной палочки аэробной. Находясь въ крови, лишенной кислорода, сибираязвенная палочка не можетъ здѣсь жить и быстро погибаетъ.

Мало-по-малу на ея мѣстѣ находятъ аморфныя зерна, не обладающія никакой заразительностью. Анаэробный септическій вибріонъ, напротивъ того, находить себѣ послѣ смерти животнаго самыя лучшія условія для жизни и размноженія. Онъ не только проникаетъ изъ глубокихъ венъ сальника во всю массу крови, но и во всѣ жидкости, просачивающіяся въ полость живота и въ мышцы. Изъ этого антагонизма, существующаго между физиологическими особенностями сибириязвенной палочки и септическаго вибріона, вытекаетъ то, что если берутъ каплю крови павшаго отъ сибирской язвы животнаго для привитія ея другому животному, подверженному этой болѣзни, то только тогда можно быть увѣреннымъ, что мы привьемъ ей сибирскую язву и ничего другаго, если мы беремъ эту кровь въ первые часы послѣ смерти. Напротивъ, чѣмъ больше времени протекло послѣ смерти (12—24 часовъ, смотря по времени года), тѣмъ болѣе вѣроятно, что привитіе этой крови дастъ смѣшанное заболѣваніе: сибирской язвой и гнилокровіемъ, — эту послѣднюю болѣзнь можно назвать острымъ гнилокровіемъ, потому что септическій вибріонъ производить быстро воспалительныя явленія въ тѣлѣ животнаго. Обѣ болѣзни могутъ одновременно появиться у зараженнаго животнаго; но чаще всего одно заболѣваніе предшествуетъ другому. Септическая зараза дѣйствуетъ очень быстро; обыкновенно она убиваетъ животное прежде, чѣмъ сибириязвенная палочка успѣваетъ развиться и произвести характерные ей симптомы.

Такимъ образомъ, возможно теперь объяснить всѣ противурѣчивыя данныя, полученные Жальяромъ и Лепла, съ одной стороны, и Давеномъ, съ другой. Что сдѣляли Жальяръ и Лепла, желая провѣрить работу Давена? Они попросили прислать имъ немнога крови изъ мѣстности, где часто бываетъ сибирская язва, изъ департамента Эръ-и-Луары. Посмотримъ, однако, что дѣлается на фермѣ, когда падаетъ животное отъ сибирской язвы. Трупъ кладутъ на навозъ, или подъ навѣсъ, или въ конюшню, пока не прѣдѣтъ повозка живодера, убирающаго трупы. Все это отнимаетъ время, и трупъ остается здѣсь въ теченіе 24 или 48 часовъ. Кровь, взятая отъ такого трупа,

подверглась уже болѣе или менѣе гніенію и вибріоны примѣшались къ сибираязвенной палочкѣ, которая перестаетъ развиваться, съ момента смерти животнаго. Однимъ словомъ, легко понять, что если экспериментаторъ пишетъ въ Шартръ, чтобы ему выслали сибираязвенную кровь, то онъ рискуетъ, безъ всякаго умысла съ своей стороны и со стороны отправителя, получить кровь, въ которой находятся обѣ заразы: сибираязвенная и септическая. И эта сиптицемія можетъ еще быть разнообразна, потому что можно думать, что каждый родъ гнилостнаго вибріона производитъ особую септическую болѣзнь.

Таковы были обстоятельства, которыя сопровождали опыты Жальяра и Лепла надъ сибирской язвой и въ которыхъ они себѣ не дали ни малѣйшаго отчета. Впрочемъ, уже при чтеніи ихъ послѣдовательныхъ сообщеній Академіи Наукъ, получается такое впечатлѣніе: кровь коровы, павшей отъ сибирской язвы, присланная изъ живодериаго заведенія изъ Сура, и кровь сибираязвенной овцы, присланная Бутетомъ, должно быть, были взяты отъ труповъ животныхъ, умершихъ много времени предъ тѣмъ, такъ что ихъ кровь имѣла въ себѣ одновременно — и сибираязвенную, и септическую заразы. Сиптицемія, чрезвычайно быстро убивающая, была причиной смерти кроликовъ Жальяра и Лепла. Такъ какъ изслѣдованіе крови этихъ кроликовъ не показало имъ ни малѣйшихъ слѣдовъ сибираязвенной бактеридіи, то они заключили, съ кажущейся правильностью, что прививаніе сибираязвенной крови можетъ убить животное, безъ появленія бактеридій въ его крови, хотя ихъ было много въ привитой крови. Присутствіе септическаго вибріона въ привитой крови ускользнуло отъ ихъ вниманія. Когда Давенъ возразилъ, что Жальяръ и Лепла имѣли дѣло съ нечистой сибирской язвой, онъ былъ вполнѣ правъ, но онъ не могъ объяснить причины ихъ ошибки. Они другъ друга опровергали помощью опытовъ, въ которыхъ истина и ошибка были тѣсно переплетены.

Работа Ноля-Бера, появившаяся въ концѣ 1876 г., была окружена не менѣе сложными обстоятельствами. Чтобы понять ихъ, необходимо вспомнить открытіе Пастера относительно спосѣба развитія анаэробныхъ вибріоновъ гніенія. Эти вибріоны

воспроизводятся тѣльцами-зародышами, т. е. спорами, — это своего рода яйцеродные. Вибріонъ острой септицеміи обладаетъ такимъ способомъ воспроизведенія. Короткія или длинныя пiti усеяны блестящими точками, которыхъ и составляютъ именно эти зародыши, о которыхъ мы говоримъ. Опытъ показываетъ, что эти тѣльца-зародыши противостоятъ очень хорошо дѣйствію сгущенаго кислорода. При прививкѣ крови, имѣвшей одновременно обѣ заразы, сибиреязвенную и септическую, послѣ того какъ ее подвергли дѣйствію сгущенаго кислорода, споры септической заразы, оставшіяся живыми, убивали животное, безъ того чтобы можно было видѣть въ ихъ крови бактеридіи или нити. Поль-Берь также получилъ эту кровь изъ Шартра. Кровь, полученная имъ, была, безъ всякаго сомнѣнія, не только сибиреязвенной, но уже и септической. Нити сибирской язвы и нити септицеміи погибли, при дѣйствіи сжатаго кислорода, но тѣльца-зародыши остались и значительное давленіе сжатаго кислорода ни-чуть не подѣйствовало на нихъ. Новая возродившаяся зараза, отъ которой пали привитыя животныя, произошла отъ этихъ тѣлецъ, споръ.

Чтобы доказать, что заразность крови сибиреязвенныхъ труповъ въ вышеупомянутыхъ случаяхъ происходитъ отъ септическаго вибріона, Пастерь вмѣстѣ съ Жуберомъ и съ новымъ помощникомъ — Шамберланомъ воспользовались методомъ, которымъ они прежде пользовались для изолированія бактеридіи сибирской язвы, т. е. методомъ послѣдовательныхъ культуръ въ искусственныхъ средахъ. Однако культуры септическаго вибріона требовали особыхъ условій и предосторожностей. Онѣ должны были производиться въ совершенно пустомъ пространствѣ или въ соприкосновеніи съ углекислотой, вѣроятно всіяко го присутствія воздуха. Посѣянныя въ соприкосновеніи съ воздухомъ эти культуры септическаго вибріона оставались безплодными, потому что этотъ микробъ — исключительно анаэробъ. Воздухъ его убиваетъ. Если какое-нибудь тѣльце-зародышъ этого организма и разовьется въ присутствіи воздуха, то продуктъ этого произростанія вскорѣ останавливается въ своемъ развитіи и погибаетъ отъ дѣйствія кислорода. Это свойство совершенно противуположно тому, что происходитъ съ сибиреязвенной па-

лочкой. Въ пустотѣ или въ атмосферѣ угольной кислоты культуры этой палочки остаются бесплодными. Если одно изъ тѣлещъ-зародышей сибириязвенной палочки (такъ какъ эта палочка имѣеть также споры) проростаетъ въ пустотѣ, то продуктъ проростанія, лишенный кислорода, скоро погибаетъ. И, кстати, отмѣтимъ одинъ чрезвычайно замѣчательный опытъ, сдѣланный Пастеромъ; онъ воспользовался этимъ самимъ свойствомъ, какъ средствомъ для отдѣленія соотвѣтственной культивировкой палочки сибирской язвы отъ септическаго вибріона, если они были временно соединены вмѣстѣ. Когда онъ культивировалъ, въ соприкосновеніи съ воздухомъ, эту смѣсь двухъ болѣзнетворныхъ организмовъ, развивалась только сибириязвенная палочка. Если же онъ эту самую смѣсь культивировалъ въ воздухѣ, въ пустомъ пространствѣ или въ атмосферѣ угольной кислоты, то развивался только септическій вибріонъ. Этотъ способъ культивировки есть одно изъ лучшихъ средствъ для доказательства, что кровь, взятая изъ сибириязвенного трупа вскорѣ послѣ смерти, обладаетъ только однимъ вирусомъ, — сибириязвеннымъ, а кровь, взятая черезъ 24 часа послѣ смерти, имѣеть два вируса, — сибириязвенный и септическій.

Въ 1883 году поднялся очень живой споръ по поводу этихъ фактовъ о сибирской язвѣ и септицеміи между Пастеромъ, съ одной стороны, и комиссіей, состоявшей изъ большинства профессоровъ ветеринарной школы въ Туринѣ, съ другой стороны. Въ этой школѣ былъ сдѣланъ одинъ опытъ, исходъ кото-раго крайне интересовалъ Пастера. Вмѣсто того, чтобы употребить чистую сибириязвенную кровь, безъ всякаго другаго ви-руса, итальянскіе профессора, вслѣдствіе незнанія опытовъ Пастера, или вслѣдствіе недосмотра, употребляли для своихъ опытовъ кровь сибириязвенной овцы, умершей, по ихъ собствен-ному заявлению, больше 24-хъ часовъ до того. Пастеръ напи-салъ имъ сейчасъ-же, что комиссія сдѣлала большую ошибку, употребивши такую кровь, которая должна была быть одновременно и сибириязвенной и септической. Туринцы разобидѣлись. Они утверждали, что увѣреніе Пастера не точно, что кровь овцы была очень внимательно изслѣдована и что въ ней не находили

ничего, кроме паразита сибирской язвы; с другой стороны, прибавили они съ иронией, крайне удивительно, что Пастеръ сидя въ своей лабораторіи въ Парижѣ можетъ увѣрять, что эта кровь была смѣшана съ септической заразой, въ то время какъ они, хорошие наблюдатели, вооруженные микроскопомъ, имѣли эту кровь овцы предъ своими глазами. Пастеръ отвѣтилъ только, что его утвержденіе основывается на такомъ вѣрномъ принципѣ, что онъ можетъ увѣрять, даже не видѣвши этой крови, что при тѣхъ условіяхъ, при которыхъ она была взята, эта кровь была септической. Съ одной и съ другой стороны обмѣнялись публичными заявленіями, но этимъ они другъ друга не убѣдили. Тогда Пастеръ предложилъ лично поѣхать въ Туринъ, чтобы доказать имъ на какомъ угодно числѣ сибиreichзовенныхъ труповъ овецъ, которыхъ они ему предложатъ, что кровь каждого трупа, — черезъ 24 часа въ мартѣ мѣсяцѣ и черезъ 12 или 15 часовъ въ юнѣ, — будетъ одновременно и сибиreichзенной, и септической. Пастеръ предполагалъ извлечь изъ такой крови по произволу, помошью соотвѣтственной культивировки, сибиreichзовенную заразу, или чистую септическую заразу, или обѣ заразы вмѣстѣ, по выбору итальянцевъ Но итальянцы уклонились отъ предложения Пастера прїѣхать къ нимъ, чтобы убѣдить ихъ, что они ошиблись.

Ясность и вразумительность положеній Пастера поразительны; но что еще больше усиливаетъ его авторитетъ, такъ это то, что смѣлость Пастера, какъ выразился однажды Поль-Беръ, въ его утвержденіяхъ можно сравнить только съ его осторожностью въ такихъ случаяхъ, которые не основаны на сдѣланныхъ опытахъ. Никогда онъ не вступаетъ на почву, не изученную имъ точно; но, вступивъ туда, онъ вносить рѣшительность, а иногда даже такую горячность, что можно сказать вся кому изъ его противниковъ, чтобы онъ ни былъ: «я очень сожалѣю, что вы попали въ такія грозныя руки.»

«Берегитесь, сказалъ вскорѣ послѣ туринскаго инцидента одинъ изъ членовъ Академіи Наукъ одному изъ членовъ медицинской Академіи, задавшемуся цѣлью «придушить» научно Пастера, — будьте осторожны, Пастеръ никогда не ошибался!»

Однажды, въ 1879 году, профессоръ одного провинціального медицинскаго факультета сообщилъ Академіи Наукъ, что онъ нашелъ въ крови одной женщины, страдавшей послѣродовой горячкой больше двухъ недѣль и умершой въ госпиталѣ, громадное количество неподвижныхъ нитей, простыхъ и членистыхъ, прозрачныхъ, прямыхъ и изогнутыхъ, принадлежащихъ къ роду лептотрика (нитевидной бактеріи). Занятый изслѣдованиемъ послѣродовой горячки и не встрѣтивши при этой болѣзни ничего подобнаго, Пастеръ написалъ сейчасъ этому профессору и просилъ его прислать ему пробу этой заразной крови. Кровь была получена въ лабораторіи Пастера и черезъ нѣсколько дней онъ отвѣтилъ профессору: «Вашъ лептотриксъ есть ничто иное, какъ сибириязвенная бактеридія».

Этотъ отвѣтъ привелъ врача въ недоумѣніе. Онъ написалъ Пастеру, что, не оспаривая его утвержденія, онъ хочетъ только провѣрить его, и если онъ лично убѣдится въ своей ошибкѣ, то публично признаетъ это.

Пастеръ предложилъ послать ему нѣсколько морскихъ свинокъ, зараженныхъ сибирской язвой, и писалъ ему: «Вы ихъ получите еще живыми; онѣ умрутъ у васъ на глазахъ, вы вскроете ихъ и вы сами найдете въ нихъ свой лептотриксъ». Врачъ согласился. Тогда Пастеръ привилъ трехъ морскихъ свинокъ, положилъ ихъ въ клѣтку и послалъ ихъ по желѣзной дорогѣ по адресу профессора. На слѣдующій день онѣ прибыли и еще черезъ 24 часа онѣ пали на глазахъ у профессора. Первая свинка была заражена кровью умершой вышеупомянутой женщины, другая—бактеридіей сибириязвенной крови изъ Шартра, а третья — сибириязвенной кровью коровы изъ Юры. При вскрытии невозможно было найти ни малѣйшей разницы въ крови всѣхъ трехъ свинокъ. Не только кровь, но и внутренніе органы, и въ особенности селезенка, были измѣнены у всѣхъ одинаково.

Тогда этотъ врачъ съ рѣдкимъ прымодушіемъ поспѣшилъ сообщить Академіи Наукъ этотъ фактъ и сказалъ, что онъ вдвойше жалѣеть, что не былъ знакомъ съ сибирской язвой годъ тому назадъ, потому что тогда онъ могъ бы, съ одной стороны, узнать это страшное осложненіе, отъ котораго умерла

женщина 4 апреля 1878 года, и, съ другой стороны, онъ могъ бы найти источникъ, изъ котораго она заразилась, — теперь же это невозможно. Однако, пѣкоторыя свѣдѣнія онъ и теперь получилъ объ этой несчастной женщинѣ. Это была работница, проживавшая въ маленькой комнатѣ, которая соприкасалась съ конюшней, принадлежавшей лошадиному барышнику. Въ этой конюшнѣ перебывало много животныхъ.

Вернемся, однако, къ нашему септическому виброну. Если воздухъ разрушаетъ его, если онъ не можетъ развиваться въ соприкосновеніи съ воздухомъ, какъ же можетъ существовать септицемія, разъ воздухъ находится повсюду? Какимъ образомъ кровь, лежащая на открытомъ воздухѣ, можетъ стать септической, гнилостной отъ пыли, находящейся на поверхности сосуда или падающей изъ воздуха? Гдѣ же могутъ образоваться эти септическіе зародыши? Вопросы кажутся трудными, но они разрѣшаются очень простымъ опытомъ.

Если брать серозную жидкость изъ полости живота морской свинки, павшей отъ острого гнилокровія, то находить ее переполненной септическими вибронами, размножающимися посредствомъ дѣленія; если потомъ оставить эту жидкость въ соприкосновеніи съ воздухомъ, взявши слой жидкости достаточной высоты, въ сантиметръ напр., то черезъ нѣсколько часовъ мы присутствуемъ при очень интересномъ зрѣлищѣ, если мы будемъ слѣдить за всѣмъ этимъ помощью микроскопа. Въ верхній слой уже проникъ кислородъ воздуха, что видно по измѣненію цвѣта жидкости. Здѣсь нитевидный вибронъ погибъ и распался на аморфныя мелкія зернышки, лишенныя заразительности. Напротивъ, на днѣ этого слоя, толщиною въ сантиметръ, виброны, будучи защищены отъ прикосновенія воздуха верхними, уже погибшими вибронами, продолжаютъ размножаться посредствомъ дѣленія; потомъ мало-по-малу они переходятъ въ состояніе тѣлець-зародышей, т. е. споръ, такъ что на мѣсто движущихся нитей различной длины, скользящихъ чрезъ поле зреенія микроскопа, видна только пыль изъ блестящихъ изолированныхъ точекъ, на которыхъ кислородъ воздуха не имѣть никакого вліянія. Вотъ

какимъ образомъ можетъ образоваться и при соприкосновеніи съ воздухомъ пыль септическихъ зародышей. Такимъ образомъ дѣлается понятнымъ, какъ засѣваются и разростаются апаэробные существа въ гніюющихъ жидкостяхъ изъ пыли, носящейся въ воздухѣ. Такимъ-же образомъ можно себѣ объяснить постоянство гнилостныхъ болѣзней—даже такихъ, которыя происходятъ отъ анаэробныхъ микробовъ, которымъ воздухъ мѣшаетъ жить, но которымъ онъ не вредитъ, какъ только они превращаются въ споры.

Благодаря такимъ неожиданнымъ и такимъ убѣдительнымъ опытаамъ, Пастеръ доказалъ, что Жальяръ и Лепла ни-чуть не прививали своимъ кроликамъ какого-нибудь аморфнаго яда, твердаго или жидкаго, а прививали вирусъ (заразу), состоящій изъ живыхъ микроскопическихъ существъ, изъ настоящаго фермента. Кромѣ сибиреязвенного паразита открыть новый образецъ одушевленной живой заразы, въ видѣ зародышей, образующихъ пыль; и фактъ необычайный: между микробами, которые вызываютъ болѣзни, проникая въ организмъ животнаго и размножаясь въ немъ, есть аэробные, какъ сибиреязвенная бацилла, и анаэробные, какъ вибріонъ острой септицеміи.

II.

Для этихъ двухъ крайне заразительныхъ болѣзней, сибирской язвы и гнилокровія, изслѣдованія Пастера ясно установили теорію паразитизма. Великая и новая дорога открылась для будущихъ изслѣдованій о причинахъ болѣзней. Однако, вслѣдствіе рѣзкой разницы, отдѣляющей сибирскую язву отъ септицеміи, дѣлается понятнымъ, что если, продолжая прежнія и новѣйшія открытія, будущему предстоитъ еще узнать, безъ сомнѣнія, новые микробы болѣзней, то специфическія особенности этихъ микроскопическихъ существъ потребуютъ при каждомъ новомъ изслѣдованіи безпрестанныхъ и новыхъ усилий, чтобы, во первыхъ, сдѣлать эти микробы очевидными, а во вторыхъ, чтобы привести рѣшительныя доказательства ихъ болѣзнетворной дѣятельности. Но прежде всего долженъ быть рѣшенъ вопросъ о несамозарожденіи этихъ заразительныхъ микробовъ. Тотъ, кто говоритъ,

что данная болезнь паразитарная, думаетъ этимъ самыиъ, что болезнь появилась самопроизвольно. Однако, при теперешнемъ состояніи нашихъ знаній, нельзя допустить самопроизвольныхъ болѣзней, также какъ и самопроизвольного зарожденія. Такіе афоризмы не могутъ не вызвать, отъ времени до времени, возраженій и чѣмъ рѣже они высказываются, тѣмъ эти возраженія рѣзче. На международномъ конгрессѣ въ Лондонѣ, въ августѣ 1881 года, докторъ Бастіанъ, врачъ одного изъ главныхъ госпиталей Лондона, заявилъ, что если онъ не можетъ отрицать существование микробныхъ болѣзней, то все-таки, по его мнѣнію, микробы суть слѣдствія болѣзней, а не ихъ причины.

«Возможно-ли, воскликнулъ Пастеръ, присутствовавшій на этомъ засѣданіи,— чтобы въ наше время могла быть высказана такая научная ересь! Мой отвѣтъ доктору Бастіану будетъ короткій. Возьмите конечность какого-нибудь животнаго, раздробите ее, дайте излиться въ эту конечность вокругъ этихъ раздробленныхъ костей столько крови и разныхъ другихъ нормальныхъ и не-нормальныхъ жидкостей, сколько вамъ—будетъ угодно. Смотрите только, чтобы кожа этой конечности не была разорвана и открыта, и я увѣряю васъ, что ни на слѣдующій день, ни за все время, пока болѣзнь будетъ продолжаться, не появится ни малѣйшаго микроскопического организма въ жидкостяхъ этой конечности».

По примѣру Либиха, въ 1870 году, докторъ Бастіанъ не принялъ этого вызова.

Но если такая болѣзнь, какъ сибирская язва, причиняется микробомъ, то и микробъ, въ свою очередь, находится подъ вліяніемъ среды, въ которой онъ живетъ. Онъ не вездѣ развивается. Легко прививаясь быку, овцѣ, кролику и морской свинкѣ, — эти послѣдніе два вида составляютъ обыкновенныхъ животныхъ для лабораторныхъ опытовъ, — и будучи для нихъ смертельной, сибирская язва крайне рѣдко встрѣчается у собаки и у свиньи. Необходимо заразить ихъ въ нѣсколько пріемовъ, чтобы достигнуть положительного результата. И то еще это не всегда удается. Она также никогда не принимается у куръ; имъ прививали большія количества сибириязвенной крови и онъ оказались рѣшительно неуязвимыми. Эта индеферентность сильно

поразила Пастера и его двухъ сотрудниковъ, Жубера и Шамберлана. Что такое, однако, происходит въ тѣлѣ куръ, что онѣ могутъ противостоять такимъ прививкамъ, безконечно меньшаго количества которыхъ достаточно, чтобы убить быка? Въ цѣлой серіи опытовъ они убѣдились, что микробъ сибирской язвы не развивается, если его подвергать дѣйствію температуры 44-хъ градусовъ по Цельсію. «Такъ какъ естественная температура птицъ держится между 41 и 42 градусами, то не лежитъ ли, — сказалъ себѣ Пастеръ — причина того, что куры не заражаются сибирской язвой, въ томъ, что температура ихъ крови настолько высока, что она немногимъ ниже той, при которой сибириязвенный вирусъ уже не развивается? Не можетъ-ли жизненная стойкость тканей куръ уравнивать ту небольшую разницу, которая существуетъ между температурой ихъ тѣла, 41 — 42 градусами, и 44-хъ градусной? Потому что всегда нужно брать во вниманіе сопротивленіе всѣхъ живыхъ существъ болѣзнямъ и смерти. Жизнь паразита не можетъ, конечно, быть одинаково легкою въ тѣлѣ животнаго и въ искусственной культурной средѣ, находящейся въ стекляномъ стаканѣ. Если привитый микробъ принадлежитъ къ аэробнымъ, то онъ можетъ только развиваться въ крови, когда отнимаетъ кислородъ у красныхъ кровяныхъ шариковъ, удерживающихъ его съ известной силой для своей собственной жизни. Ничто не можетъ быть вѣроятнѣе предположенія, что красные кровяные шарики куръ такъ жадно удерживаютъ кислородъ, что нити сибириязвенного паразита не могутъ его оттуда добыть и, следовательно, ихъ размноженіе тамъ невозможно.» Это апріорное разсужденіе повело Пастера и его сотрудниковъ къ новымъ изслѣдованіямъ. Они себѣ сказали: «если мы охладимъ кровь курицы, то не сможетъ-ли сибириязвенный паразитъ жить въ этой крови?»

Опытъ былъ сдѣланъ; взяли курицу, предварительно привили ей сибириязвенную кровь и поставили ея ноги въ воду. Вода была 25-и градусовъ. Температура крови курицы понизилась до 37—38 градусовъ. Черезъ 48 часовъ курица была мертвой и вся ся кровь была переполнена бактеридіями сибирской язвы.

« Но, — спрашивалъ себя Пастеръ — « если возможно сдѣлать курицу воспріимчивой къ сибирской язвѣ единственнымъ актомъ охлажденія, то не удастся ли излѣчить зараженную и поставленную въ воду и, слѣдовательно, заболевшую курицу, согрѣвая ее во время? » Курица была привита, поставлена, какъ и предыдущая, въ воду и въ то время, когда въ ней уже замѣчались симптомы сибирской язвы, ее вынимали изъ воды, закутывали ее хорошо ватой и помѣщали ее въ баню съ температурой въ 35 градусовъ. Мало, по, малу силы ея возвращались, она встряхивалась, становилась на ноги и черезъ нѣсколько часовъ она была совершенно здорова. Микробъ всосался, исчезъ. Спасенный такимъ способомъ куры не представляли ни малѣйшихъ слѣдовъ сибираязвенныхъ бактеридъ.

Сколько свѣта бросаютъ такие факты на отношенія явлений жизни къ внѣшнимъ физическимъ дѣятельностямъ и какіе поучительные выводы можно извлечь о громадномъ вліяніи среды и внѣшнихъ условий на жизнь и развитіе заразительныхъ микробовъ. Въ Германіи и во Франціи много спорили о способѣ лѣченія тифозной горячки охлажденiemъ всего тѣла часто повторяющимися общими холодными ваннами. Хорошие результаты отъ этого способа лѣченія могутъ быть поняты, при сравненіи ихъ съ знаменитымъ опытомъ съ курицей. При тифозной горячкѣ холодъ, можетъ быть, останавливаетъ ходъ броженія, которое слѣдуетъ разсматривать, какъ выраженіе и причину болѣзни, также какъ у курицы, но совершенно противуположно, теплота тѣла задерживаетъ развитіе сибираязвенного микробы.

Куриная холера.

Куры, по природѣ своей не воспріимчивыя къ сибирской язвѣ, также подвержены однако, гибельной повальной болѣзни, которая носитъ въ простонародье название куриной холеры.

Вотъ какъ Пастеръ описалъ эту болѣзнь, когда, окончивши свои изслѣдованія по сибирской язвѣ и септицеміи, онъ превратилъ всю свою лабораторію въ громадный курятникъ съ курами;

больными куриной холерою: «птица, страдающая этой болѣзнью, представляется совершенно безсильной, шатающейся, съ опущенными крыльями. Перья на тѣлѣ взѣрошены, что придает всему тѣлу видъ шара. Непобѣдимая сонливость одолѣваетъ ее. Когда заставляютъ ее открыть глаза, она какъ-будто пробуждается отъ глубокаго сна. Вскорѣ ея вѣки опять закрываются и очень часто она умираетъ, не сходя съ своего мѣста, послѣ тихой агоніи. Иногда только она едва помашетъ крыльями нѣсколько секундъ.»

Вскрытіе показываетъ очень значительныя внутреннія разстройства. Здѣсь мы опять имѣемъ болѣзнь, произведенную микроскопическимъ организмомъ. Одинъ ветеринаръ Верхняго Эльзаса, Морицъ, первый предположилъ присутствіе микробы въ этой болѣзни; другой ветеринаръ изъ Туринга, Перончito, представилъ рисунокъ этого микробы въ 1878 г.; профессоръ ветеринарной школы въ Тулузѣ, Туссенѣ, подтвердилъ это въ 1879 г. и послалъ Пастеру голову пѣтуха, умершаго отъ этой болѣзни. Но хотя эти наблюдатели и были очень опытны, они однако не рѣшили вопроса о паразитизмѣ въ этой болѣзни. Никто изъ нихъ не съумѣлъ найти среду, чтобы культивировать этотъ паразитъ; поэтому они не могли получить послѣдовательныхъ культуръ. Но чтобы доказать, что болѣзнь зависитъ исключительно отъ паразита, необходимо прибѣгнуть только къ этому методу. Абсолютно необходимо при изслѣдованіи какой-нибудь болѣзни, зависящей отъ микроскопическихъ паразитовъ, найти прежде всего жидкость, въ которой заражающій микроорганизмъ легко могъ бы развиваться, безъ всякой примѣси какихъ-либо постороннихъ микроорганизмовъ. Бульонъ изъ мышицъ курицы, нейтрализованный калиемъ и обезпложенный при температурѣ 110 — 115 градусовъ, оказывается чрезвычайно удобнымъ для жизни микробы куриной холеры. Легкость и быстрота размноженія этого микроскопического организма въ вышеописанной средѣ изумительны. Въ нѣсколько часовъ самый прозрачный бульонъ начинаетъ мутиться и переполненъ уже безконечнымъ количествомъ чрезвычайно тонкихъ, маленькихъ члениковъ, которые перетянуты въ срединѣ и съ первого взгляда

кажутся изолированными точками. Эти членики не обладаютъ произвольнымъ движениемъ. Въ слѣдующіе дни эти организмы превращаются во множество точекъ, настолько уменьшившихся въ объемѣ, что жидкость, бывшая прежде мутной, почти молочной, получаетъ мало-по-малу обратно свою первоначальную прозрачность. Этотъ микробъ, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, принадлежитъ, вѣроятно, къ совершенно другой группѣ организмовъ, чѣмъ вибріоны. Его отдѣляютъ въ особый родъ, носящій название микрококковъ. *) Вѣроятно къ одной изъ группъ этого рода, сказалъ однажды Пастеръ, придется причислить и микробы разныхъ, еще не изслѣдованныхъ заразныхъ болѣзней, когда удастся культивировать ихъ.

Пастеръ пытался культивировать микроба куриной холеры въ той-же самой средѣ, которою онъ раньше пользовался весьма успешно, а именно въ водѣ дрожжей, то есть въ отварѣ пивныхъ дрожжей въ водѣ, который фильтруется пока не сдѣлается прозрачнымъ, потомъ стерилизуется, при температурѣ выше 100 градусовъ. Самые разнообразные микроскопическіе организмы приспособляются къ этой питательной жидкости, въ особенности, если она нейтрализована. Если, напримѣръ, посѣять въ этой жидкости сибиреязвенную бактеридію, то она въ ней превосходно развивается въ нѣсколько часовъ. Однако, къ величайшему удивленію, микробъ куриной холеры совершенно не способенъ развиваться въ этой культурной жидкости. Онъ не только не развивается въ ней, но даже очень скоро въ ней погибаетъ, а именно меныше чѣмъ въ сорокъ восемь часовъ. Нельзя ли сопоставить этотъ странный фактъ съ тѣмъ известнымъ наблюденіемъ, что прививка нѣкоторыхъ микроорганизмовъ оказывается безвредной для иныхъ породъ животныхъ? Можетъ быть, это обусловливается тѣмъ, что эти микробы не могутъ развиваться въ тѣлѣ даннаго животнаго или же развитіе ихъ задерживается, и вслѣдствіе этого микробы не могутъ поразить существенно-важныхъ для жизни органовъ.

*) Позднѣйшія изслѣдованія показали, что микробъ куриной холеры имѣть форму палочки и относится, слѣдовательно, къ бактеріямъ.

Только бульонъ изъ куриного мяса представляетъ хорошую среду для развитія микробы куриной холеры. Достаточно привить курицѣ сотую или тысячную долю капли такого бульона, чтобы вызвать у ней болѣзнь и смерть. Но вотъ еще одна странная особенность этого микробы: привитый морской свинкѣ, онъ ее никогда не убиваетъ. У взрослыхъ свинокъ очень часто замѣчаются только мѣстное пораженіе, ограниченное областью прививки; пораженіе это часто выражается нарываемъ большаго или меньшаго объема. Потомъ наррывъ самъ собой вскрывается и заживаетъ, при этомъ животное не перестаетъ есть и сохраняетъ вообще вполнѣ здоровый видъ. Этотъ наррывъ тянется иногда нѣсколько недѣль. Онъ окружено гноеродной оболочкой и наполненъ густымъ гноемъ, насыщеннымъ микробами съ примѣсью гнойныхъ шариковъ. Этотъ наррывъ произведенъ жизнью привитаго подъ кожу микробы. Наррывъ съ окружающей его оболочкою становится для микроорганизма какъ-бы закрытымъ сосудомъ, откуда его можно даже извлекать, не убивая для этого свинку. Микроорганизмъ сохраняется тамъ, смытый съ гноемъ, въ большой чистотѣ и, хотя онъ тамъ локализированъ, но сохраняетъ, однако, свою страшную заразительность, какъ и тысячная доля капли, взятой изъ культуры въ куриномъ бульонѣ. Если привить курицѣ немногого гноя изъ этого нарыва, то курица быстро умираетъ, тогда какъ морская свинка, отъ которой взята зараза, выздоравливаетъ безъ малѣйшихъ слѣдовъ страданія. Чрезвычайно странное явленіе! Очень заразительный микробъ развивается мѣстно, не вызывая никакихъ общихъ болѣзненныхъ симптомовъ, ни смерти животнаго, на которомъ онъ живетъ и размножается, и не теряетъ при этомъ ни-чуть своихъ свойствъ убивать другие виды животныхъ, когда имъ его привить. Куры и кролики, живущіе вмѣстѣ съ морской свинкою, имѣющей такой наррывъ, могутъ внезапно заболѣть и умереть, тогда какъ здоровыя свинки ни-чуть не пострадаютъ. Достаточно для этого, чтобы изъ вскрытаго нарыва свинки попало немногого гноя въ пищу кроликовъ или куръ. Наблюдатель, который былъ бы свидѣтелемъ такого рода падежа безъ видимой причины, не зная этой странной

связи, навѣрно заключилъ-бы, что болѣзнь появилась самопроизвольно. Ему-бы и въ голову не пришло предположить, что павшія животныя заразились отъ морской свинки, которая на видъ совершенно здорова. Очень можетъ быть, что въ исторіи заразительныхъ болѣзней еще много таинственныхъ явлений будетъ когда-нибудь разъяснено еще болѣе просто, чѣмъ въ данномъ случаѣ!

Если положить на хлѣбъ или на мясо, приготовленные для пищи курамъ, нѣсколько капель изъ культуры микробы, то зараза проникнетъ черезъ кишечный каналъ. Въ кишечнике маленькой микробъ развивается въ такомъ громадномъ количествѣ, что экскременты курицы, привитые другой, заражаютъ и убиваютъ ее. Такимъ образомъ, легко себѣ объяснить способъ распространенія въ птичникахъ этой страшной болѣзни, уничтожающей иногда всѣхъ куръ какой-нибудь мѣстности. Единственное средство остановить распространеніе заразы состоить въ томъ, чтобы изолировать въ другое мѣсто на нѣсколько дней всѣхъ куръ и цыплятъ, удалить изъ птичника весь навозъ и вымыть птичникъ большимъ количествомъ воды; еще лучше подкислить эту воду небольшимъ количествомъ сѣрной кислоты или карболовой, прибавляя два грамма кислоты на литръ воды. Эти жидкости легко разрушаютъ микробы или, по крайней мѣрѣ, останавливаютъ его развитіе. Такимъ образомъ, уничтожаются всѣ причины зараженія, потому что, пока куры изолированы въ другомъ мѣстѣ, тамъ, въ птичнике, успѣваютъ умереть всѣ, прежде заразившіяся, такъ какъ болѣзнь эта протекаетъ очень быстро.

Повторная послѣдовательная культуры этого заразнаго микробы въ куриномъ бульонѣ, произведенныя ежедневнымъ пересаживаніемъ чрезвычайно малаго количества, — напримѣръ, столько, сколько можетъ попасть на конецъ иголки, — не ослабляетъ замѣтно ядовитости этого микроскопическаго существа. Его размноженіе въ тѣлѣ куръ происходитъ также легко, какъ и въ первой культурѣ. Однимъ словомъ, какъ-бы велико не было количество послѣдовательныхъ культуръ въ куриномъ бульонѣ, послѣдняя культура еще очень заразительна. Это доказы-

ваетъ, что только микробъ составляетъ причину болѣзни; доказательство это такого же рода, какое послужило Пастеру къ установленію, что сибирская язва и септицемія происходятъ отъ специфическихъ микробовъ.

Микробъ куриной холеры такой же аэробъ, какъ и бактеридія сибирской язвы. Онъ культивируется въ соприкосновеніи съ воздухомъ или въ жидкостяхъ, содержащихъ воздухъ. Однако, онъ въ некоторыхъ отношеніяхъ, и даже въ своемъ отношеніи къ кислороду, существенно отличается отъ сибираязвенной палочки. Если оставить сибираязвенную кровь, переполненную маленькими нитями паразита, безъ доступа воздуха, — напримѣръ, если оба конца трубочки, наполненной этой кровью, запаять на нѣсколько только дней, самое большое на 8—10 дней, а лѣтомъ и того меньше, — то паразитъ исчезаетъ, или, вѣрнѣе сказать, превращается въ мелкія аморфныя зернышки и кровь теряетъ всю свою заразительность. Если-же такимъ образомъ закрыть оба конца трубочки съ кровью отъ курицы, пораженной куринохолернымъ микробомъ, то этотъ микробъ, напротивъ, сохраняетъ тамъ свою заразительность въ теченіе недѣль, мѣсяцевъ и даже лѣтъ. Пастеръ сохранялъ такія закрытыя трубочки 3 года и достаточно было взять изъ нихъ одну каплю крови, посѣять на куриный бульонъ, чтобы прививкой этой культуры вызвать куриную холеру у домашнихъ птицъ. И не только въ крови сохраняется такимъ образомъ долго заразительность этого микробы, но то же самое будетъ и съ культурой въ куриномъ бульонѣ, сохраняемой въ трубочкѣ, запаянной на лампѣ съ обоихъ концовъ.

Если такія трубочки теряютъ свою заразительность, то это значитъ, что микробъ въ нихъ совершенно потерялъ свою жизненность. Съ той минуты, какъ содержимое трубочки больше не заразительно, оно уже мертвъ. Безполезно пробовать тогда культивировать содержимое: микробъ не можетъ больше возродиться.

Итакъ, это уже третья заразная болѣзнь, происходящая отъ микроскопического организма. Характерные болѣзнетные

признаки куриной холеры сильно отличаются отъ признаковъ сибирской язвы и острой септицеміи и вообще эти три микробы совершенно не похожи другъ на друга. Но, припоминая прежнія изслѣдованія Пастера, нельзя не спросить себя, не представляютъ ли и болѣзни шелковичнаго червя, такъ называемая пебрина и сама флашери (мертвенность), тоже заразныхъ болѣзней? Такимъ образомъ, столько различныхъ предметовъ въ такой массѣ разнообразныхъ изслѣдованій — все оказывается другъ съ другомъ связаннымъ и все держится одной непрерывной цѣпью. Каждое открытие Пастера связано съ предыдущимъ и представляетъ строгую провѣрку, посредствомъ экспериментальнаго метода, какой-либо предвзятой идеи.

«Ничего не удается безъ предвзятой идеи! — сказалъ однажды Пастеръ. — Надо только настолько обладать благоразумiemъ, чтобы не дѣлать изъ нея выводовъ, не подтвержденныхъ опытомъ. Предвзятые идеи, подвергнутыя строгому контролю опыта, представляютъ собою оживляющее пламя наблюдательныхъ наукъ. Если-же сдѣлать изъ нихъ предвзятое убѣжденіе (*idée fixe*), то онъ становится пагубными для такихъ наукъ. Припомните-ка прекрасную фразу Боссюэта: «самая большая неправильность мышленія заключается въ томъ, что вѣришь вещамъ только потому, что желательно, чтобы онъ были.» Пуститься въ какой-либо путь и часто останавливаться, чтобы спрашивать себя, не заблуждаемся ли мы, — вотъ самый вѣрный методъ!»

Вотъ именно этотъ методъ и привелъ Пастера въ 1880 году къ замѣчательному открытию ослабленія заразъ. Что представляютъ собою заразы, мы уже видѣли; теперь посмотримъ, чѣмъ они стали въ рукахъ Пастера.

Ослабленные заразы или вакцины заразныхъ болѣзней.

Вакцина куриной холеры.

Изъ всѣхъ бѣдствій, поражающихъ человѣческій родъ, нѣть ни одного, которое уносило бы больше жертвъ, чѣмъ заразительные болѣзни. Корь, скарлатина, дифтеритъ, оспа, сифилисъ, сибирская язва, желтая лихорадка, сыпной тифъ, восточная чума, — какой ужасный рядъ! Я уже не говорю о такихъ, какъ сапъ, проказа и собачье бѣшенство. Исторія этихъ болѣзней представляетъ много чрезвычайныхъ явлений. Несомнѣнно, самое странное явленіе, встрѣчающееся у громаднаго большинства этихъ болѣзней и замѣченное уже съ давнихъ временъ, — это отсутствіе возврата. Общее правило, хотя крайне рѣдко встрѣчаются и исключенія, — это то, что человѣкъ не болѣеть больше одного раза въ жизни ни корью, ни скарлатиной, ни чумой, ни желтой лихорадкой. Какое объясненіе, хотя бы и въ видѣ гипотезы, можно дать такому явленію? Есть, однако, явленіе еще болѣе удивительное. Какимъ образомъ коровья оспа, которая сама — болѣзнь заразительная, но доброкачественная, предохраняетъ отъ болѣе тяжелой болѣзни, отъ оспы? Встрѣчалось-ли когда-нибудь наблюденіе, болѣе таинственное по своимъ причинамъ и по своему происхожденію? Это наблюденіе — единственное въ исторіи медицины; и вотъ уже скоро цѣлое столѣтіе оно существуетъ и ничего подобнаго въ другихъ болѣзняхъ не замѣчено. «Но, — сказалъ себѣ Пастеръ, долго думавшій объ открытіи Дженнера, если многія заразныя болѣзни не рецидивируютъ, то почему нельзя найти для каждой изъ нихъ соотвѣтственныхъ имъ или близкихъ имъ формъ болѣзней, которые могли бы дѣйствовать на нихъ, какъ коровья оспа (вакцина) дѣйствуетъ на натуральную оспу, т. е. которая имѣли-бы предохранительное свойство?». Одна изъ тѣхъ случайностей, на которыхъ наталкиваются тѣ, которые все дѣлаютъ, чтобы ихъ найти, дала возможность Пастеру исполнить это требо-

ваше науки и прийти къ такому открытию, которое съ полнымъ правомъ можетъ называться однимъ изъ величайшихъ открытій нашего столѣтія.

Пересаживая микроба куриной холеры изъ одной культуры въ другую въ искусственной средѣ и пересаживая его многое множество разъ для того, чтобы не было ни малѣйшей возможности вообразить себѣ, что въ культурѣ есть остатокъ заразительной капли, послужившей исходной точкой для культуры, и чтобы не было ни малѣйшей возможности приписать заразительность культуры той первой каплѣ, Пастеръ далъ этимъ неопровергимое доказательство того, что только заразные микробы составляютъ причины соответственныхъ болѣзней. Не дюжину и не десятки культуръ куриной холеры можно получить такимъ образомъ, а сотни и даже тысячу такихъ культуръ, и въ тысячной культурѣ заразительность не исчезнетъ, даже замѣтно не уменьшится! Однако, слѣдующій фактъ заслуживаетъ серьезнаго вниманія: сохраненіе заразительности въ послѣдовательныхъ культурахъ только тогда возможно, когда нѣть большихъ промежутковъ времени между культурами. Необходимо, напримѣръ, вторую культуру посѣять не позже 24 час. послѣ первой, третью культуру — 24 часа послѣ второй и т. д., сесту — черезъ 24 часа послѣ 99-й. Если же пересаживать изъ одной культуры въ слѣдующую только чрезъ нѣсколько дней или черезъ нѣсколько недѣль и въ особенности, если это сдѣлать черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, то замѣчаются громадную разницу въ заразительности культуръ. Эта перемѣна, вообще говоря, зависитъ отъ длины промежутка и выражается ослабленіемъ заразительной силы. Если послѣдовательная культура куриной холеры, сдѣянная съ небольшими промежутками другъ за другомъ, имѣютъ такую сильную заразительность, что десять или двадцать зараженныхъ куръ погибаютъ черезъ 24 или 48 часовъ, то культура, постоявшая мѣсяца три, напримѣръ, въ пробиркѣ, закрытой ватной пробкой, — что мѣшаетъ прониканію въ пробирку всѣхъ постороннихъ зародышей и пропускаетъ туда только чистый воздухъ, — эта культура, привитая двадцати курицамъ, можетъ ихъ всѣхъ сдѣлать болѣе или менѣе

больными, но безъ того, чтобы хотя одна изъ нихъ погибла. Бывшее у нихъ лихорадочное состояніе, апатичность, отсутствіе аппетита, которымъ они страдали, проходить черезъ нѣсколько дней. Но если и это явленіе чрезвычайно удивительно, то слѣдующее еще больше поразительно. Если по выздоровленіи этихъ двадцати куръ, привить имъ вторично ядъ, сильно заразительный, — тотъ самый, напр., о которомъ мы только что говорили, что онъ, привитый двадцати курамъ, всѣхъ убиваетъ черезъ 24 или 48 часовъ, то эти куры будутъ, можетъ быть, немного больны, но ни одна изъ нихъ не погибнетъ. Выводъ изъ этого очень простой: эта болѣзнь можетъ сама отъ себя предохранить. Она имѣеть, значитъ, одинъ изъ характерныхъ признаковъ заразительныхъ болѣзней, она — не рецидивируетъ.

Какъ ни странно это явленіе, однако оно не неизвѣстно въ патологіи. Прививали когда-то натуральную оспу для предохраненія отъ оспы-же; да и теперь еще прививаютъ овцамъ оспу съ предохранительной цѣлью; чтобы предохранить рогатый скотъ отъ воспаленія легкихъ (*perirpneumonia*), имъ прививаютъ ту же самую болѣзнь. Куриная холера представляетъ, значитъ, предохраненіе такого-же порядка, т. е. она дѣлаетъ куръ «иммунными» къ этой болѣзни. Это представляетъ только научное пріобрѣтеніе, но принципъ его совсѣмъ не новъ.

Громадная важность этого научного пріобрѣтенія, истекающаго изъ предыдущихъ фактovъ и вслѣдствіе котораго оно получаетъ особенное значеніе въ изученіи заразныхъ болѣзней, состоитъ въ томъ, что здѣсь дѣло идетъ о болѣзни, въ которой заразное начало — микроскопическій паразитъ — существо живое, удобо-культивируемое впѣ тѣла, и что заразительность его можетъ быть ослаблена по волѣ экспериментатора. Онъ ее создаетъ, онъ же ее и ослабляетъ и дѣлаетъ съ ней, что хочетъ. И всѣ эти различные силы заразительности онъ получаетъ отъ самой заразительной формы лабораторными манипуляціями. Сравнивая это съ замѣчательнымъ фактомъ вакцинаціи для предохраненія отъ оспы, можно сказать, что ослабленный микробъ — не убивающій, относится къ микробу — убивающему, какъ настоящая вакцина. Онъ вызываетъ болѣзнь, которую

мѣжно рѣшительно назвать доброкачественною, потому что она никогда не кончается смертью, и предохраняетъ отъ болѣзни смертельной.

Но для того, чтобы этотъ микробъ съ ослабленной заразительностью, быль-бы настоящей вакциною, подобно коровьей оспѣ, не нужно-ли, чтобы онъ укрѣпился, если можно такъ выражаться, въ этой отличительной особенности, чтобы совсѣмъ не надо было никогда прибѣгать къ первоначальному источнику? Дженеръ, указавши, что привитая коровья оспа предохраняетъ человѣка отъ заболѣванія натуральной оспою, боялся одно время, какъ-бы не приходилось каждый разъ добывать коровъ, больныхъ коровьей оспою, для обезпеченія себя вакциною. Его настоящее открытие состояло въ томъ, что онъ констатировалъ возможность передачи коровьей оспы, при прививкѣ ея человѣку съ руки на руку. Пастеръ пересаживалъ свою вакцину, т. е. ослабленного микробы, изъ одной культуры въ другую. Возникъ вопросъ, чего можно было ожидать отъ этого? Возвратится ли эта вакцина къ своей первой заразительности или же сохранится въ ослабленномъ видѣ?

Заразительность ея, какъ оказалось, осталась ослабленной и, такъ сказать, безъ перемѣны; слѣдовательно, это была настоящая вакцина. Нѣсколько ветеринаровъ и фермеровъ, узнавшихъ объ этомъ открытии, обратились къ Пастеру съ просьбою прислать имъ эту вакцину противъ болѣзни, столь губительной для птичниковъ. Опыты эти были сдѣланы и удались, какъ нельзя быть лучше. Для сохраненія этой вакцины ее необходимо держать въ соприкосновеніи съ воздухомъ, т. е. трубочки, въ которыхъ находятся эти культуры, запаиваются съ обоихъ концовъ на пламени горѣлки.

Что однако происходитъ съ микробомъ прежде, чѣмъ его заразительность ослабляется? Что дѣлается съ нимъ въ промежуткѣ времени, протекающемъ по волѣ изслѣдователя между двумя послѣдовательными пересадками микробы куриной холеры, въ промежуткѣ времени, производящемъ ослабленіе заразительности? Что здѣсь происходитъ? Въ чёмъ секретъ этого вліянія времени?

Да, ничто иное, какъ кислородъ воздуха, производить все это! Вотъ и доказательство тому: если сдѣлать культуру микробы въ трубочкѣ, содержащей очень мало воздуха, и если запасть потомъ концы трубочки на пламени, то микробъ своею жизнью и своимъ развитіемъ скоро употребить весь свободный кислородъ, содержащейся въ трубочкѣ и растворенный въ жидкости: въ такомъ случаѣ, оставаясь потомъ внѣ соприкосновенія съ кислородомъ, микробъ потеряетъ крайне мало своей заразительности въ продолженіе мѣсяцевъ, а иногда даже въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ.

Кислородъ воздуха оказывается, такимъ образомъ, причиной измѣненія ядовитости микробы.

Однако, какъ себѣ объяснить въ такомъ случаѣ, что кислородъ воздуха не оказываетъ никакого вліянія, когда послѣдовательные культуры возобновляются каждые 24 часа? По мнѣнію Пастера, здѣсь возможно только одно объясненіе, — что въ данномъ случаѣ кислородъ воздуха употребляется микробомъ только для жизни и развитія. Развитіе каждой культуры продолжается нѣсколько дней; въ 24 часа оно еще не закончилось, и воздухъ, приходящій въ соприкосновеніе съ микробомъ, весь употребляется имъ для своего питанія и размноженія. Воздухъ начинаетъ дѣйствовать въ качествѣ уменьшителя заразительности микробы только спустя нѣкоторое время, въ теченіе длиннаго промежутка, протекающаго отъ одной пересадки до другой, и наступаетъ, наконецъ, моментъ, когда вирулентность ослабляется до нуля.

Тогда замѣчается одно, крайне интересное явленіе: ослабленіе заразительности можетъ дойти до нулевой степени, прежде чѣмъ микробъ умретъ. Культуры представляютъ тогда микробы, который можетъ безконечно культивироваться, но не можетъ, съ другой стороны, жить въ тѣлѣ куръ и лишенъ, слѣдовательно, своей заразительности. Нельзя ли сравнить этого микробы — «прирученаго», какъ выразился однажды Булей (Bouley), съ обыкновенными безвредными микробами, находящимися въ такомъ изобилии въ природѣ? Наши обыкновенные микробы, — не будутъ ли они въ свою очередь микробами, лишившимися своей перво-

начальной заразительности? И обратно, — не могутъ ли эти безвредные микробы сдѣлаться опять ядовитыми при известныхъ обстоятельствахъ? И если въ наше время заразительныхъ болѣзней меньше, чѣмъ въ прошлыхъ времена, то не можетъ ли современемъ опять увеличиться число такихъ болѣзней?

Число вопросовъ наростиаетъ; факты, относящіеся къ этому первому примѣру ослабленія заразительности, внушаютъ массу размышеній, вызываютъ множество идей и бросаютъ новый свѣтъ на предметъ, бывшій до этого времени совершенно темнымъ. Думали когда-то, что зараза представляется какой-то неизмѣнной сущностью; зараза считалась всегда одной. Это мнѣніе имѣетъ еще до сихъ поръ явныхъ защитниковъ. По мнѣнію-же Пастера, зараза имѣетъ различныя степени заразительности: она можетъ доходить отъ нулевой степени до максимума заразительности. Измѣнная по собственному желанію заразительность куриной холеры, Пастеръ прививалъ, напримѣръ, курамъ крайне слабую заразу, которая не могла предохранить отъ смертельной, но совершенно годилась для предохраненія отъ яда болѣе сильнаго, чѣмъ прежде привитой. Второй вирусъ предохранялъ отъ еще болѣе сильнаго, отъ третьяго и, переходя отъ вируса къ вирусу, Пастеръ кончилъ тѣмъ, что предохранялъ куръ отъ самого смертельного яда, то есть противъ микробы, обладавшаго максимальной заразительностью. Весь вопросъ о вакцинаціи сводится къ тому, чтобы опредѣлить, — когда данный вирусъ достигъ той степени, при которой онъ представляетъ предохранительную гарантію противъ смертельной заразы.

Кажется, что отношеніе между оспенной вакциною и натуральной оспою представляетъ тоже подобнаго рода факты. Очень вѣроятно, что рѣдко удается вакцинировать противъ оспы такимъ образомъ, чтобы предохранить отъ крайне сильнаго оспенного вируса. Въ оспенныхъ эпидеміяхъ мы видимъ, что много вакцинированныхъ людей поражается оспою и поражаются иногда даже смертельной оспою.

Относительно того, какъ производить предохранительную прививку курамъ противъ свойственной имъ холеры, — хотя,

конечно, это не имѣть такой важности, какъ предохранительная прививка людей и только научно имѣть очень важное значеніе, — то, какъ-бы различна ни была восприимчивость различныхъ породъ куръ, или каждой курицы одной и той-же породы, все-таки можно надѣяться, что удастся найти въ каждомъ случаѣ соотвѣтственную вакцину, въ особенности, если позаботиться употребить двѣ послѣдовательныя вакцины неодинаковой силы и прививка второй будетъ производиться черезъ 10—15 дней послѣ первой. Первая вакцина можетъ всегда быть очень слабой, — такъ, чтобы она не убивала ни одной изъ привитыхъ куръ и чтобы она, однако, имѣла достаточно силы для предохраненія отъ второй. Вторая вакцина должна имѣть такую силу, что-бы, если ее сразу привить, она убивала бы нѣкоторыхъ, но послѣ первой прививки не должна дать ни одного смертнаго случая и должна вмѣстѣ съ тѣмъ предохранить отъ самаго заразительного вируса. Что касается приготовлениія вакцинъ различной силы, то необходимо для опредѣленія этой силы испытать вакцины на извѣстномъ количествѣ куръ, рискуя даже потерять нѣкоторыхъ при этихъ предварительныхъ опытахъ. Кроме этого практическаго вопроса, остается еще одинъ вопросъ, имѣющій научное значеніе. Какъ понять результатъ прививки? Что здѣсь такое происходитъ? Какое объясненіе дать тому факту, что доброкачественная болѣзнь можетъ предохранить отъ болѣе тяжелой и, въ большей части случаевъ, смертельной болѣзни?

Пастеръ уже давно искалъ рѣшенія этой замѣчательной задачи. Не обманываясь въ томъ, будто онъ совершенно разрѣшилъ ея неясность, онъ, однако, собралъ такую массу фактовъ, что теперь возможно постановить гипотезу для объясненія этой темной области физіологии, — гипотезу, которая достаточно удовлетворяетъ пытливый умъ. Пастеръ полагаетъ, что вакцина, культивируясь въ тѣлѣ животныхъ, отнимаетъ у кровяныхъ шариковъ, напримѣръ, нѣкоторыя составные части, предназначенные жизненнымъ процессомъ къ удаленію изъ экономіи, но безъ которыхъ смертельный вирусъ или вирусъ болѣе заразительный, чѣмъ прежде привитый, не можетъ

жить. Такимъ образомъ можно себѣ объяснить незаразительность послѣдовательнаго, болѣе сильнаго или смертельнаго вируса.

Когда Пастеръ изложилъ въ Академіи Наукъ эти чрезвычайно важные и совершенно непредвидѣнные факты, то это вызвало въ первое время некоторое недоразумѣніе. Немногожакъ-бы удивились, услышавши, что онъ употребляется для куриной холеры слово «вакцинація», до сихъ поръ исключительно примѣнявшееся къ открытію Дженера. Только на международномъ медицинскомъ конгрессѣ, бывшемъ въ Лондонѣ, въ августѣ 1881 года, Пастеръ предъ тремя тысячами врачей, съѣхавшихъ со всѣхъ частей свѣта и принявшихъ его съ энтузіазомъ, сдѣлавшимъ честь всей Франціи, — только здѣсь Пастеръ объяснилъ*), почему онъ далъ это название, «вакцинація», своимъ опытамъ предохранительной прививки.

«Я распространилъ — сказалъ Пастеръ — выраженіе «вакцинація» на болѣе обширную область въ надеждѣ, что наука освятитъ это выраженіе въ честь одного изъ величайшихъ людей Англіи, Дженера, за заслуги и громадную пользу, оказанныя имъ человѣчеству».

И однако, хотя Пастеръ и ставить себя позади Дженера, — что, конечно, дѣлаетъ честь его скромности, — но нужно, впрочемъ, сознаться, что если разсматривать вопросъ съ теоретической, съ научной точки зрѣнія, то необходимо сказать, что эти два открытія невозможно даже и сравнивать. Какъ не велико было открытие Дженера, оно все-таки представляло только случайное наблюденіе, безъ дальнѣйшихъ плодотворныхъ послѣствій. Въ теченіе цѣлаго вѣка медицина не могла ничего больше извлечь изъ этого открытія, какъ только тѣ, что она имъ пользовалась; въ этомъ и состояло все его значеніе. Одинъ изъ противниковъ Пастера, котораго послѣдній особенно сильно преслѣдовалъ, своей аргументацией, долженъ быть ему отвѣтить: «вакцина... это вакцина!..» Противникъ не нашелъ ничего болѣе убѣдительнаго, да и не могъ найти ничего другаго.

Коровья оспа это болѣзнь, свойственная извѣстной расѣ животныхъ. Человѣкъ не можетъ ее вызвать, онъ ее только наблю-

*.) См. приложенія.

даетъ. Если-бы вдругъ исчезла эта болѣзнь, то сейчасъ-же наступила-бы полная тьма въ прѣдохранительной прививкѣ отъ оспы. Во Французскомъ-же открытии, напротивъ, самъ смертельный вирусъ служитъ исходной точкой для приготовленія предохранительной вакцины. Производство вакцины становится дѣломъ рукъ человѣческихъ, эта вакцина можетъ быть приготовлена лабораторнымъ путемъ въ такомъ количествѣ, что можно удовлетворить всѣмъ требованіямъ. Какая громадная перспектива для мыслящихъ людей, когда видно во-очію, что и сама зараза, и ея вакцина — суть одно и тоже живое существо и что въ этомъ существѣ мы имѣемъ всѣ различныя степени заразительности, которая мы, кромѣ того, можемъ фиксировать, удержать искусственной культивировкой! Дженеръ сдѣлалъ гениальное открытие, а Пастеръ открылъ гениальный методъ.

«Это только начало, — сказалъ Булей въ тотъ день, когда эти факты были изложены въ Академіи Наукъ, — новая доктрина открывается для медицины и эта новая доктрина мнѣ кажется могущественной и блестящей. Великая будущность готовится, я жду ее съ глубокимъ убѣжденіемъ искренно вѣрующаго и съ душою, полною энтузіазма!»

Вакцины сибирской язвы.

Такимъ образомъ, былъ установлено относительно микроба куриной холеры, что иммунитетъ, т. е. невоспріимчивость къ заразительному микробу, можетъ быть приобрѣтенъ доброкачественной болѣзни, вызванной тѣмъ-же микробомъ, но съ ослабленной заразительностью. Какая будущность для медицины, если-бы удалось приложить этотъ предохранительный методъ ко всѣмъ заразнымъ болѣзнямъ! Такъ какъ сибирская язва была тогда предметомъ изученія въ лабораторіи Нормальной Школы, то прежде всего попытались приложить этотъ методъ къ изслѣдованию сибирской язвы. «Но — сказалъ себѣ Пастеръ — успѣхъ въ данномъ случаѣ только тогда возможенъ, если сибирская язва не рецидивируетъ. Только тогда позволительно думать, что прививка ослабленного микроба сибирской язвы предохранить отъ

смертельной ея формы. Къ несчастью, человѣческая патология не даетъ никакого отвѣта на этотъ вопросъ. Человѣкъ очень рѣдко переживаетъ сибирскую язву. Если и бываютъ случаи выздоровленія, — а такие несомнѣнно бываютъ, — то тотъ, кто избѣгнулъ смерти, не можетъ служить для доказательства невосприимчивости къ сибирской язвѣ. Чтобы увѣриться въ такой невосприимчивости, нужно было бы такого человѣка подвергнуть прямой экспериментальной прививкѣ, но, конечно, обѣ этомъ никто не думаетъ. Слѣдовательно, одни только животныя представляютъ возможность решить этотъ вопросъ. При томъ же, нельзя безразлично пользоваться всякимъ видомъ животныхъ. Всякая овца, которой прививаютъ сибирскую язву, умираетъ; быки же и коровы болѣе устойчивы по отношенію къ этой болѣзни, у нихъ часто бываетъ исходъ къ выздоровленію.

Случайность дала Пастеру возможность подвинуть впередъ рѣшеніе этой задачи. Въ 1879 г. министръ земледѣлія поручилъ Пастеру дать заключеніе о достоинствѣ способа излеченія коровъ отъ сибирской язвы, — способа, изобрѣтеннаго однимъ ветеринаремъ Юры, Лувріеромъ. Взявши себѣ помощникомъ Шамберлана для наблюденія за способомъ лѣченія Лувріера, Пастеръ установилъ цѣлый рядъ сравнительныхъ опытовъ. Прививали коровамъ — двумъ, а иногда и четыремъ — сибириязвенный вирусъ. Половина этихъ зараженныхъ коровъ была подвергнута лѣченію Лувріера, а другая половина оставлена безъ лечения. Извѣстное количество коровъ, лѣченыхъ Лувріеромъ, исправилось, по такая-же часть коровъ, совсѣмъ не лѣченыхъ, также выздоровѣла. Такимъ образомъ, въ одно и то-же время удалось опредѣлить недѣйствительность предложенного способа лѣченія и причину, введенную изобрѣтателемъ въ заблужденіе. Однако, испытаніе этого способа лѣченія доставило цѣнный результатъ. Пастеръ и Шамберланъ получили въ свое распоряженіе пѣсколько коровъ, выздоровѣвшихъ отъ сибирской язвы, перенесшихъ очень тяжелую ея форму съ очень серьезными симптомами. На мѣстѣ прививки образовывались громадные отеки, спускавшіеся по конечностямъ или по животу и содержащіе много литровъ серозной жидкости. Лихорадка была у нихъ чрезвычайно высокая, и нѣкоторое время казалось,

что смерть этихъ животныхъ неизбѣжна. Когда эти коровы совсѣмъ выздоровѣли, привили имъ вторично большое количество заразительного вируса. Ни малѣйшихъ слѣдовъ заболѣванія не появилось, хотя эта вторая прививка была имъ сдѣлана больше, чѣмъ透过一年.

Вопросъ оказался рѣшеннымъ; сибирская язва также, какъ и большая часть заразныхъ болѣзней, которая можно было изслѣдоватъ въ этомъ направленіи, оказалась не способной рецидивировать; иммунитетъ получается при этой болѣзни на долгое время. Тогда уже Пастеръ съсвойственой ему смѣлостью и горячностью, побуждавшими его всегда идти впередъ, поставилъ себѣ задачей искать вакцину для сибирской язвы. Въ виду этихъ новыхъ изслѣдованій, требовавшихъ продолжительного и кропотливаго труда и слишкомъ близко касавшихъ нѣкоторыхъ областей медицины, Пастеръ пригласилъ себѣ въ помощники, кромѣ Шамберлана, молодого ученаго, нынѣ доктора медицины, Ру.

Слѣдя строго за своими прежними выводами, Пастеръ, естественно, обратился прежде всего къ кислороду воздуха, чтобы испытать его дѣйствие на измѣненіе заразительности сибиреязвенного микроба. Но съ самаго начала здѣсь представилось слѣдующее затрудненіе: микробъ сибирской язвы и микробъ куриной холеры существенно отличаются одинъ отъ другаго: микробъ куриной холеры, какъ и значительное число другихъ микроскопическихъ организмовъ, воспроизводится только дѣленіемъ; паразитъ сибирской язвы, напротивъ, имѣеть еще и другой способъ размноженія: микробъ этотъ заключаетъ въ себѣ тѣльца-зародыши, споры, которыя не встрѣчаются у микроба куриной холеры.

Въ крови животныхъ, а также, въ первое время, и въ культурѣ, сибиреязвенный микробъ представляется въ видѣ прозрачныхъ нитей, болѣе или менѣе членистыхъ; до сихъ поръ сходство этого микроба съ микробомъ куриной холеры вполнѣшее. Но эта кровь или эта культура, оставленная въ соприкосновеніи съ воздухомъ, вместо того, чтобы продолжать свой первоначальный способъ размноженія дѣленіемъ, получаетъ въ этихъ нитяхъ,

иногда уже черезъ 24 часа, тѣльца зародыши, споры, расположенные по длини ихъ въ видѣ болѣе или менѣе правильныхъ рядовъ. Все вещества нитей вокругъ этихъ споръ всасывается, какъ это указано и изображено Пастеромъ въ другомъ мѣстѣ на рисункахъ его работы о болѣзни шелковичнаго червя по поводу бациллъ гшенія. Мало-по-малу исчезаетъ всякая связь между отдѣльными тѣльцами, спорами, и всѣ эти споры представляютъ массу пылинокъ, состоящую изъ зародышей. И въ этомъ-то и состоитъ громадная трудность, встрѣченная изслѣдователями при примѣненіи къ сибирской язвѣ того-же метода ослабленія заразительности, какъ при куриной холерѣ, что эти споры могутъ годами находиться въ соприкосновеніи съ воздухомъ, не теряя своей заразительности, всегда способны дать новое поколѣніе вируса, не измѣненного и вызывающаго присущія ему явленія въ тѣлѣ животныхъ. Какимъ образомъ можно было надѣяться получить вакцину сибирской язвы тѣмъ-же способомъ, что и при куриной холерѣ, если вирусъ сибирской язвы фиксируется такъ быстро, уже черезъ 24 часа, въ видѣ зародыша, т. е. споръ? Прежде чѣмъ кислородъ воздуха успѣетъ ослабить своимъ присутствиемъ паразита въ его культурѣ, вирулентность этого микробы успѣетъ фиксироваться, замкнувшись, какъ-бы въ сумкѣ, въ этихъ тѣльцахъ-зародышахъ. И однако Пастерь не считалъ этого затрудненія непреодолимымъ. Пастерь разсуждалъ слѣдующимъ образомъ: такъ какъ этотъ микробъ, пока онъ находится въ формѣ нитей, совершенно аналогиченъ маленькимъ членникамъ микробы куриной холеры, то надо поставить задачу о воздействиѣ воздуха на сибираязвенный микробъ въ видѣ слѣдующаго вопроса — найти условія способные мѣшать образованію споръ сибираязвенного микробы. Такимъ образомъ, удастся обойти эту трудность, потому что разъ удастся избѣгнуть образованія споръ, тогда уже можно будетъ сибираязвенные нити держать въ соприкосновеніи съ воздухомъ, какое угодно время, и тогда весь опытъ будетъ поставленъ совершенно въ такія-же условія, при какихъ удалось достигнуть ослабленія микробы куриной холеры.

Пастерь и его два помощника вступили на этотъ путь. Дни проходили, число опытовъ увеличивалось; Пастерь дѣлался

все болѣе и болѣе озабоченнымъ, онъ принялъ видъ, который его дочка называла «выраженіемъ, обѣщающимъ близкое открытие».

«О, какъ это было-бы хорошо, если-бы удалось!.. шепталъ онъ вполголоса отъ времени до времени — если-бы только фактъ ослабленія микробы куриной холеры не остался бы одиночнымъ!» Но если кто-нибудь пытался робко его спросить, въ какой фазѣ находятся теперь его опыты, Пастеръ отвѣчалъ: «нѣтъ, я ничего не могу Вамъ сказать, я не осмѣливаюсь громко формулировать все-то, на что я надѣюсь».

Наконецъ, въ одинъ прекрасный день, онъ возвратился изъ лабораторіи съ торжественнымъ видомъ; его радость была такъ велика, что слезы показались у него на глазахъ. Никогда я не видѣлъ лица, столь сильно сияющаго наиболѣе высокимъ и благороднымъ выраженіемъ, на которое только способна человѣческая душа.

«Я быль-бы безутѣшень, — сказалъ онъ, обнимая насъ, — если-бы это столь важное открытие, которое мы теперь дѣляемъ, я и мои помощники, не было-бы французскимъ открытиемъ!»

И съ ясностью, составляющей прелесть этого могучаго ума, онъ намъ рассказалъ о послѣднихъ опытахъ въ своей лабораторіи.

Въ нейтральномъ куриномъ бульонѣ микробъ сибирской язвы не культивируется при 44—45 градусахъ. Напротивъ, онъ очень легко развивается при 42—43 градусахъ и при этихъ условіяхъ микробъ не даетъ зародышевыхъ тѣлецъ, т. е. споръ. Слѣдовательно, возможно держать въ соприкосновеніи съ воздухомъ при температурѣ 42—43 градусовъ культуру питей сибираязвенного паразита, совершенно лишенаго споръ. Черезъ нѣсколько недѣль культура умираетъ, то есть, если пересадить эту культуру въ свѣжій бульонъ, то эта бульонъ остается совершенно бесплоднымъ, стерильнымъ. Но за нѣсколько дней предъ тѣмъ въ культурѣ была жизнь. Если испробовать заразительность этой культуры на животныхъ послѣ двухъ, четырехъ, шести и восьми-дневнаго стоянія въ соприкосновеніи съ

воздухомъ, при вышеуказанной температурѣ, то замѣчаются, что эта культура теряетъ безостановочно свою заразительность пропорціонально времени, и, слѣдовательно, въ эти различныя времена она представляетъ различныя степени ослабленной заразительности. Значитъ, какъ только удалось помѣшать образованію споръ въ сибира-язвенной палочкѣ, все оказывается совершенно сходнымъ сть тѣмъ, что происходитъ съ микробомъ куриной холеры. Кромѣ того, здѣсь опять таки, какъ и при куриной холерѣ, оказывается возможнымъ при помощи культуры воспроизвести всѣ степени этихъ ослабленныхъ вирусовъ. Наконецъ, сибирская язва не рецидивируетъ и каждый изъ этихъ ослабленныхъ сибира-язвенныхъ микробовъ составляетъ вакцину противъ болѣе сильнаго.

Чтобы получить вакцину соотвѣтственной заразительности для каждого отдельнаго вида животныхъ, необходимо испытать эту вакцину на извѣстномъ количествѣ животныхъ этого вида. Если послѣ этихъ опытовъ прививаются этимъ животнымъ самый заразительный вирусъ, и ни одно изъ нихъ не погибаетъ, то это значитъ, что вакцина хороша. Однако, даже между индивидами одного и того-же рода животныхъ восприимчивость къ этому вирусу вообще столь различна, что благоразумнѣе, и даже необходимо, прибѣгнуть къ двумъ предохранительнымъ прививкамъ, съ промежуткомъ въ двѣнадцать или пятнадцать дней; первая прививка слабая, а вторая болѣе сильная.

28 февраля 1881 года Пастеръ сдѣлалъ сообщеніе въ Академіи Наукъ отъ своего имени и отъ имени своихъ сотрудниковъ, въ которомъ изложилъ это великое открытие. Раздался взрывъ апплодисментовъ, въ которомъ выразилась патріотическая радость и гордость. Однако эти результаты были столь чудесны, что нѣкоторые сочлены не могли удержаться, чтобы не сказать: «во всемъ этомъ есть что-то фантастическое». И въ самомъ дѣлѣ, все это напоминало то, что дѣлалъ алхимикъ въ романѣ Лесажа съ чертями, мѣшавшими ему: онъ ихъ заперъ въ маленькихъ стеклянкахъ, хорошо закупоренныхъ и держалъ ихъ такимъ образомъ безвредными въ плѣну. Пастеръ

заключилъ въ колбы цѣлый міръ микробовъ во всѣхъ возможныхъ степеняхъ заразительности, которыхъ онъ культивировалъ по произволу. Все онъ могъ доставить: ослабленную или страшную заразительность, доброкачественную болѣзнь или смертельную. Едва журналы успѣли опубликовать отчетъ объ этомъ сообщеніи, какъ уже президентъ земледѣльческаго общества въ Меленѣ, баронъ де-ла Рошеть, предложилъ Пастеру, отъ имени общества, сдѣлать публичные опыты съ вакцинацией сибирской язвы.

Пастеръ принялъ это предложеніе. 28 апрѣля состоялось какъ-бы соглашеніе между Пастеромъ и вышеупомянутымъ обществомъ. Общество должно было поставить въ распоряженіе Пастера и его двухъ молодыхъ сотрудниковъ, Шамберлана и Ру, шестьдесятъ овецъ. Десять изъ этихъ овецъ не должны были подвергнуться никакому воздействию; двадцать пять должны были подвергнуться двумъ предохранительнымъ прививкамъ, черезъ 12—15 дней одна послѣ другой, двумя вакцинами не одинаковой силы заразительности. Нѣсколько дней послѣ второй прививки эти самыя овцы должны были подвергнуться, одновременно съ двадцатью пятью овцами, не предохраненными, прививкѣ очень заразительной сибирской язвы. Такой-же опытъ долженъ былъ быть сдѣланъ и на десяти коровахъ; шесть изъ нихъ должны были быть вакцинированы, четыре — остаться не вакцинированными, и всѣ десять коровъ должны были по-тому получить въ тотъ-же день, какъ и тѣ 50 овецъ, прививку самого заразительного вируса.

Пастеръ утверждалъ, что двадцать пять овецъ, не подвергавшихся предохранительной прививкѣ, всѣ погибнутъ; что 25 овецъ, вакцинированныхъ, всѣ устоятъ противъ самого заразительного вируса; что шесть коровъ, вакцинированныхъ, не заболѣютъ, тогда какъ четыре коровы, не вакцинированныя, если и не умрутъ, то подвергнутся очень серьезному заболѣванію.

Едва только научная и земледѣльческая пресса опубликовала эту программу и включила въ свои сообщенія и предвищаніе Пастера, какъ многие изъ его собратовъ по Академіи Наукъ,

удивленныхъ его смѣлостью въ такомъ вопросѣ, который былъ до сихъ поръ окружено глубокой тьмой, убоались, какъ-бы Академія не была-бы скомпрометирована этими предвѣщаніями въ такихъ важныхъ вопросахъ физіологии и патологіи, и обратились къ Пастеру съ иѣкоторыми замѣчаніями касательно того, что они назвали научнымъ неблагоразуміемъ.

«Берегитесь, — сказали они ему — Вы вступаете на опасный путь, не обеспечивъ себѣ возможности отступленія! Можетъ быть, Ваши лабораторные опыты не даютъ Вамъ права взяться за такие опыты, какіе Вамъ предстоятъ въ Меленѣ.

— «Безъ сомнѣнія, отвѣтилъ Пастеръ, въ нашихъ лабораторныхъ опытахъ мы никогда не имѣли въ своемъ распоряженіи такого большаго количества животныхъ для прививки, но я все-таки глубоко убѣжденъ въ успѣхѣ. То, что сдѣлано въ моей лабораторіи, гарантируетъ мнѣ достаточно то, что можно сдѣлать».

Булей, будучи также увѣреннымъ въ своемъ знаменитомъ другѣ, повидавшись съ Пастеромъ для того, чтобы присутствовать при этихъ смѣлыхъ опытахъ, сказалъ своимъ беспокоившимся собратамъ по Академіи: «не бойтесь, онъ вернется съ тріумфомъ!»

Опыты начались 5-го мая 1881 года, въ трехъ километрахъ отъ Мелена, на фермѣ общины Пуйли-ле-Фортъ, принадлежавшей ветеринару Росиньолю, главному секретарю земледѣльческаго общества Мелена. По желанію этого общества, одну изъ двадцати пяти овецъ, предназначенныхъ для прививки, замѣстили козою. 5-го мая привили помошью маленькаго працаовскаго ширица, какой употребляется обыкновенно для подкожныхъ впрыскиваний, двадцати четыремъ овцамъ, козѣ и шести коровамъ по пяти капель ослабленнаго сибирие язвенаго вируса. Чрезъ 12 дней, 17 мая, эти 31 животное были опять привиты, но уже вакциной болѣе сильной, чѣмъ предыдущая.

31 мая былъ тотъ день, когда надо было дѣлать прививку самымъ заразительнымъ вирусомъ. Ветеринары, любопытные, земледѣльцы образовали цѣлую толпу вокругъ этого маленькаго стада. 31 животное, предварительно привитыя, ожидали этого страшнаго опыта, стояли рядомъ съ двадцатью пятью овцами,

четырьмя коровами, ожидавшими первой и последней заразительной прививки. По предложению одного ветеринара, маскировавшего свой скептицизмъ желаніемъ дѣлать опытъ болѣе удобо-сравниваемъ, прививали въ перемежку одну овцу вакцинированную и одну невакцинированную. Пастерь назначилъ всѣмъ присутствовавшимъ свиданіе на четвергъ, 2 іюня, то есть черезъ 48 часовъ послѣ прививки спильнаго вируса.

Болѣе двухъ сотъ человѣкъ собралось въ Меленъ. Префектъ Сены и Марны, Патино, сенаторы, генеральныи совѣтники, журналисты, большое число врачей, ветеринаровъ, фермеровъ, тѣ, которые вѣрили, и тѣ, которые сомнѣвались, — всѣ пришли, нетерпѣливо ожидая увидѣть результатъ этого опыта. По прибытии на ферму Пуйли ле-Фортъ, они не могли удержаться отъ крика удивленія: изъ двадцати пяти овецъ, не вакцинированныхъ, двадцать одна была убита сибирской язвой, коза была также мертвая, еще двѣ овцы умирали, а послѣдняя, уже больная, пала въ тотъ же вечеръ, коровы не предохраненныя были, всѣ больны, имѣли громадные отеки на мѣстѣ прививки позади лопатки; лихорадка была у нихъ очень высокая и онѣ на столько были слабы, что не могли Ѣсть. Овцы, подвергшіяся предохранительной прививкѣ, были совершенно здоровы, совершенно веселы; предохраненныя коровы не имѣли никакой припухлости, у нихъ даже не было повышенной температуры и онѣ продолжали спокойно Ѣсть.

Эти результаты, по-истинѣ чудесные, вызвали взрывъ энтузиазма у присутствовавшихъ. Въ особенности, ветеринары, которые съ полнымъ недовѣріемъ относились къ заявлению объ ожидаемыхъ результатахъ по программѣ опытовъ, которые въ своихъ засѣданіяхъ, въ своихъ журналахъ довольно громко заявляли, что трудно повѣрить въ возможность приготовить вакцину, которая могла бы побѣдить такія страшныя болѣзни, какъ куриная холера и сибирская язва, не могли прийти въ себя отъ удивленія. Они всматривались въ мертвыхъ животныхъ, они ощупывали живыхъ.

«Ну,— сказалъ имъ Булей,— убѣдились ли Вы теперь? Вамъ больше не остается, какъ преклониться предъ великимъ учите-

лемъ, — прибавилъ онъ, указывая на Пастера, — и воскликнуть: я вижу, я знаю, я вѣрю, я вразумленъ!

Сдѣлавшись теперь ревностными апостолами этого новаго ученія, ветеринары начали вездѣ разглашать то, что они видѣли. Одинъ изъ числа наиболѣе сомнѣвавшихся довелъ свой прозелитизмъ до того, что пожелалъ вакцинировать себя самого. Этотъ ветеринаръ изъ департамента Іонны привилъ себѣ обѣ вакцины безъ всякихъ болѣзненныхъ послѣдствій, кроме незначительного лихорадочного состоянія. Потребовалось все усиленіе его семьи, чтобы его удержать отъ прививки себѣ самого заразительного вируса.

Со всѣхъ сторонъ началось большое движение, благопріятное вакцинаціямъ. Много земледѣльческихъ обществъ пожелали повторить знаменитый опытъ, имѣвшій мѣсто въ Шуйли-Фортѣ. | Овцеводы одолѣвали Пастера требованіями вакцинъ. Пастеръ долженъ былъ устроить на улицѣ Воакленъ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ своей лабораторіи, маленькую фабрику для приготовленія вакцины. Къ концу 1881 года было уже привито 33946 животныхъ, состоявшихъ изъ 32550 овецъ, 1254 быковъ, и 142 лошадей. Въ 1882 году число вакцинированныхъ животныхъ поднялось до 399102, въ томъ числѣ 47000 быковъ и 2000 лошадей. Въ 1883 году прибавилось еще къ вышеназванному числу болѣе 100 тысячъ животныхъ.

Съ самаго начала практическаго приложенія этого новаго метода хорошия рѣзультаты были общимъ явленіемъ. Въ 1881 году въ стадахъ, на половину вакцинированныхъ и на половину не вакцинированныхъ, — причемъ всѣ животные продолжали жить вмѣстѣ, — смертность отъ сибирской язвы въ вакцинированной половинѣ была въ десять разъ меньше, чѣмъ въ невакцинированной (1 на 740 вмѣсто 1 на 78); а на коровахъ и быкахъ смертность у вакцинированныхъ была въ четырнадцать разъ меньше (1 на 1254 вмѣсто 1 на 88). Въ 1882 году смертность у невакцинированныхъ была также въ десять разъ больше, чѣмъ у вакцинированныхъ.

Въ 1883 году въ первый разъ опредѣлили, что невосприимчивость послѣ вакцинаціи продолжается, вообще говоря,

больше одного года, но что благоразумнѣе вакцинировать ежегодно и что для производства этой операциі лучше выбрать время года, когда сибирская язва еще не развивается: въ мартѣ и апрѣль. Если откладывать вакцинацію до тѣхъ поръ, пока сибирская язва не появится въ стадахъ, то могутъ приписывать нѣсколько лишнихъ случаевъ смерти вакцинаціи, хотя въ сущности это будутъ смертельные случаи отъ натуральной сибирской язвы. Подобно тому какъ вакцинація отъ оспы не предохраняетъ отъ заболѣванія, если человѣкъ уже заразился натуральной оспой, такъ и здѣсь, — вакцинація отъ сибирской язвы не дѣйствительна, если животное находится въ скрытомъ (инкубациопномъ) періодѣ натуральной заразы.

Нельзя возражать, что невозможно сравнивать продолжительность иммунитета у животныхъ отъ вакцинаціи сибирской язвы съ продолжительностью иммунитета противъ оспы, приобрѣтеннаго дженеровской вакцинацией. Джениръ и его современники думали, что вакцина предохраняетъ на всю жизнь. Но уже давно эта иллюзія никѣмъ больше не раздѣляется. Теперь опредѣляютъ продолжительность этого иммунитета и промежутокъ, который долженъ отдѣлять другъ отъ друга каждую ревакцинацію, среднимъ числомъ въ десять лѣтъ,* а для известного числа людей и этотъ промежутокъ еще слишкомъ великъ. Съ другой стороны, не надо упускать изъ виду, что для прививаемыхъ животныхъ, при сужденіи объ иммунитетѣ отъ сибire-язвенныхъ вакцинъ, примѣняется опасный опытъ, состоящій въ прививкѣ имъ сильно заразительного вируса. Надо думать, что не найдется врача, который осмѣлился бы подвергнуть вакцинированного ребенка прививкѣ черной оспы черезъ годъ послѣ вакцинаціи! Наконецъ, если будемъ смотрѣть на этотъ вопросъ съ коммерческой экономической точки зрѣнія, если можно такъ выразиться, то продолжительность жизни овцы не превосходитъ трехъ лѣтъ. Слѣдовательно, иммунитетъ, который она получаетъ отъ предохранительныхъ прививокъ, имѣть силу въ теченіе приблизительно одной трети ихъ жизни.

*.) Этотъ срокъ сокращенъ теперь до пяти лѣтъ.

Объ обратномъ усиленіи заразы.

Послѣ того какъ удалось лишить микробовъ куриной холеры и сибирской язвы всякой заразительности, доведши ихъ до того, что они больше не могли размножаться въ тѣлѣ животныхъ, которымъ ихъ прививали, и послѣ того какъ удалось получить постоянныя культуры всякой степени заразы въ средахъ, удобныхъ для ихъ жизни, — Пастеръ задалъ себѣ вопросъ: возможно ли возвратить сильную смертельную заразительность этимъ микробамъ, болѣе или менѣе ослабленнымъ, доведеннымъ даже до того, что они потеряли всякую степень заразительности, и не возможно ли сдѣлать ихъ опять способными жить и размножаться въ тѣлѣ животныхъ?

Опытъ не замедлилъ отвѣтить на это въ положительномъ смыслѣ. Такой ослабленный сибire-язвенный вирусъ, который не причиняетъ никакой опасности для жизни и здоровья морской свинки въ возрастѣ одного года, нѣсколькихъ мѣсяцевъ или даже нѣсколькихъ недѣль, убиваетъ однако маленькую, только что родившуюся морскую свинку, въ возрастѣ одного или двухъ дней; ослабленный микробъ размножается въ крови такого молодаго животнаго. Можно думать, что у этого едва сформировавшагося существа способность красныхъ кровяныхъ шариковъ удерживать кислородъ еще не на столько сильна, чтобы она могла помѣшать аэробнымъ микробамъ сибирской язвы воспользоваться кислородомъ крови для своей пользы. Болѣзнь вслѣдствіе этого развивается и обусловливаетъ смерть.

Но, вообще говоря, въ томъ фактѣ, что только что родившаяся свинка не такъ устойчива, какъ взрослая, еще ничего нѣтъ удивительнаго. Но всего поразительнѣе — это то, что если перейти отъ однодневной свинки къ старшей, прививая отъ первой второй, потомъ отъ этой второй къ еще болѣе старшой, — третьей, и такъ далѣе, то удается усилить заразительное дѣйствіе микробы, то есть этотъ паразитъ пріобрѣтаетъ опять способность развиваться (акклиматизируется) въ тѣлѣ морской свинки. Обыкновенно говорятъ о растительной или животной

расѣ, проходящихъ разныя мѣстности и послѣдовательная перемѣны отъ одной области въ другую, съ совершенно другими климатическими условіями, — о такихъ расахъ говорятъ, что онѣ постепенно акклиматизировались въ новой мѣстности. Для заразительности микробовъ, производящихъ болѣзни, громадную важность и значеніе имѣть среда, въ которой они развиваются. Подобного рода культурой микроба, переводя его отъ одной свинки къ другой, достигаютъ скоро того, что онъ убиваетъ недѣльную свинку, потомъ — мѣсячную и потомъ — много-лѣтнюю; наконецъ доходить до того, что одна маленькая капля крови этихъ свинокъ достаточна, чтобы убить овцу, а отъ овцы можно уже такой же каплей убить вола.

Тоже самое и съ микробомъ куриной холеры: если онъ такъ ослабленъ, что уже не дѣйствуетъ на курицу, то ему возможно возвратить заразительность, прививая его послѣдовательно очень маленькимъ птицамъ. Чижикъ, канарейка, воробей умираютъ еще отъ этого вируса, если онъ только не очень ослабленъ: можно также употребить для этого и молодыхъ цыплятъ. Такимъ образомъ, удается нѣсколькими послѣдовательными переходами черезъ тѣла этихъ животныхъ достигнуть такой заразительности, которая убиваетъ куръ.

Подобного рода факты внущили Пастеру очень важные и глубокіе выводы: можетъ быть, это самое свойство воздуха ослаблять заразу есть одинъ изъ факторовъ въ источеніи, исчезаніи большихъ эпидемій, и обратно, — способность заразы усиливаться не есть-ли съ своей стороны причина возобновленія и появленія этихъ эпидемій.

«Разсказы, которые я читалъ о произвольномъ появлениі чумы въ Бенгази, въ 1856 и въ 1858 годахъ, — сказалъ нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ Пастеръ, — могутъ служить доказательствомъ, что это появление не можетъ быть отнесено ни къ какому заносу заразы. Предположимъ теперь, на основаніи всѣхъ фактовъ, которые мы теперь знаемъ, что чума, — заразная болѣзнь, свойственная нѣкоторымъ странамъ, — имѣетъ зародыши, долгое время не теряющіе заразительности. Во всѣхъ этихъ странахъ эта зараза въ ослабленномъ видѣ на-

ходится повсюду и готова всегда усилиться, какъ только появятся соотвѣтственные условія климатическая, или голодъ и какое-нибудь бѣдствіе въ этой странѣ. Впрочемъ, это условіе продолжительной устойчивости зародышей заразы не необходимо, потому что, если вѣрить врачамъ, посѣщавшимъ эти страны, во всѣхъ чумныхъ мѣстахъ въ промежуткахъ между большими эпидеміями встречаются случаи не смертельныхъ бубоновъ, сходныхъ съ смертельными чумными бубонами. Нельзя ли предположить, что эти бубоны содержать ослабленную чумную заразу и что эта зараза, попавши въ истощенные организмы, каковыхъ такъ много бываетъ въ голодные годы, можетъ получить обратно свою сильную заразительность?»

«Есть еще другія болѣзни, которыхъ появляются внезапно, какъ напримѣръ — сыпной тифъ. Безъ всякаго сомнѣнія, зародыши микробовъ, вызывающихъ эти болѣзни, распространены повсюду, но въ ослабленномъ состояніи, и въ такомъ состояніи человѣкъ носитъ ихъ на себѣ или въ своемъ кишечникеъ безъ всякой опасности, и только тогда они дѣлаются опасными, когда, по причинѣ скученности, а можетъ быть и вслѣдствіе послѣдовательного развитія этихъ ослабленныхъ микробовъ на поверхностяхъ ранъ и въ тѣлахъ ослабленныхъ разными болѣзнями людей, заразительность этихъ микробовъ возвращается, прогрессивно увеличиваясь».

Этіологія (причины) сибирской язвы.

Такимъ образомъ Пастеръ, со свойственными ему ясностью и точностью, преодолѣлъ всѣ трудности, представлявшіяся сибирской язвой. Но онъ считалъ, что еще одинъ вопросъ остался не выясненнымъ: онъ опредѣлилъ дѣйствіе заразы, онъ нашелъ предохранительный методъ для борьбы съ нею, и онъ пожелалъ послѣ этого узнать причину распространенія этого болѣзни. Откуда появляется сибирская язва? Почему эта болѣзнь появляется въ видѣ эпизоотіи въ нѣкоторыхъ департаментахъ Франціи, въ нѣкоторыхъ областяхъ Россіи, Германіи, Австріи, Ита-

лії, Іспанії, Америки? Какимъ образомъ она поддерживается? Прежде считали, что сибирская язва появляется самопроизвольно отъ различныхъ случайныхъ причинъ. Булей рассказалъ въ своей ученой книгѣ «О прогрессѣ въ медицинѣ», благодаря введенію экспериментального метода», что въ 1842 г. министръ земледѣлія, Гиненъ-Гриденъ, побуждаемый депутатами изъ департаментовъ, страдавшихъ отъ эпизоотіи, возложилъ на профессора ветеринарной школы въ Альфорѣ, Делафона, порученіе поѣхать изучить эту болѣзнь, называющуюся въ простонародѣ «болѣзнью крови», — на мѣстахъ, где она свирѣпствовала, отыскать ея причины и изслѣдоватъ, не зависятъ ли эти причины отъ способа разведенія скота, обычнаго въ этихъ мѣстахъ. Делафонъ пріѣхалъ въ Босъ и былъ пораженъ слѣдующимъ обстоятельствомъ: животныя, пораженные этой болѣзнью, почти все бываютъ молодыя, крѣпкія и жирныя, и вообще именно тѣ, которыхъ подаютъ самыя лучшія надежды хозяину. Связывая это наблюденіе съ плодородіемъ почвы, съ обилиемъ и хорошимъ качествомъ урожая, Делафонъ придумалъ вскорѣ глубокомысленную теорію: «болѣзнь крови, — сказалъ онъ, — ничто иное, какъ полнокровіе; это не больше, какъ избытокъ циркулирующей въ сосудахъ крови, и въ особенности преобладаніе въ этой крови красныхъ шариковъ».

Исходя изъ этой идеи, онъ силился путемъ логики, построить все остальное на этомъ ошибочномъ основаніи. Онъ изслѣдуетъ составъ почвы, онъ указываетъ, изъ чего эта почва состоитъ и отчего она даетъ такие хорошия урожаи, столь ботатые питательными веществами; онъ анализируетъ растенія и связываетъ богатство овецъ Боса кровью съ богатствомъ азотными элементами ихъ пищи; онъ изслѣдуетъ пораженія больныхъ животныхъ и находитъ, что все эти пораженія представляютъ послѣдствіе слишкомъ большого содержанія въ крови органическихъ элементовъ, называемыхъ шариками, фибриномъ и альбуминомъ, и слишкомъ малаго количества содержащейся въ ней воды.

«Уменьшите количество пищи, — писалъ онъ, въ видѣ совѣта, овцеводамъ, — прибавьте корней ко всему тому, что богато азо-

листыми вещами, и вы этимъ соответственно уменьшите число потерь, произведенныхъ обилиемъ слишкомъ питательной пищи, которую вы перекармливаете своихъ животныхъ».

«Вотъ логическое заключеніе, — прибавляетъ Булей, подсмѣиваясь надъ этими наблюденіями, опирающимися на разсужденіяхъ, вместо того чтобы опираться на опытахъ, — вотъ заключеніе, къ которому пришелъ Делафонъ; и чтобы дать еще новое доказательство своей теоріи, Делафонъ указалъ на постепенное уменьшеніе сибирской язвы, по мѣрѣ того какъ приближаешься къ рѣкѣ Луартъ. На правомъ берегу рѣки, напримѣръ въ Солоньѣ, странѣ песчаной, низменной и влажной, сибирская язва не известна. Она мало поражаетъ окружности Жьена, Монтаржи и иѣкоторыя области Орлеана и Шитивьера. Здѣсь почва песчаная, прибавляетъ Делафонъ невозмутимо, и растенія далеко не такъ богаты питательными элементами, какъ на плоскогорье Боса: поэтому и сибирская язва бываетъ здѣсь гораздо рѣже».

Когда подумаешь, что иѣть еще сорока лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ такія вещи писались и ничѣмъ не могли быть опровергнуты, что имъ даже приданъ былъ научный характеръ, то дѣлается очевиднымъ, какой большой шагъ сдѣланъ съ тѣхъ поръ, и можно себѣ дать отчетъ въ томъ, сколько темнаго и неизвѣстнаго разсѣяно яснымъ свѣтомъ экспериментальнаго метода.

Такъ какъ присутствіе паразита въ крови сибира-язвенныхъ животныхъ было доказано въ то время, когда врача въ самоизвѣльное зарожденіе микроскопическихъ существъ была вытѣснена Пастеромъ изъ области положительныхъ фактовъ, то мало-по-малу утвердилась мысль, что животныя, пораженные сибирской язвою, могли получить зародыши этой заразы изъ внѣшняго міра, безъ того чтобы эта болѣзнь могла-бы, такъ сказать, самопроизвольно зародиться. Это мнѣніе подкрѣплялось тѣмъ обстоятельствомъ, что открыли споры сибира-язвенной палочки. Чтобы решить трудный вопросъ о причинѣ заболѣванія этой болѣзни, Пастеръ, при помощи Шамберлана и Ру, устроилъ цѣлый рядъ опытовъ. Первые опыты происходили въ полѣ

одной фермы, находящейся въ деревнѣ Сентъ-Жерменъ, близъ Шартра. Вотъ что они придумали: известное количество овецъ они кормили люцерной, облитой искусственной культурой сибиреязвенной палочки и ея зародышами, т. е. спорами; несмотря на громадное количество съѣденныхъ всѣми предназначенными для этого опыта овцами споръ паразита, многія изъ нихъ однако не умерли, хотя и были очевидно больны. Тѣ, которые умерли, представляли всѣ признаки сибирской язвы, такъ называемой самопроизвольной. Скрытый періодъ болѣзни могъ доходить до восьми или десяти дней, хотя въ послѣдніе дни жизни болѣзнь могла принимать видъ и представлять всѣ симптомы быстротечной формы; въ этихъ послѣднихъ случаяхъ, принимая во вниманіе различіе условій даннаго способа зараженія отъ способа подкожнаго впрыскиванія паразита въ чистомъ видѣ, можно было думать, что скрытый періодъ болѣзни былъ очень короткій.

Но если къ этой, зараженной зародышами паразита, пищѣ примѣшивали колючіе предметы, напримѣръ острые концы листьевъ сухаго чертополоха и, въ особенности, *бородки* колосьевъ ячменя, разрубленныхъ на маленькия части, длиною около сантиметра, то смертность при этихъ условіяхъ значительно увеличивалась. При вскрытии оказывались такія-же пораженія, какія наблюдаются у овецъ, получившихъ сибирскую язву въ стойлѣ или у тѣхъ, которые падаютъ отъ этой болѣзни въ открытомъ полѣ.

Съ тѣхъ поръ предвзятая мысль Пастера и его сотрудниковъ, руководившая ими во время ихъ изслѣдований, укрѣпилась въ нихъ еще больше. Они были убѣждены, что животные, умирающія отъ сибирской язвы въ департаментѣ Эра и Луара, заражались спорами сибири-язвенного микробы, разсѣянными въ ихъ пищѣ. Но откуда взялись эти зародыши?

Такъ какъ всякая мысль о самопроизвольномъ зарожденіи паразита была отброшена, то естественно было обратить вниманіе на тѣ возможныя послѣдствія, которыя могутъ произойти отъ зарыванія труповъ, павшихъ отъ сибирской язвы. Въ большей части случаевъ, когда живодерия отстоитъ далеко или

когда павшее животное не очень цѣнное, напр. овца, то роютъ могилу на мѣстѣ, глубиною отъ полуметра до метра. Если животное пало въ полѣ, его зарываютъ тамъ, где оно пало; если оно умираетъ въ стойлѣ, то его переносятъ на ближайшее къ фермѣ поле и тамъ зарываютъ. Какъ только оно зарыто, начинается его гніеніе. Но такъ какъ гніешіе разрушаетъ всѣ сибире-язвенные пти, то думали, что однимъ зарытіемъ трупа уничтожается возможность распространенія зародышей сибирской язвы. Пастеръ доказалъ, что это мнѣніе основано на поверхностномъ наблюденіи. Если даже животное не разрубается, а цѣликомъ зарывается, то все таки невозможно, чтобы кровь не изливалась вокругъ трупа въ большемъ или меньшемъ количествѣ. Обыкновенно при этой болѣзни во время смерти кровь вытекаетъ изъ ноздрей, изо рта и моча часто бываетъ кровянистая. Вся земля, слѣдовательно, вокругъ трупа запачкана его кровью. Кромѣ того, не надо забывать, что для разрушенія сибире-язвенного микробы и превращенія его въ безвредныя зернышки, отсутствіемъ свободного кислорода, необходимо не сколько дней, а за это время сильно вздувшійся отъ гніенія трупъ даетъ возможность истекать всяkimъ жидкостямъ изънутри наружу черезъ всѣ естественные отверстія; какъ часто еще какой нибудь разрывъ кожи и тканей увеличиваетъ это истеченіе! Кровь и жидкости, смѣшанныя такимъ образомъ съ землею, въ соприкосновеніи съ окружающимъ воздухомъ, уже не находятся въ условіяхъ, удобныхъ для гніенія, — скорѣе въ условіяхъ, похожихъ на культурную среду, въ которой удобно могутъ образоваться споры микробы.

Опытъ подтвердилъ это предположеніе. Прибавляя сибире-язвенную кровь къ землѣ, орошенной дрожжевой водой или мочою при лѣтней температурѣ и при температурѣ, производимой разложеніемъ трупа вокругъ себя въ сметникѣ и навозной кучѣ, Пастеръ замѣчалъ черезъ 24 часа размноженіе сибире-язвенныхъ нитей, внесенныхъ туда кровью, и образованіе изъ нихъ споръ. Эти тѣльца-зародыши, споры, можно было потомъ находить въ ихъ обычномъ состояніи скрытой жизни способными проростать и производить сибирскую язву, не только послѣ не сколькихъ

месяцевъ пребываніи ихъ въ землѣ, но даже послѣ нѣсколькихъ лѣтъ.

Какъ ни интересны были эти опыты, они все таки были не больше какъ лабораторные опыты. Необходимо было изслѣдоватъ, что происходитъ въ открытомъ полѣ, при всѣхъ случайныхъ измѣненіяхъ въ сухости и влажности воздуха и при обработкѣ земли. Тогда Пастеру и его сотрудникамъ пришла счастливая мысль. Они зарыли среди лѣта въ изолированномъ углу одной фермы въ Сентъ-Жерменѣ, около Шартра, овцу, которую они вскрыли и которая пала отъ натуральной сибирской язвы. Черезъ десять мѣсяцевъ, а потомъ черезъ четырнадцать они собрали землю съ этой могилы; поискавши и нашедши въ этой землѣ зародыши сибира-язвенного микроба, они потомъ прививкой этой земли морскимъ свинкамъ вызывали у нихъ сибирскую язву и смерть; и что еще больше заслуживаетъ вниманіе, они находили также эти зародыши въ землѣ, взятой съ поверхности могилы, хотя за все время земля эта не была тронута. Опыты произведены были позже съ землею изъ могиль въ лугахъ Юры, гдѣ были зарыты, на глубинѣ двухъ метровъ, коровы, павшія отъ сибирской язвы. Черезъ два года послѣ зарытія этихъ труповъ удалось также съ поверхности этихъ могиль, послѣдовательнымъ промываніемъ земли, извлечь осадки, дававшіе легко, при прививкѣ, сибирскую язву. Въ три приема, произведенныхъ въ теченіе этихъ двухъ лѣтъ, всякий разъ земля съ поверхности могиль давала сибирскую язву. Напротивъ, земля, взятая изъ мѣстъ, отдаленныхъ отъ могиль, давала отрицательные результаты. Наконецъ, Пастеръ и его два сотрудника доказали, что на поверхности земли, гдѣ зарыты сибира-язвенные трупы, зародыши заразы сохраняются и послѣ всѣхъ процессовъ обработки и жатвы.

Однако спрашивается, какимъ образомъ земля, представляющая такой сильный фильтръ, даетъ возможность подниматься вверхъ зародышамъ микроскопическихъ существъ? Вѣдь здѣсь можно возражать Пастеру его собственными опытами, потому что изслѣдованіями Пастера, сдѣланными раньше, совмѣстно съ Жуберомъ, доказано, что ключевая вода, вытекающая изъ земли

даже изъ очень незначительной глубины, лишена всякихъ зародышей. Однако подобные воды расположены ниже той земли, черезъ которую въ теченіе вѣковъ проходить дождевыя воды, дѣйствіе которыхъ должно было бы способствовать прониканію въ глубь мельчайшихъ частицъ съ поверхности земли въ эти ключи; а эти послѣдніе, несмотря на условія, способствующія ихъ загрязненію, остаются вѣчно въ совершенной чистотѣ. Нужно-ли еще лучшее доказательство, что земля, при извѣстной толщинѣ ея слоя, задерживаетъ мельчайшія твердыя частицы? Однако, при опытахъ съ сибирской язвой оказывается, что микроскопическіе зародыши исходятъ изъ глубины, поднимаются на поверхность земли, то есть въ направленіи, противуположномъ теченію дождевыхъ водъ и еще на довольно значительную высоту! Здѣсь есть какая-то загадка!..

Объясненіе покажется чрезвычайно неожиданнымъ. Дождевые черви оказываются въ данномъ случаѣ разносителями зародышей; это они приносятъ изъ глубины могилъ на поверхность земли этого страшнаго микроба. Въ тѣхъ маленькихъ, тонкихъ цилиндрахъ изъ землянныхъ частичекъ, которая чёрвь выбрасываетъ и отлагаетъ на поверхность земли послѣ утренней росы или послѣ дождя, находятся зародыши сибирской язвы, смѣшанные съ другими зародышами. Легко въ этомъ убѣдиться прямымъ опытомъ: если вложить въ землю червей — смѣшавъ прежде землю съ зародышами сибирской язвы — и черезъ нѣсколько дней вскрыть тѣло червей, со всѣми необходимыми предосторожностями, и извлечь изъ нихъ земляной цилиндрикъ, наполняющей ихъ кишечный каналъ, то тамъ находять въ большомъ количествѣ споры сибирской язвы. Это доказываетъ съ абсолютной точностью, что если рыхлая земля поверхности могилъ сибири-язвенныхъ животныхъ содержитъ зародыши сибирской язвы, иногда въ большомъ количествѣ, то эти зародыши появились изъ маленькихъ цилиндрѣвъ, изверженныхъ червями и распавшихся отъ дѣйствія дождей. Шыль этой распавшейся земли разсѣвается на растеніяхъ на поверхности почвы и такимъ образомъ животная находить на нѣкоторыхъ пастбищахъ и въ нѣкоторыхъ кормовыхъ травахъ зародыши сибирской язвы, кото-

рыми они заражаются. Они въ данномъ случаѣ также заражаются, какъ и въ томъ опытѣ, когда Пастеръ поливалъ жидкой культурою сибира-язвенного микробы пучки люцерны, назначенной для корма овецъ.

«Благодаря этимъ результатамъ, — сказалъ недавно Пастеръ въ Медицинской Академіи, — открывается широкій горизонтъ для мыслящаго изслѣдователя о возможномъ вліяніи земли на происхожденіе болѣзней и обѣ опасности земли кладбищъ.»

«Дождевой червь приноситъ на поверхность земли еще другихъ зародышей, которые, будучи для него также безвредны, какъ и сибира-язвенные споры, могутъ однако быть вредными и болѣзнетворными для другихъ животныхъ. И въ самомъ дѣлѣ, въ червяхъ находятъ всевозможные роды зародышей, и сибира-язвенные всегда смѣшаны съ зародышами гніенія и септицемій.»

«И вотъ теперь — заключилъ Пастеръ свою рѣчь, излагая предъ Академіей общій взглядъ на всю совокупность данныхъ обѣ этіологіи сибирской язвы, — не указанъ ли здѣсь естественный путь для предохраненія отъ этой болѣзни? Необходимо стараться никогда не зарывать сибира-язвенныхъ труповъ въ мѣстахъ, назначенныхъ для сѣнокоса или для выпаса овецъ. Каждый разъ, когда только возможно, необходимо выбирать для такихъ могиль песчаную почву или известковая земли, но очень неплодородныя, не влажныя и легко высыхающія, однимъ — словомъ земли, мало удобныя для жизни дождевыхъ червей. Тиссеранъ, директоръ земледѣлія, замѣтилъ, что сибирская язва неизвѣстна въ области Саваровъ Шампань, хотя они окружены мѣстами сибира-язвеными. Если иногда, благодаря торговымъ сношеніямъ, и заполится туда сибирская язва, то это представляетъ скоропрѣходящую случайность. Не нужно ли отнести этотъ фактъ къ тому, что въ этихъ неплодородныхъ областяхъ, какъ въ поляхъ Шалона напримѣръ, толщина пахатнаго слоя земли не бываетъ больше 15—20-и сотыхъ метра, а подъ этимъ слоемъ находится слой мѣла, въ которомъ червь не можетъ жить? Зарытое въ такой почвѣ сибира-язвенное животное образуетъ массу сибира-язвенныхъ зародышей, но вслѣдствіе отсутствія дождеваго червя, они остаются въ глубинѣ почвы и не приносятъ никакого

вреда. Кроме того, замѣчено, что страны, поражаемыя сибирской язвой, представляютъ почву глинисто-известковую и что, напротивъ, эта болѣзнь неизвѣстна въ мѣстностяхъ съ сланцевой и гранитной почвой. Различіе въ отношеніи къ заболѣванію этой болѣзнью, въ зависимости отъ состава почвы, замѣчается иногда въ департаментѣ Аveyronъ, направо и налево отъ какой-нибудь дороги или какой-нибудь рѣки.

Не имѣемъ ли мы теперь права сказать, что если скотоводы захотятъ, то сибирская язва станетъ являться только въ видѣ рѣдкой случайности на ихъ животныхъ, на ихъ пастухахъ, у ихъ мясниковъ и у кожевниковъ, такъ какъ сибирская язва животныхъ и злоказнеченный прыщъ людей никогда не появляются самопроизвольно, они существуютъ тамъ, где ихъ помѣстили и где зародыши ихъ разсѣяны безсознательнымъ соучастіемъ дождевыхъ червей?

Съ другой стороны, успѣхъ предохранительныхъ прививокъ даетъ еще шансы для исчезновенія язвы, потому что эта предохранительная мѣра, если она получить достаточно большое распространеніе, — въ чемъ нельзѧ сомнѣваться — можетъ довести до того, что народятся расы домашнихъ животныхъ, у которыхъ предки были вакцинированы и которыя слѣдовательно, болѣе устойчивы по отношенію къ смертельной формѣ этой болѣзни. Эти расы животныхъ будутъ въ такомъ-же положеніи относительно сибирской язвы, въ какомъ мы сами находимся по отношенію къ осѣ. Хорошо извѣстенъ фактъ, что оспа въ наше время гораздо меньше опустошаетъ населеніе, чѣмъ во время ея появленія въ Европѣ. Трудно не приписать этого явленія, по крайней мѣрѣ отчасти, распространенію осоприживанія. Въ тѣхъ странахъ, куда оспа заносится въ первый разъ, она производитъ значительные опустошенія. Несколько мѣсяцевъ тому назадъ въ Парижѣ былъ случай, довольно знаменательный съ этой точки зрѣнія: цѣлая семья эскимосовъ погибла отъ оспы въ зоологическомъ саду; эти эскимосы не были вакцинированы, какъ и всѣ ихъ предки, они были новичками въ отношеніи оспенной заразы, которая никого, кроме ихъ, не поразила.

Способъ спора и возраженія.

Всякое новое открытие вызываетъ перемѣну въ общихъ взглядахъ, которую одни съ радостью принимаютъ, противъ которой возстаютъ другіе въ виду того, что она разстраиваетъ ихъ привычныя мнѣнія и сужденія: она, кромѣ того, разстраиваетъ надежды тѣхъ, которые преслѣдовали задачу, въ нѣкоторой степени сходную съ разрѣшенною. Часто они тогда вымешаютъ свое запозданіе отрицаніемъ провозглашеннай истины. Великій фактъ ослабленія ядовъ, искусственное приготовленіе вакцинъ куриной холеры и сибирской язвы, важность ихъ примѣненія для предохранія животныхъ отъ этихъ болѣзней — все это вызвало во всемъ мірѣ такое удивленіе и энтузіазмъ, которые пристрастные критики постарались тотчасъ уменьшить. Самые живые нападки явились изъ Германіи. Вскорѣ послѣ триумфа Пастера на Лондонскомъ Международномъ Медицинскомъ Конгрессѣ въ 1881 г., нѣмецкій докторъ Кохъ и его сотрудники, Гафки и Лефлеръ, помѣстили въ «Сборникѣ Высшаго Германскаго Санитарнаго Учрежденія» нѣчто въ родѣ научнаго обвинительнаго акта противъ открытія вакцинъ и возможности ихъ примѣненія въ большихъ размѣрахъ въ практикѣ скотоводства.

«Ослабленіе заразъ!.. — сказалъ на Лондонскомъ Конгрессѣ докторъ Кохъ одному французскому врачу — Это слишкомъ хорошо, чтобы быть вѣрнымъ!» Такимъ образомъ, Кохомъ и его учениками все было подвергнуто сомнѣнію. Пастеръ вначалѣ далъ потоку свободно литься. Затѣмъ, не будучи изъ числа тѣхъ, которые отступаютъ передъ противникомъ, онъ себѣ сказалъ: «отразить нападки нѣмецкихъ ученыхъ слѣдуетъ въ самомъ Берлинѣ». Получая постоянно изъ разныхъ мѣстъ Германіи просьбы о высылкѣ вакцины сибирской язвы, Пастеръ отвѣтилъ, что въ виду того, что открытие формальнымъ образомъ отрицается въ Пруссіи, было бы полезно, прежде чѣмъ высылать вакцину, произвести большой доказательный опытъ, подобный произведеному въ Пульи-ле-Форѣ.

Директоръ ветеринарной школы въ Берлинѣ, докторъ Роловъ, поспѣшилъ взять на себя ходатайство предъ германскимъ министромъ земледѣлія. Послѣдній тотчасъ назначилъ комиссию, которой поручено было прослѣдить опытъ вакцинаціи и сдѣлать докладъ германскому правительству. Тогда Пастеръ поручилъ одному изъ своихъ новыхъ сотрудниковъ отправиться руководить предохранительными прививками. Этотъ сотрудникъ былъ Луи Тюлье. Съ тихою и глубокою радостью онъ принялъ предложеніе отправиться руководить опытами туда, гдѣ не вѣрили французскому открытию. Онъ на все былъ готовъ, этотъ доблестный Тюлье, которому суждено было умереть ради науки, въ цвѣтѣ лѣтъ, съ полною надеждою на славу! Его мужество было также велико и также молчаливо, какъ его трудолюбіе. Часто онъ проводилъ въ лабораторіи цѣлые дни и недѣли, не произнося ни слова, наклоненный безпрестанно надъ микроскопомъ, стараясь съ упорною страстью изучить все, что изучалъ Пастеръ, гордый тѣмъ, что жилъ вблизи своего знаменитаго учителя, счастливый тѣмъ, что чувствовалъ себя его ученикомъ и имъ любимымъ, почти какъ родной сынъ. Какую пустоту онъ оставилъ за собою въ лабораторіи и какое мѣсто онъ занялъ бы въ науцѣ!

Составъ нѣмецкой комиссіи, предсѣдателемъ которой былъ Бейеръ, членъ высшаго правительственнаго совѣта, свидѣтельствовалъ о тотъ важномъ значеніи, которое Германія придавала ознакомленію съ французскимъ открытиемъ. Въ числѣ членовъ находился также знаменитый профессоръ Вирховъ.

Опыты производились въ помѣстїи Пакишъ. Протоколы и доклады комиссіи не оставляли никакого сомнѣнія въ точности фактовъ, заявленныхъ Пастеромъ. Однако въ виду того, что возраженія Коха и его сотрудниковъ не относились единственно только къ профилактике сибирской язвы, Пастеръ не удовольствовался этимъ первымъ успѣхомъ. Онъ искалъ новаго случая убѣдить своихъ противниковъ. Случай этотъ представился въ сентябрѣ мѣсяца 1882 года, когда былъ созванъ международный гигієническій Конгрессъ въ Женевѣ. Пастеръ отправился туда, надѣясь встрѣтить на засѣданіяхъ доктора Коха. Его

ожиданіе оправдалось: Кохъ былъ тамъ, окруженный своими учениками. Пастеръ съ высоты трибуны Конгресса опровергъ критику, раскрылъ ошибки Коха и пригласилъ его вступить въ споръ передъ компетентными судьями.*) Громъ рукоплесканій покрылъ эти слова и всѣ ожидали отвѣта доктора Коха. Но Кохъ отклонилъ всякий споръ, сказавъ, что онъ оставляетъ за собою заботу и время отвѣтить путемъ печати.

Кохъ послѣ трехъ мѣсяцевъ опубликовалъ маленькую брошюру; эти три мѣсяца принесли свои плоды. Открытие ослабленныхъ заразъ, которое подверглось столь рѣзкимъ нападкамъ въ «Сборнике санитарного учрежденія» годъ тому назадъ, Кохъ теперь признавалъ перворазряднымъ научнымъ открытиемъ. Но, не желая отказаться слишкомъ явно отъ своего прежняго мнѣнія, онъ продолжалъ нападать на это открытие, отрицая его пользу въ сельско-хозяйственной практикѣ.

Этотъ способъ спора, открытый и прямой, способъ, прямо ведущій къ цѣли, — Пастеръ примѣнялъ всю свою жизнь.

«Возраженія, — сказалъ онъ мнѣ однажды, прогуливаясь въ саду Нормальной Школы, гдѣ онъ прогуливается не болѣе трехъ или четырехъ разъ въ году, — не мѣшаютъ истинѣ обнаружиться, но на миговеніе они останавливаютъ ея шествіе, и вотъ почему слѣдуетъ побѣждать тѣ легкія препятствія, которыя ее стѣсняютъ и замедляютъ. Нѣть такихъ научныхъ споровъ, которые были-бы подобны политическимъ спорамъ, гдѣ подчасъ трудно представить доказательства, — прибавилъ онъ съ улыбкою. Въ естественныхъ наукахъ, напротивъ, научная доктрина должна быть основана на совокупности результатовъ, наблюдений и опытовъ. Если на эту доктрину нападаютъ, то рѣдко бываетъ невозможно найти доказательства ея вѣрности или ошибочности въ нѣкоторыхъ рѣшительныхъ фактахъ, которые, если она вѣрна, согласуются съ ея сущностью, а если она ошибочна, явно съ нею несовмѣстимы. Большею частью даже одинъ, удачно подобранный, фактъ достаточенъ, чтобы опровергнуть или подтвердить такую доктрину».

*) См. Приложеніе.

И прослѣдивъ мысленно всѣ изслѣдованія, которыхъ въ теченіе сорока лѣтъ занимали его жизнь, Пастеръ припомнилъ всѣ споры, которые ему пришлось поддержать: ему приходилось сильно защищаться не только противъ Пуше и Жоли по поводу вопроса о самопроизвольномъ зарожденіи, противъ Либиха по вопросу о броженіяхъ, противъ нѣмцевъ и итальянцевъ по вопросу объ ослабленныхъ заразахъ. Почти не было ни одного высказаннаго имъ мнѣнія, которое не вызвало бы горячихъ споровъ, которые онъ, уставши отъ противорѣчившихъ преній, заканчивалъ безразлично тѣмъ, что переносилъ эти споры въ полномочную комиссію, настойчиво требуя, чтобы она рѣшила споръ и произнесла рѣшительный приговоръ.

Иногда развязка спора принимала довольно забавный характеръ. Когда, напримѣръ, Пастеръ заявилъ медицинской Академіи объ опытѣ съ курицею, заболѣвшою сибирской язвою при условіи охлажденія послѣ прививки, то одинъ профессоръ Альфорской школы, Коленъ, поспѣшилъ отвергнуть этотъ фактъ. Во время засѣданія, Пастеръ потребовалъ назначенія комиссіи, къ которой онъ просилъ Академію присоединить также его и его противника. Это происходило во вторникъ, въ день засѣданія Академіи. Въ слѣдующую субботу, въ присутствіи всѣхъ членовъ комиссіи, Пастеръ принесъ трехъ куръ, умершихъ отъ сибирской язвы. Коленъ самъ сдѣлалъ вскрытие и всѣ могли убѣдиться, что кровь была переполнена палочками сибири-язвенаго паразита. Протоколъ былъ составленъ и подписанъ всѣми членами комиссіи. Коленъ былъ обязанъ подписатьсь въ свою очередь. Въ слѣдующій вторникъ этотъ протоколъ былъ читанъ въ засѣданіи Академіи. Чтобы нѣсколько прикрыть свое затруднительное отступленіе, Коленъ заявилъ, что куры не потому заболѣли сибирской язвою, что были охлаждены, а потому, что имъ, этимъ несчастнымъ птицамъ, привязали крылья и лапки къ доскѣ для того, чтобы держать ихъ въ водѣ.

Это сантиментальное возраженіе падаетъ передъ сравнительными опытами, сдѣланными съ курами, подобнымъ-же образомъ связанными и привитыми, но не охлажденными. Эти послѣднія никогда не заболѣвали сибирской язвою.

Нѣсколько дней спустя — это происходило въ Академіи Наукъ — Пастеръ, неожиданно пораженный однимъ посмертнымъ сочиненiemъ Клода Бернара, долженъ былъ еще обратиться къ Академіи, дѣлая ее судью въ другомъ вопросѣ, внезапно поднятомъ. Въ бумагахъ Клода Бернара найденъ былъ цѣлый рядъ опытовъ, имѣвшихъ цѣлью — не болѣе и не менѣе, какъ освятить новую систему самопроизвольного зарожденія виноградныхъ дрожжей, приводящихъ въ броженіе виноградный сокъ.


«Я отправляюсь на Юру, сказалъ Пастеръ. Посреди моего виноградника, который имѣеть съ дюжину квадратныхъ метровъ — прибавилъ онъ съ нѣкоторою гордостью — я охвачу стѣнками импровизированной оранжереи нѣсколько виноградныхъ лозъ, которыя будутъ продолжать жить и нести созрѣвающіе грозди. Мы теперь — въ юлѣ мѣсяцѣ: въ это время года, ни на зеленыхъ зернахъ винограда, ни на кистахъ, ни на листьяхъ виноградчика не существуетъ — какъ я это уже выяснилъ и опубликовалъ — зародышей клѣтокъ, составляющихъ ферментъ винограда въ винодѣльныхъ чанахъ. Подъ оранжерею я накрою кисти запертыхъ виноградныхъ лозъ слоемъ фламбированной ваты, т. е. ваты, подвергшейся температурѣ въ 150 градусовъ. Совершивши всѣ эти операциіи, я возвращусь въ Парижъ, имѣя въ карманѣ ключи отъ оранжереи, и возвращусь на Юру во время винограднаго сбора, въ первые дни октября мѣсяца. Напередъ заявляю Академіи, что кисти, которыя созрѣютъ, прикрыты ватою, подъ оранжерею, могутъ быть раздавлены въ соприкосновеніи съ чистымъ воздухомъ и сокъ, который при этомъ получится, не подвергнется броженію».

Это пророчество сбылось. Въ октябрѣ Пастеръ прибылъ на Юру, срѣзаль нѣсколько этихъ лозъ, покрытыхъ вполнѣ созрѣвшими кистями винограда, тщательно ихъ снялъ, съ ними же уѣхалъ обратно въ Парижъ, при чемъ былъ все время стѣсненъ тѣмъ обстоятельствомъ, что затруднительно было держать лозы стоймя, чтобы онъ не смялись. Наконецъ, онъ имѣлъ счастье доставить эти кисти неповрежденными въ бюро Академіи Наукъ. Онъ тогда предложилъ Бертело, опубликовавшему сочиненіе Клода Бернара, а также всѣмъ сотоварищамъ, сорвать

съ этихъ лозъ столько кистей, сколько имъ вздумается. «Раздавите ихъ въ соприкосновеніи съ чистымъ воздухомъ — сказалъ онъ имъ — и я готовъ биться объ закладъ, что вы не получите броженія!»

И сколько было еще случаевъ, когда Пастеръ долженъ былъ такимъ образомъ возвращаться къ прежде добытымъ фактамъ! Это не только случалось въ Академіи Наукъ, но также въ Медицинской Академіи, гдѣ восьмидесятилѣтній Жюль Геренъ послалъ ему, въ видѣ послѣдняго научнаго отвѣта, вызовъ на дуэль! Если въ манерѣ, съ которой Пастеръ защищалъ свое дѣло, и проявлялась иногда нѣкоторая страстность, то она зависѣла отъ воодушевлявшей его страсти къ истинѣ, отъ жгучаго желанія убѣдить, придававшаго его дрожащему голосу эти звуки, эти восклицанія, эти вызовы. Онъ не терпѣлъ нападокъ на свои работы не изъ гордости — никто не отличается такою скромностью, какъ онъ — по будущи раздражень, слыша, какъ отрицаются положительные факты, въ которыхъ онъ тысячу разъ былъ убѣжденъ и въ которыхъ весь свѣтъ могъ убѣдиться. Но кто еще въ настоящее время думаетъ объ этихъ спорахъ? Время ушло, оппозиція пала. Тѣ благодѣянія, которые принесли его открытія, Пастеръ могъ видѣть повсюду. Во Франції, какъ и заграницею, со всѣхъ сторонъ ему представляли знаки удивленія и признательности, подобно тому какъ человѣчество ихъ обыкновенно оказываетъ тѣмъ, которымъ прощается гениальность въ виду ихъ смерти.

Промышленность и сельское хозяйство ему обязаны столькими источниками богатства, что ученый англійскій профессоръ Гексли могъ сказать: «Открытия Пастера, сами по себѣ, достаточны, чтобы покрыть военную контрибуцію въ пять миллиардовъ, уплаченныхъ Германіи Францію». Его изслѣдованія о заразительныхъ болѣзняхъ открыли для медицины безграничныя надежды на предохраненіе отъ болѣзней. Но на все то, что онъ совершилъ великаго, можно-бы почти сказать чудеснаго, Пастеръ смотритъ, какъ на простое начало. «Вы увидите, — говоритъ онъ часто, — какъ это со временемъ разрастется. Ахъ, если бы у меня было еще время!..»



Лабораторія Пастера въ Нормальной Школѣ.

Предметы изслѣдований. — Бѣшенство.

Прошло то время, когда министръ сказалъ Пастеру, что нѣтъ въ бюджетѣ 1500 франковъ для его лабораторії: на науку теперь обращаютъ больше вниманія! Теперь ей нечего жаловаться, она въ большомъ почетѣ; зданія, предназначенные для нея, становятся похожими на дворцы. Бюджетъ ея ростетъ очень быстро, она теперь достаточно богата, чтобы оплачивать стоимость изслѣдований. На долю лабораторії Пастера приходится значительная часть этихъ щедротъ государства. Муниципальный совѣтъ Парижа предоставилъ даже въ пользу лабораторії громадныя угодья. Старый садъ стараго колледжа Ролена отданъ въ распоряженіе Пастера, который успѣшилъ устроить тамъ конюшни для помѣщенія лошадей, больныхъ сапомъ, разнаго рода помѣщенія для сибира-язвенныхъ овецъ и пасарю, гдѣ помѣщаются собаки, больныя бѣшенствомъ. Но хотя Пастеръ и пользуется этимъ подареннымъ помѣщеніемъ, онъ однако сохранилъ для себя въ подвалѣ своей лабораторіи, на улицѣ Ульмѣ, цѣлый міръ животныхъ для опытовъ. Изолированныя, въ круглыхъ клѣткахъ и почти безопасныя — помѣщены бѣшеные собаки: однѣ, пораженныя буйной формой, кусаются перекладины клѣтокъ, глottаютъ сѣно, издаются свой жалобный лай, который трудно забыть, услышавши его разъ; другія, нося въ себѣ зародыши этой страшной болѣзни, ласкаются еще съ кроткимъ и нѣжнымъ взглядомъ, какъ бы ищущимъ ласки. Куры и цыплята высовываютъ свои головы между перекладинами деревянныхъ клѣтокъ. Отъ времени до времени, пѣтухъ поетъ изъ глубины погреба свою пѣсню. Кролики безучастно їдятъ, а маленькая семья морскихъ свинокъ скучиваются вмѣстѣ и издаются, при малѣйшей тревогѣ, свой боязливый пискъ. Весь этотъ міръ предназначенъ для будущихъ прививокъ. Каждое утро дѣлается обзоръ этому маленькому госпиталю изъ приговоренныхъ животныхъ. Мертвыхъ

удаляютъ и уносятъ наверхъ, въ одну изъ залъ, гдѣ они кладутся на столъ для вскрытия.

На такихъ же столахъ лежать и живыя животныя, предназначенные для опытовъ. Невозможно удержаться отъ выражения жалости, когда подходишь къ собакѣ совершенно здоровой, предназначенной для кровавой операции, лежащей со связанными ногами, съ растеряннымъ взглядомъ, въ то время какъ все тѣло ея дрожитъ отъ страха и ужаса. Но стоитъ только разъ войти въ физиологическую лабораторію, чтобы научиться смотрѣть на вивисекцію съ надлежащей точки зрѣнія, чтобы понять необходимость живосѣченія для науки и тѣ результаты, которые оно даетъ для блага человѣчества. Впрочемъ, въ лабораторіи Пастера всякая собака, предназначенная для вивисекціи, предварительно хлороформируется. Полемика, поднятая по поводу вивисекціи, зависитъ отъ того, что публика смотрѣтъ на это только съ точки зрѣнія страданія и мученія животныхъ, тогда какъ на все это надо преимущественно, смотрѣть, какъ на решеніе задачи. Развѣ удалось бы английскому физиологу Гарвею открыть кровеобращеніе, еслибы онъ не дѣлалъ вивисекціи надъ ланами парка короля Карла I-го? Развѣ Клодъ Бернаръ могъ бы доказать гликогенную функцию печени безъ вивисекціи? Если бы Пастеръ не пожертвовалъ нѣсколькими курами и овцами, могъ-ли бы онъ открыть научный фактъ громадной важности — ослабленіе заразы? Что значитъ потеря пятисотъ собакъ, если удастся открыть причину бѣшенства, средство предохраненія отъ нея и спасеніе человѣчества отъ этого ужаснаго бича?!

Пастеръ дѣлалъ однажды, предъ многочисленнымъ собраниемъ, опытъ съ кислородомъ воздуха. Онъ положилъ подъ колокольчику, которая, по истеченіи известнаго времени, когда весь кислородъ воздуха подъ колоколомъ былъ ею употребленъ, вся вздулась, открывала клювъ и закрывала глаза, какъ птица, готовящаяся умереть. Пастеръ ввелъ тогда подъ этотъ же колоколь второго воробья, который, попавши сразу, безъ постепенного перехода, изъ обыкновенного воздуха подъ этотъ колоколь, сейчасъ-же, упалъ задохшись. Крикъ ужаса вырвался у аудиторіи, какъ выраженіе общей жалости. Тогда Пастеръ, вынувши

въ это время изъ подъ колокола первого воробья, который счастливо отдался и мало-по-малу началъ оживать, обратился къ публикѣ и сказалъ:

«Никогда я не имѣлъ смѣлости убить птицу на охотѣ, но, когда дѣло идетъ объ опытѣ, я никогда не останавливаюсь никакой щепетильностью: наука имѣетъ право на такія жертвы, въ виду важности ея цѣлей.»

Всѣ животныя лабораторіи, начиная отъ маленькихъ бѣлыхъ мышей, прячущихся въ ватѣ, до собакъ, воющихъ бѣшенно въ своихъ желѣзныхъ клѣткахъ, обречены на смерть. Но это не единственные гости лабораторіи, попадающіе ежедневно на операционный столъ и на столъ для вскрытия. Изъ разныхъ мѣстъ Франціи присылаютъ часто Пастеру корзины, полныя курами, павшими отъ куриной холеры или отъ другой какой-нибудь болѣзни. Вотъ лежитъ большая корзина, упакованная соломой: она заключаетъ въ себѣ трупъ свиньи, умершей отъ краснухи; вотъ здѣсь лежитъ кусокъ легкаго, присланный въ ящикѣ изъ бѣлой жести: это — отъ коровы, павшей отъ перипневмоніи. Другія посылки еще болѣе цѣнны. Съ тѣхъ поръ, какъ стало известно, что Пастеръ поджидалъ въ Пойла года два тому назадъ судно, которое должно было вести пассажировъ, больныхъ желтой лихорадкой, онъ началъ получать, по временамъ, изъ очень отдаленныхъ странъ почтенные дозы черной рвоты въ бутылкахъ.

Вездѣ, на всѣхъ рабочихъ столахъ, видны только трубочки, наполненные кровью, пластинки съ разными капельками жидкостей. Въ согрѣвателныхъ шкафахъ расположены въ рядъ колбы съ культурами, похожія на фланончики съ ликерами. Конецъ иголки, погруженной въ одинъ изъ этихъ фланоновъ, можетъ убить животное. Заключенные въ своихъ стеклянныхъ темницахъ, живутъ и размножаются миллионы и миллионы микробовъ...

Эта лабораторія изслѣдований и открытій представляетъ по-истинѣ любопытное зрѣлище. Сколько предметовъ изучается здѣсь и съ какой горячностью, и вмѣстѣ съ тѣмъ терпѣніемъ, Пастеръ изслѣдуется столько различныхъ вопросовъ. Онъ примѣнялъ свою теорію зародышей не только для объясненія самыхъ

страшныхъ болѣзней, но пожелалъ распространить ее и на нѣкоторыя обыкновенныя болѣзни. Все составляетъ для него предметъ изслѣдованій. Въ маѣ 1879 года одинъ изъ работавшихъ въ лабораторіи страдалъ множественными чирьями, повторявшимися у него, какъ это часто бываетъ, черезъ короткіе промежутки, то на одномъ мѣстѣ тѣла, то на другомъ. Пастеръ, занятый постоянно мыслью о роли микроскопическихъ организмовъ, спросилъ себя, не содержитъ ли гной фурункуловъ какого-нибудь паразита, присутствіе и развитіе котораго, а также случайное перенесеніе его, то въ одну часть тѣла, то въ другую, послѣ того какъ онъ уже попадъ въ организмъ, обусловливаетъ мѣстное воспаленіе, образованіе гноя, и объясняетъ возвраты болѣзни.

Гной изъ одного фурункула на затылкѣ былъ собранъ со всей необходимой чистотой; черезъ нѣсколько дней собрали гной изъ другаго фурункула, потомъ изъ третьяго. Гной, или кровянистая лимфа, взятая изъ краснаго возвышенія чирья передъ появленіемъ гноя, были посыпаны въ стерилизованномъ бульонѣ, и каждый разъ при этомъ замѣчалось развитіе микробы, состоящаго изъ маленькихъ сферическихъ точекъ, связанныхъ попарно и лежащихъ часто въ видѣ маленькихъ кучекъ. Жидкостью для культуры служилъ то куриный бульонъ, то бульонъ изъ пивныхъ дрожжей; въ бульонѣ изъ пивныхъ дрожжей парный микробъ развивался во всей жидкости и дѣлалъ ее всю равномерно мутной. Въ куриномъ же бульонѣ парный микробъ, соединяясь въ маленькия кучки, осѣдалъ у стѣнокъ сосуда, и жидкость оставалась прозрачной, если ее не взбалтывали.

Новые наблюденія были сдѣланы надъ фурункулами большого, присланного къ Пастеру докторомъ Морисомъ Реньо. Тотъ же самый паразитъ, безъ всякой примѣси какого-нибудь другаго микробы, былъ найденъ и въ этомъ случаѣ. Еще одно изслѣдованіе было сдѣлано на женщинѣ изъ госпиталя Ларибуазьера: у этой женщины вся спина была покрыта чирьями и результатъ изслѣдованія былъ тотъ-же. Такимъ образомъ, казалось установленнымъ, что всякий фурункуль содержитъ микроскопической паразитъ аэробный и что этому микробу необходимо приписать

образование местного воспаления, вызывающего последовательно образование гноя.

Если привить подъ кожу морской свинки или кролику жидкость изъ такой культуры, то этимъ вызывается образование небольшихъ нарывовъ, исчезающихъ довольно быстро. Пока эти нарывы не совсѣмъ зажили, можно извлечь изъ нихъ тотъ-же организмъ, который ихъ произвелъ. Если искать въ крови общаго кровеобращенія этого маленькаго паразита у лицъ, страдающихъ фурункулами, то его тамъ не находятъ: причина этого состоитъ, вѣроятно, въ томъ, что аэробный паразитъ вообще очень трудно развивается въ крови. Красные кровяные шарики удерживаютъ у себя и неохотно уступаютъ стороннему организму кислородъ, который имъ самимъ нуженъ: проходитъ борьба за существование — и въ борьбѣ противъ паразита фурункула побѣда остается за красными шариками. Можно было-бы думать, что маленький организмъ фурункула не существуетъ въ крови, но если возможно было-бы взять для культуры не одну каплю крови, а нѣсколько грамовъ ея, тогда, безъ сомнѣнія, удалось-бы получить плодородныя культуры. Маленький паразитъ долженъ циркулировать въ то или другое время въ крови и переноситься отъ одного фурункула, гдѣ онъ развивался, въ другое место тѣла, гдѣ онъ случайно остается, культивируется и образуетъ новый фурункулъ. «Желательно было-бы, сказалъ Пастеръ, чтобы больной согласился на много уколовъ въ различныхъ мѣстахъ тѣла, отдаленныхъ отъ зрѣлаго или созрѣвающаго фурункула, для того чтобы можно было дѣлать множество культуръ изъ крови общаго кровеобращенія. Я убѣжденъ, прибавилъ онъ, что такимъ образомъ удалось бы достигнуть плодородныхъ посѣвовъ этого организма въ культурахъ».

Въ то время, когда докторъ Морисъ Реньо доставилъ въ распоряженіе Пастера случай съ фурункулами, докторъ Ланелонгъ далъ Пастеру возможность изучить одну очень тяжелую форму болѣзни костей и костного мозга, которую называютъ остеоміэлитомъ. Въ февралѣ, 1880 года, этотъ известный хирургъ, написавшій очень цѣпную работу объ остеоміэлите и о возможности излеченія этой болѣзни трепапацией кости съ по-

слѣдовательнымъ антисептическимъ промываніемъ и повязкой, повелъ Пастера въ госпиталь Труссо. Молодая двѣнадцати-лѣтняя дѣвочка, страдавшая этой ужасной болѣзнью, должна была быть оперирована. Правое колѣно было сильно припухшее, также какъ и вся голень, до области надъ ладыжками, и часть бедра надъ колѣномъ. Захлороформировавши больную, докторъ Ланелонгъ сдѣлалъ ниже колѣна большой разрѣзъ, изъ кото-раго вытекло громадное количество гноя. Вскрытая большебер-цовая кость оказалась на большомъ протяженіи обнаженной отъ надкостной плевы. Три отверстія были сдѣланы трепаномъ на этой кости. Изъ каждого изъ этихъ отверстій гной выте-каль въ большомъ количествѣ. Пастеръ собралъ гной изъ на-ружной поверхности кости и изнутри, со всѣми необходимыми предосторожностями относительно чистоты, и понесъ этотъ гной въ свою лабораторію, гдѣ онъ внимательно изслѣдовалъ его. Прямое изслѣдованіе этихъ двухъ пробъ гноя подъ микроско-помъ дало чрезвычайно интересные результаты. Было ясно, что-этотъ гной содержить въ большомъ количествѣ микроорганизмъ, подобный паразиту фурункула, состоящей изъ соединенныхъ по-парно или по четыре зерна и изъ кучекъ этихъ зеренъ; одни изъ нихъ — съ ясными и рѣзкими контурами, а другія — едва видимыя, съ блѣдными контурами. Наружный гной содержалъ большое количество гнойныхъ шариковъ, гной-же изнутри не содержалъ ихъ. Этотъ послѣдній представлялъ какъ-бы тѣсто, все состоящее изъ микробовъ, напоминающее кучу псороспер-мій; микробы были до такой степени многочисленны и до того были молоды и находились въ періодѣ жизни и размноженія, что, посѣянные въ культурныхъ жидкостяхъ, они начали разви-ваться меньше, чѣмъ черезъ шесть часовъ и уже становилось замѣтнымъ для невооруженного глаза общее, хотя и незначи-тельное, помутнѣніе жидкости. Сходство его съ микроорганиз-момъ чирья было до такой степени велико, что можно было бы признать тождественность этихъ двухъ организмовъ, если-бы не было известно, какъ различны могутъ быть физиологическіи свойства микроскопическихъ паразитовъ, имѣющихъ одинаковый видъ и одинаковую величину.

I.

По мѣрѣ того какъ Пастеръ все дальше и дальше углублялся въ вышеописанныя изслѣдованія, онъ встрѣчалъ въ Медицинской Академіи сотоварищей, которые, живо заинтересованные этими изслѣдованіями, приняли въ нихъ большое участіе. Такъ, напримѣръ, Виллеменъ, главный врачъ Валь-де-Граса, доказавшій съ такой проницательностью заразительность чахотки (буторчатки), никогда не пропускалъ случая во время эпидеміи тифа, свирѣпствовавшей въ Парижѣ года два тому назадъ, чтобы ни дать знать Пастеру, который самъ лично собиралъ кровь для изслѣдованія отъ каждого тифознаго трупа. Сколько пробъ крови было взято въ пробиркахъ и сколько еще безплодныхъ попытокъ культивировать было сдѣлано для отысканія причины этой болѣзни, поражающей столько жертвъ! Докторъ Герье обратилъ вниманіе Пастера на другую болѣзнь, поражающую большое количество женщинъ, а именно — послѣродовую горячку. Пастеръ отправился въ отдѣленіе доктора Герье въ Матернитѣ (родильный домъ) осмотрѣть женщину, родившую нѣсколько дней тому назадъ и страдавшую послѣродовой горячкой. Изъ указательного пальца лѣвой руки этой женщины, вымытаго предварительно спиртомъ и карболовой водою и вытертаго потомъ фlamбированной тряпкой, взята была капля крови помошью укола булавки. Эта капля крови была посѣяна въ бульонѣ изъ куриного мяса. Въ слѣдующіе дни культура осталась безплодна. На другой день кровь, взятая новымъ уколомъ, оказалась плодотворной. Женщина умерла три дня спустя. Слѣдовательно, кровь содержала, уже по крайней мѣрѣ за три дня до смерти, въ то время когда Пастеръ взялъ ее, удобо-культивируемый микроскопическій паразитъ. Восемнадцать часовъ передъ смертью этой женщины была взята и посѣяна кровь изъ лѣвой стопы — и эта кровь дала также, какъ и предыдущая, плодородную культуру. Но вотъ фактъ, заслуживающій вниманія: въ то время, когда въ первой плодородной культурѣ былъ только одинъ микробъ, похожій на микроорганизмъ фурункула, вторая культура содержала микробъ, расположенный въ длинныхъ цѣпоч-

кахъ, изогнутыхъ, въ видѣ маленькихъ пакетиковъ, напоминающихъ нити спутанного жемчуга.

Когда трупъ этой женщины былъ вскрытъ, то нашли гной въ громадномъ количествѣ въ полости брюшины и въ маткѣ. Этотъ гной былъ посѣянъ со всѣми необходимыми предосторожностями. Такимъ-же образомъ была посѣяна кровь, взятая изъ венъ верхней и нижней конечностей. Во всѣхъ культурахъ находились длинныя цѣпочки зеренъ, въ видѣ маленькихъ, спутанныхъ пакетиковъ, и повсюду — безъ всякой примѣси другого организма, исключая культуры изъ гноя брюшной полости, содержащей, кромѣ организмовъ въ видѣ цѣочекъ еще одинъ маленький гноеродный вибріонъ, который Пастеръ еще раньше описалъ подъ именемъ организма гноя.

Изъ Матернитэ Пастеръ отправился въ госпиталь Ларивуазерь, гдѣ ему показали другую женщину, умиравшую также отъ послѣродовой горячки. Проколомъ брюшной полости онъ собралъ гной, находившійся тамъ въ изобилії; онъ его посѣялъ, какъ и кровь, взятую изъ плечевой вены. Культура гноя содержала длинныя цѣочки и маленький гноеродный вибріонъ, культура-же изъ крови дала только длинныя цѣочки, совершенно чистыя.

Пастеръ сдѣлалъ еще много подобныхъ наблюдений на больныхъ послѣродовой горячкой. Онъ пришелъ къ тому заключенію, что подъ именемъ послѣродовой горячки понимали до сихъ поръ болѣзни съ разнообразными симптомами, которые однако всѣ зависятъ, кажется, отъ прониканія въ тѣло обыкновенныхъ организмовъ, развивающихся на раненныхъ поверхностяхъ и отсюда распространяющихся, подъ той или другой формой, кровеносными или лимфатическими путями въ разныя части тѣла. Здѣсь они вызываютъ различные болѣзnenные процессы, соответствственно свойствамъ паразита и общей конституціи заболѣвшаго организма. Пастеръ убѣжденъ, что (за исключеніемъ можетъ быть случая, когда тѣло женщины содержитъ еще до родовъ какіе-нибудь болѣзнетворные микробы гноя въ какомъ-нибудь внутреннемъ или наружномъ парывѣ,) антисептическій методъ въ состояніи будетъ воспрепятствовать появлению послѣродовой

торячки. Употребление карболовой кислоты можетъ оказать большія услуги, хотя ея запахъ и тяжелыя мысли, связанныя съ употреблениемъ карболовой кислоты, имѣютъ свои неудобства для употребления ея у роженицъ. Но этого нельзя сказать о концентрированныхъ растворахъ борной кислоты, которая можетъ раствориться, при обыкновенной температурѣ, въ количествѣ 30 до 40 граммовъ на литръ воды.

«Не будетъ ли весьма полезно — сказалъ Пастеръ, сообщая эти идеи и эти наблюденія Академіи Наукъ, — поставить около кровати каждой роженицы концентрированный теплый растворъ борной кислоты съ соотвѣтственнымъ количествомъ компрессовъ, которые погружались бы въ растворъ и часто мѣнялись бы съ того времени, какъ только окончатся роды? Было-бы также благоразумно предварительно держать компрессы въ печкѣ съ горячимъ воздухомъ около 150 градусовъ, что было-бы больше чѣмъ достаточно для того, чтобы убить всѣ зародыши обыкновенныхъ микроорганизмовъ».

«Я изложилъ — прибавилъ онъ — факты такими, какъ я ихъ видѣлъ, и я осмѣливаюсь дать имъ объясненіе; но я не скрываю отъ себя, что въ области медицины очень трудно всецѣло избѣгнуть субъективныхъ взглядовъ. Я никогда не забываю, что я не изучалъ ни медицины, ни ветеринаріи; поэтому мое сильнѣйшее желаніе, чтобы это вызвало обсужденія и критику. Относясь безъ снисхожденія къ возраженіямъ пустымъ или исходящимъ отъ людей предубѣждѣнныхъ, пренебрегая грубымъ скептицизмомъ, который возводитъ невѣріе въ систему, я охотно встрѣчаю скептицизмъ, дѣлающій изъ сомнѣнія методъ, основное правило котораго гласить: «еще больше свѣта!..

«Съ тѣхъ поръ, какъ эти идеи проникли шире въ практику, родовспомогательные госпитали — сказалъ недавно одинъ известный врачъ — не знаютъ почти больше послѣродовой горячки. Употребленіе раствора сулемы, одной части на тысячу частей воды, которая есть одно изъ наилучшихъ обеззаражающихъ веществъ, даетъ великолѣпные результаты и устраняетъ всякую опасность. Развѣ не позволительно надѣяться, что послѣродовая

горячки вскорѣ исчезнутъ также, какъ исчезло изъ госпиталей гнойное зараженіе со временемъ изобрѣтенія перевязки Листера?»

II.

Въ 1882 году лабораторія Нормальной Школы занялась изученіемъ новой болѣзни, неизвѣстной даже по имени въ Парижѣ, но которая производить большія опустошенія въ деревняхъ, — краснухой свиней. Эта болѣзнь опять-таки производится микробомъ и этотъ микробъ былъ открытъ впервые Тюлье, когда онъ изслѣдовалъ въ одной маленькой деревнѣ, въ департаментѣ Віены, кровь и жидкости свиней, умершихъ отъ краснухи. Въ лабораторіи сейчасъ приступили къ постановкѣ опытовъ, которые доказали-бы, что именно этотъ микробъ производитъ болѣзнь. Культивировали микробъ въ мясномъ стерилизованномъ бульонѣ, дѣлали потомъ послѣдовательные пересадки изъ этой культуры въ слѣдующую, беря всегда для посѣва капельку изъ предыдущей культуры. Привитыя свиньямъ, эти послѣднія культуры вызывали краснуху у нѣкоторыхъ породъ свиней. Слѣдовательно, доказательство было дано: эта болѣзнь зависитъ несомнѣнно отъ микроба.

Пастеръ, совмѣстно съ Тюлье и однимъ молодымъ препараторомъ, Луаромъ, отправились въ свою очередь изслѣдовать эту болѣзнь въ департаментѣ Воклюзъ. Они остались больше мѣсяца въ кантонѣ Боленъ у ветеринара Мокюе, который указалъ имъ все свинные заводы въ округѣ. Попытавши дѣйствіе кислорода на этотъ микробъ для ослабленія его заразности, Пастеръ началъ дѣлать опыты вакцинаціи отъ этой болѣзни. Свиньи, предохраненные прививкой, оставлены въ кантонѣ Боленѣ, подъ наблюдениемъ ветеринара Мокюе. Владѣльцы свиней обѣщались не трогать вакцинированныхъ животныхъ, по крайней мѣрѣ, годъ. Въ сентябрѣ того-же года, когда эпизоотія краснухи свирѣпствовала повсюду въ кантонѣ Боленѣ и въ округѣ Оранжа, ни одна изъ вакцинированныхъ свиней не заболѣла. «Онъ всѣ цѣѣтуши», писалъ Мокюе. Благодарственный адресъ былъ присланъ Пастеру муниципальнымъ совѣтомъ Болена.

Но, несмотря на эти счастливые разультаты, вопросъ о приспособленіи вакцинъ къ различнымъ расамъ свиней требуетъ еще дальнѣйшихъ опытовъ, чтобы вакцинація свиней могла войти въ общее употребленіе.

Вскорѣ начали испытывать въ лабораторіи другой методъ для ослабленія вируса краснухи, кромѣ старого метода ослабленія — кислородомъ воздуха.

Пастеръ установилъ, что заразы не по существу своему болѣзнетворны, но что онъ могутъ пріобрѣтать формы, и въ особенности разныя многочисленныя физіологическія свойства, находясь въ зависимости отъ среды, въ которой онъ живутъ и размножаются. Несмотря на то, что вирусъ принадлежитъ къ определенному микроскопическому живому виду, онъ можетъ, однако, существенно видоизмѣняться: можно ослабить его заразность, можно ее усилить, и каждое изъ этихъ состояній можетъ быть фиксировано въ отдѣльныхъ разводкахъ. Микробъ заразителенъ для какого-нибудь животнаго, когда онъ можетъ жить и размножаться въ его организмѣ, наподобіе паразита, и вызывать въ немъ, возрождаясь самъ собою, разныя разстройства, приводящія къ болѣзни и смерти. Если этотъ микробъ жиль въ какомъ нибудь видѣ животныхъ, — то есть, если онъ много разъ переходилъ отъ одного организма этого вида въ другой организмъ того же самаго вида, не подвергаясь при переходѣ какому нибудь внешнему чувствительному влиянію, — то можно разматривать заразность этого паразита, какъ достигшую извѣстнымъ образомъ своего предѣла, своего максимума, для индивидуумовъ этой расы. Паразитъ сибирской язвы, напримѣръ, свойственный овцамъ, мало отличается у каждой отдѣльной овцы, зараза одного года мало отличается отъ заразы другаго года для той-же самой страны: это зависитъ вѣроятно отъ того, что, при послѣдовательныхъ переходахъ черезъ тѣло овецъ, приспособленіе паразита къ жизни въ тѣлѣ овцы достигло такого состоянія, которое можно-бы назвать окончательнымъ.

Въ такомъ-же видѣ представляется состояніе заразности въ осенній вакцинѣ Джениера. Но заразность какого нибудь вируса, не достигшаго еще своего максимума дѣйствія, можетъ

быть существенно измѣнена при послѣдовательномъ переходѣ черезъ рядъ организмовъ какой нибудь расы животныхъ. Какъ известно изъ предыдущаго, Пастеръ и его сотрудники, желая возвратить вакцинацію куриной холеры, сибирской язвы и другихъ болѣзней ихъ прежнюю сильную заразность, прививали ихъ молодымъ животнымъ и послѣдовательно доходили постепенно до животныхъ болѣе старыхъ и, такимъ образомъ, прогрессивно увеличивали заразность, пока она не доходила до своего максимума.

«Академія, безъ сомнѣнія, помнитъ — сказалъ Пастеръ въ недавнемъ сообщеніи — тотъ заразный микробъ, который мы недавно открыли въ слюнѣ больныхъ водобоязнью. Этотъ микробъ, крайне заразительный для кроликовъ, оказался напротивъ совершенно безвреднымъ для взрослыхъ морскихъ свинокъ; онъ, однако, убиваетъ быстро морскихъ свинокъ въ возрастѣ нѣсколькихъ часовъ или даже нѣсколькихъ дней. Дѣлая послѣдовательные зараженія, отъ одной молодой свинки другой, намъ удалось добиться усиленія вируса, достигшаго такой силы, что онъ могъ легко убить морскую свинку болѣе старого возраста. Самы признаки болѣзни въ концѣ концовъ совершенно измѣнились. Усиление заразы послѣдовательными переходами черезъ индивидуумовъ одной расы было такимъ образомъ установлено».

«Но новый и неожиданный результатъ, который я хочу сообщить Академіи, состоить въ томъ, что микробъ получивший усиленную заразность послѣдовательными прививками на свинкахъ, оказывается потомъ менѣе вирулентнымъ, чѣмъ прежде, по отношенію къ кроликамъ».

«Въ этихъ новыхъ условіяхъ микробъ производить у кроликовъ болѣзнь, отъ которой они самопроизвольно выздоравливаютъ, и, кроме того, кроликъ, перенесшій эту болѣзнь, дѣляется иммуннымъ (не воспріимчивымъ) къ смертельному вирусу кролика. Отсюда вытекаетъ важное слѣдствіе, что привычка микробы жить въ тѣлѣ какого-нибудь животнаго (морской свинки), соотвѣтствуя определенной заразности, измѣняетъ свое заразное свойство относительно другого вида животныхъ (кролика), ослабляетъ эту заразу и дѣлаетъ съ ней то, что она

становится предохранительной вакциною для этого послѣдняго вида.»

«Этотъ результатъ имѣть чрезвычайно большую важность, какъ это всякий признаетъ, потому что въ этомъ находится секретъ нового метода ослабленія вируса, который можно будетъ примѣнить къ нѣкоторымъ наиболѣе сильнымъ заразамъ. Мы тотчасъ представимъ примѣръ подобнаго рода и сдѣланное изъ него примѣненіе».

«Если привить въ грудную мышцу голубя микроба краснухи свиней, то голубь умираетъ, въ промежуткѣ отъ шести до восьми дней, представляя предварительно всѣ наружные признаки куриной холеры».

«Если кровь отъ этого первого голубя привить второму голубю, а кровь второго третьему и т. д., — тогда микробъ этотъ акклиматизируется въ голубѣ. Шарообразный видъ, принимаемый голубемъ и его сонливость — всѣ эти обыкновенные признаки болѣзни, появляются черезъ все болѣе и болѣе короткій срокъ, сравнительно съ первымъ голубемъ этого ряда. Смерть тоже наступаетъ быстрѣ; наконецъ кровь послѣднихъ голубей оказывается гораздо больше заразительной для свиньи, чѣмъ самые заразительные продукты свиньи, умершей отъ краснухи, такъ сказать, самопроизвольной».

«Переходы микроба краснухи свиней черезъ тѣла кроликовъ приводятъ къ совершенно другому результату. Инфекціонные продукты свиньи, умершей отъ краснухи, или культуры изъ этихъ продуктовъ, привитые кролику, дѣлаютъ его всегда больнымъ и очень часто убиваютъ его.

Если теперь прививать краснуху отъ кролика къ кролику, то микробъ акклиматизируется въ кроликѣ. Тогда уже всѣ кролики погибаютъ отъ прививки и умираютъ въ нѣсколько дней. Культуры изъ крови этихъ кроликовъ въ стерилизованныхъ средахъ дѣлаются прогрессивно все легче и обильнѣе. Самъ микробъ мнѣяетъ немнога свой видъ: дѣлается немнога толще, чѣмъ у свиньи и представляется въ

видъ цифры 8, безъ нитевидныхъ удлиненій, бывшихъ въ иныхъ кульптурахъ.

Если теперь привить свиньямъ кровь отъ послѣднихъ кроликовъ, то замѣчаются, сравнительно съ прививками кровью отъ первыхъ, что заразительность прогрессивно уменьшается отъ крови первого кролика, къ крови послѣдующихъ. Вскорѣ оказывается, что кровь кролика привитая свинѣ, уже не вызываетъ смерти, хотя дѣлаетъ ее болѣй. По выздоровленіи, она остается предохраненной отъ смертельной краснухи. *)

III.

Но между всѣми этими предпринятыми изслѣдованіями было одно, которое занимало первое мѣсто, на которомъ въ теченіе послѣднихъ пяти лѣтъ сосредоточивались всѣ помыслы Пастера и его учениковъ: это было — бѣшенство. Таинственная по своему скрытому (инкубационному) періоду, страшная по своимъ симптомамъ, эта болѣзнь обратила уже давно на себя вниманіе Пастера, когда онъ приступилъ къ ея изученію въ 1880 году. Кромѣ привлекательности, заключающейся въ решеніи темной задачи, онъ чувствовалъ еще, что если ему удастся открыть причину, вѣроятно бактеріальную, этой болѣзни, то онъ заставитъ всѣ лучшіе умы обратить свое внимание на его новыя идеи. Очень часто онъ былъ пораженъ, если не оппозиціей, то, по крайней мѣрѣ, слишкомъ благородной и подозрительной осторожностью, высказываемой многими врачами при обсужденіи его доктринъ. Эти врачи, убѣжденные, что психическій элементъ можетъ вызвать измѣненіе симптомовъ и развитіе болѣзни у человѣка, не допускали ни малѣйшаго сравненія между болѣзнями людей и болѣзнями животныхъ. И дѣйствительно, понятно, что душевныя волненія, большое семейное горе, сознательный страхъ смерти, страхъ передъ великой неизвѣстностью — могутъ измѣнить у человѣка теченіе болѣзни, усилить ее и даже вызвать или ускорить ее. Но, признавая все это — ибо ни у кого чувство такъ не развито, какъ у

*) См. приложеніе.

Пастера — признавая, что въ этомъ мнѣніи есть глубокая истина, Пастеръ не могъ, однако, не быть убѣжденнымъ, что первичное происхожденіе, причина той или другой прилипчивой болѣзни физіологически тождественна въ обѣихъ группахъ, и что наше тѣло, несмотря на наше духовное превосходство, предрасположено къ тѣмъ-же опасностямъ, къ тѣмъ-же разстройствамъ отправленія, что и тѣло животныхъ.

Чтобы восторжествовать надъ этой оппозиціей, необходимо было, послѣ большихъ опытовъ съ сибирскою язвою, затронуть болѣзнь, которая была-бы свойственна и человѣку и животнымъ, болѣзнь, въ которой опытъ, эта громадная, хотя и единственная, сила Пастера, могъ-бы восторжествовать. Бѣшенство представляло всѣ эти преимущества.

Это былъ опять докторъ Ланелонгъ, который указалъ Пастеру первый случай водобоязни. 10 декабря 1880 года пятилѣтній ребенокъ, укушеннный въ лицо за мѣсяцъ предъ тѣмъ, умиралъ въ госпиталѣ Труссо. Мучимый одновременно и страшной жаждой и ужасной боязнью всякой жидкости, онъ приблизилъ къ своимъ губамъ носикъ накрытаго чайника и вдругъ откинулся назадъ, съ сдавленнымъ судорогой горломъ, въ порывѣ такого бѣшенства, что онъ ударилъ сестру, ухаживавшую за нимъ. Онъ страдалъ кромѣ того воздухобоязнью въ удивительной степени: одна его пятка высунулась какъ-то изъ подъ одѣяла; одинъ изъ врачей дунулъ на нее; ребенокъ не видѣлъ врача, который дунулъ очень легко, такъ сказать, почти неощутимо. Несчастный ребенокъ впалъ въ припадокъ бѣшенства и получилъ страшный спазмъ гортани. На слѣдующій день начался бредъ и бредъ ужасающей. Пѣна, наполнившая его горло, задушила его.

Черезъ четыре часа послѣ его смерти собрали слизь съ щёба этого ребенка, развели ее небольшимъ количествомъ воды и привили эту жидкость двумъ кроликамъ подъ кожу живота. Кролики погибли меньше, чѣмъ черезъ 36 часовъ. Слюна этихъ умершихъ кроликовъ передавала также болѣзнь другимъ кроликамъ. Не могло-ли казаться, что мы здѣсь имѣемъ дѣло съ привитіемъ бѣшенства? Такое именно заключеніе и дѣлалъ докторъ

Морисъ Реньо. Этотъ докторъ, извѣщенный одновременно съ Пастеромъ о болѣзни мальчика, дѣлалъ также опыты на крокахъ: кролики умирали. Еще годомъ раньше докторъ Морисъ Реньо заявилъ о передачѣ бѣшенства слюною человѣка кроликамъ. «Мы имѣемъ въ данномъ случаѣ, сказаъ онъ, новый фактъ подобнаго-же рода и мы вѣримъ, пока намъ не доказутъ противнаго, что послѣдніе кролики умерли отъ бѣшенства».

Съ своей обыкновенной осторожностью и обращая больше вниманія на опыты, чѣмъ на клиническіе симптомы, Пастеръ не торопился дѣлать такого рѣшительнаго вывода. Онъ началъ продѣлывать то-же, что и докторъ Морисъ Реньо: онъ началъ изслѣдоватъ подъ микроскопомъ ткани и кровь привитыхъ въ лабораторіи кроликовъ. Онъ замѣтилъ, — какъ непосредственно передъ смертью, а также послѣ ихъ смерти, присутствіе спеціальнаго микроба, легко культивируемаго въ чистомъ видѣ и послѣдовательныя культуры котораго оставались ядовитыми для кроликовъ; этотъ микробъ появлялся постоянно у всѣхъ привитыхъ кроликовъ въ крови. Такъ какъ достаточно было одного или двухъ дней, чтобы вызвать этимъ микробомъ смерть, то Пастеръ думалъ, что бѣшенство не могло-бы появиться въ такой короткій срокъ. Кромѣ того, Пастеръ находилъ этотъ же самый микробъ и въ слюнѣ дѣтей, умершихъ отъ другихъ болѣзней и даже въ нормальной слюнѣ здоровыхъ взрослыхъ людей. Это былъ новый микробъ, вызывающій неизвѣстную до тѣхъ поръ болѣзнь. Пастеръ считалъ, что въ опытѣ со слюною ребенка, страдавшаго бѣшенствомъ, этотъ микробъ былъ случайнымъ спутникомъ вируса бѣшенства.

Этотъ микробъ слюны культивируется очень легко въ стерилизованныхъ бульонахъ, какъ напримѣръ, въ телячьемъ, и можно легко сдѣлать рядъ послѣдовательныхъ культуръ, пересаживая отъ одной въ другую путемъ засѣванія; заразительность микроба при этомъ сохраняется. «Нельзя-ли — спрашивалъ себя Пастеръ — ослабить заразительность этого паразита дѣйствиемъ кислорода? Это дало-бы возможность подтвердить новымъ примѣромъ общность метода ослабленія заразъ. Опыты въ этомъ

направлениі совершенно удались. Если позаботиться, чтобы промежутокъ времени, при переходѣ отъ одной культуры къ послѣдующей, не продолжался больше нѣсколькихъ часовъ, какъ это было описано при опытахъ съ ослабленіемъ вируса куриной холеры, то заразительность послѣдовательныхъ культуръ микроба слюны сохраняется, нѣкоторымъ образомъ, до безконечности, — другими словами, если расположить культуры такъ, что онъ предшествуютъ другъ другу по двѣнадцати часовъ, то привитые ими кролики погибаютъ также скоро, какъ и отъ первой культуры. Тюлье имѣлъ терпѣніе дѣлать такого рода послѣдовательныя культуры: двадцать четыре въ соприкосновеніи съ воздухомъ и столько-же въ пустомъ пространствѣ, такъ какъ микробъ этотъ одновременно и аэробный и анаэробный. Двадцать четвертая культуры одинаково быстро убивали кроликовъ, какъ и первыя. Но если сравнить послѣдовательныя культуры, оставляя ихъ подольше въ соприкосновеніи съ воздухомъ, прежде чѣмъ пересадить отъ одной культуры къ другой, то замѣчаются, что заразительность культуры ослабляется. Слѣдовательно, возможно и здѣсь, какъ и съ куриной холерой, получить ослабленныя культуры микроба. Однако, сравнительно съ микробомъ куриной холеры, микробъ слюны гораздо скорѣе погибаетъ въ соприкосновеніи съ воздухомъ. Достаточно прождать два, три дня — и микробъ маточной культуры теряетъ всю свою заразительность: посѣвъ, взятый въ какомъ угодно количествѣ, не произрастаетъ больше въ новой культурѣ. Но прежде чѣмъ она погибаетъ, культура эта перешла различныя степени заразительности, прогрессивно уменьшающейся, и очень легко, съ помощью такихъ культуръ, производить у кроликовъ болѣзнь, но не смерть. Разъ только кроликъ выздоровѣлъ, онъ уже можетъ противостоять смертельной для другаго кролика прививкѣ. Кислородъ воздуха видоизмѣняетъ этотъ заразный вирусъ въ вирусъ-вакцину, потому что, если сильно заразительную кровь или культуры, имѣющія такія-же свойства, оставить въ закрытыхъ трубочкахъ впѣ соприкосновенія съ воздухомъ, то онъ сохраняютъ свою первоначальную вирулентность не только нѣсколько часовъ, но даже нѣсколько мѣсяцевъ.

Несмотря на то, что эти результаты были столь же новы, какъ и неожиданы и что этимъ устраненъ одинъ изъ поводовъ къ ошибкамъ, при изученіи бъшенства, надо было, однако, сознаться, что эти первыя изслѣдованія не подвинули ни на шагъ разясненія этиологіи этой болѣзни. Вопрощь остался совершенно непронутымъ.

Неудобство продолжительного скрытаго периода этой болѣзни, заставляющее ждать цѣлые мѣсяцы результата произведенаго опыта, въ то время когда вопросъ требовалъ очень много подобныхъ опытовъ, побудило Пастера искать способъ, которымъ можно было бы съ увѣренностью получить бъшенство и въ болѣе скорый срокъ. Вопреки утвержденію одного профессора ветеринарной школы въ Ліонѣ, увѣрявшаго, что только слюна бъшенныхъ собакъ содержитъ ядъ бъшенства, и что всѣ его опыты съ прививкой другихъ органовъ, какъ съ мозжечкомъ, такъ и съ продолговатымъ мозгомъ, давали отрицательные результаты, — Пастеръ все таки привилъ подъ кожу кроликамъ и собакамъ, со всѣми необходимыми предосторожностями относительно чистоты, различные части мозга собаки, погибшей отъ бъшенства. Бѣшенство появилось и у собакъ и у кроликовъ послѣ такого же почти продолжительного скрытаго периода, какъ и въ случаяхъ бѣшенства отъ обыкновеннаго укуса. Какъ непріятна ни была необходимость имѣть дѣло съ такой неопределенней продолжительностью скрытаго периода, однако чрезвычайно важный фактъ былъ установленъ: бѣшенство можно привить не одной только слюною. Кромѣ того, что слюна всегда нечиста, что она содержитъ специальный микробъ слюны, который обладаетъ особой заразительностью, она представляетъ еще другія неудобства. Для того чтобы можно было безъ перерыва дѣлать изслѣдованія, необходимо было бы всегда имѣть въ своемъ распоряженіи слюну бѣшенныхъ собакъ. Но слюна теряетъ вирулентныя свойства бѣшенства уже черезъ 24 часа. Напротивъ, разъ установлено, что мозгъ содержитъ вирусъ бѣшенства, то экспериментатору возможно имѣть этотъ вирусъ въ чистомъ состояніи, въ громадномъ количествѣ и надолго его сохранить.

Пастеру и его сотрудникамъ пришла тогда мысль привить вирулентное вещество бѣшенства въ чистомъ видѣ подъ твердую

мозговую оболочку на поверхность мозга собаки. «Отчего сразу не перенести вирусъ — сказалъ себѣ Пастеръ — въ то мѣсто, гдѣ онъ долженъ дѣйствовать и развиваться?» Сдѣлавши трепанацию черепа хлороформированной собакѣ, онъ клалъ на поверхность ея мозга кусочекъ продолговатаго мозга животнаго, умершаго отъ бѣшенства. Какъ только исчезало вліяніе хлороформа, животное становилось снова совершенно здоровымъ. Въ тотъ-же вечеръ оно принимало пищу. Но черезъ нѣсколько дней появлялись признаки бѣшенства: животное становилось грустнымъ, беспокойнымъ, оно раскидывало свою подстилку, отказывалось отъ всякой пищи. Вскорѣ появлялся одинъ изъ характерныхъ признаковъ бѣшенныхъ собакъ, въ видѣ жалостнаго и рѣзкаго воя, представляющаго ничто иное, какъ протяжный крикъ страданія и мольбы, къ которому примѣшивается лай отъ галлюцинацій. Начинается разстройство желудка: собака глотаетъ сѣно и солому, она дѣлается буйной, ее сотрясаютъ сильныя конвульсіи; наконецъ, она умираетъ въ одномъ изъ этихъ припадковъ. Во все это время вся лабораторія находилась въ большой радости. Наконецъ-то найденъ методъ, позволяющій укоротить скрытый періодъ и дающій вѣрное зараженіе! Опыты повторялись въ большомъ количествѣ; всѣ трепанированныя собаки, получившія на поверхность мозга небольшую частицу продолговатаго мозга животнаго, умершаго отъ бѣшенства, умирали въ періодъ, рѣдко достигавшій двадцати дней. Не доказываютъ-ли, кромѣ того, эти опыты, что бѣшенство есть болѣзнь мозга, что ядъ бѣшенства не исключительно только находится въ слюнѣ, но прежде всего онъ свойственъ мозговому веществу?

Въ скромѣ времени получились результаты, которые еще увеличивали важность только-что приведеншаго: было доказано, что не только головной мозгъ, но и спинной мозгъ во всей своей длине содергитъ вирусъ бѣшенства, и даже нервы на всемъ своемъ протяженіи отъ центра къ периферіи могутъ содержать ядъ бѣшенства. Если есть микробъ бѣшенства, то онъ, очевидно, выбираетъ себѣ мѣсто для преимущественнаго своего развитія головной и спинной мозгъ и нервы. Кромѣ того, было установлено, что вирусъ локализируется то въ одной, то въ

другой части первой системы, и что въ этомъ фактѣ необходимо искать объясненія тѣхъ значительныхъ различій симптомовъ бѣшенства, какія верѣчаются въ разныхъ случаяхъ этой болѣзни. Въ моментъ смерти продолговатый мозгъ всегда содержитъ заразу. Наконецъ, было доказано, что можно привить бѣшенство почти также быстро, какъ и посредствомъ трепанациіи, прививая заразительное первое вещество въ кровеносную систему — въ вену.

Въ виду такихъ данныхъ, легко было дать себѣ отчетъ въ томъ, что происходитъ при укушениі бѣшеннай собакой. Кровеносная система переносить на поверхность головнаго или спиннаго мозга этотъ вирусъ, который развивается въ томъ или другомъ мѣстѣ и понемногу завладѣваетъ первымъ веществомъ. Если только смерть не появляется отъ пораженія продолговатаго мозга прежде, чѣмъ вирусъ успѣетъ распространиться по всему тѣлу, то вся первая ткань тѣла прогрессивно поражается во всѣхъ своихъ частяхъ.

Слюнныя желѣзы часто содержать заразу бѣшенства — безъ сомнѣнія потому, что первы, входящіе въ нихъ, приносятъ туда эту заразу. Такимъ образомъ, можно себѣ объяснить присутствіе заразы въ слюнѣ бѣшеннныхъ собакъ, гдѣ ее всегда находили съ тѣхъ поръ, какъ эта болѣзнь известна. Если поражается прежде спинной мозгъ, или какая-нибудь изъ его частей, то предъ смертью часто появляется общій параличъ. Тогда очень часто бываетъ форма бѣшенства безъ характернаго воя, безъ стремленія кусаться и собака до конца жизни остается ласковой.

«Если внимательно изслѣдоввать, — сказалъ, въ юлѣ 1883 года, одинъ изъ сотрудниковъ Пастера, Ру, въ своей замѣчательной диссертациіи на доктора медицины, — если сравнить внимательно свѣжую мякоть головнаго мозга бѣшеннай собаки съ таковой-же мякотью мозга здоровой собаки, то очень трудно найти между ними какую-нибудь разницу. Кажется, однако, что въ мозгѣ бѣшеннныхъ находится, кромѣ зернышекъ, разсѣянныхъ по всей здоровой мякоти, еще чрезвычайно маленькия точечки, едва заметныя, даже при самыхъ сильныхъ нашихъ увеличеніяхъ. Въ мозговой жидкости, несмотря на кажущуюся прозрачность, удается, при большомъ вниманіи, открыть эти маленькия точечки. Не это-ли

микробъ бъшенства? Нѣкоторые, не колеблясь, утверждаютъ это; но пока не удастся культивировать этотъ микробъ въ тѣла животныхъ, пока не удастся при прививкѣ такой культуры сообщить бъшенство, мы не позволимъ себѣ объ этомъ говорить утвердительно».

Пробовали, конечно, дѣлать культуры во всѣхъ возможныхъ искусственныхъ средахъ, но до сихъ поръ успѣха не получено. Были дни, когда сотрудники Пастера спрашивали другъ друга, не будетъ-ли благоразумиѣ отказаться отъ дальнѣйшаго изслѣдованія вопроса о бъшенствѣ во всѣхъ его подробностяхъ. «Нѣть, — сказалъ Пастеръ, — надо идти до конца. Соберемъ и сгруппируемъ всѣ факты.»

На три слишкомъ года лабораторія превратилась въ пасарю. Во всѣхъ клѣткахъ находились собаки кусающія и собаки искусанныя. Кромѣ этихъ обычныхъ гостей лабораторіи, не было въ Парижѣ ни одного случая бъшенства, о которомъ Пастеръ не былъ-бы извѣщенъ. Однажды ветеринаръ Бурраль телеграфировалъ ему: «Пудель и бульдогъ въ полномъ приступѣ бъшенства, пріѣзжайте.» Пастеръ предложилъ мнѣ сопутствовать ему и мы выѣхали, везя съ собою корзину съ шестью кроликами. Обѣ собаки находились въ послѣдней степени бъшенства. Въ особенности бульдогъ, громадное животное, вылъ, съ пѣной у рта, въ своей клѣткѣ. Протянули ему желѣзный шесть, онъ бросился на него, и только съ большимъ трудомъ удалось вырвать шесть изъ его окровавленныхъ клыковъ. Тогда приблизили къ клѣткѣ одного изъ кроликовъ и пропустили черезъ рѣшетку клѣтки испуганного кролика. Но несмотря на то, что ее раздражали, собака отбросилась въ уголъ клѣтки и не хотѣла кусать кролика. «Намъ нужно однако, — сказалъ Пастеръ — привить кролику слону этой собаки».

Тогда два служителя взяли веревку, сдѣлали изъ нея затяжную петлю и бросили ее на собаку, какъ арканъ. Такимъ образомъ собака была взята и притянута къ краю клѣтки; ее тогда схватили и привязали ей челюсти. Задыхаясь отъ бъшенства, съ налитыми кровью глазами, при страшныхъ судорогахъ, сотрясавшихъ все тѣло ея, собака была положена на столъ и

удержана въ неподвижномъ состояніи. Въ это время Пастеръ наклонился и, на разстояніи дюйма отъ этой головы, бѣшенно извергавшей пѣну, втянулъ, съ помощью тонкой пипетки, нѣсколько капель слюны.

Методъ предупрежденія заболѣванія бѣшенствомъ послѣ укусенія бѣшеными животными.

Гораздо важнѣе, чѣмъ пайти и изолировать микроба бѣшенства, былъ вопросъ о пріисканіи средства для предупрежденія этой страшной болѣзни. Возможно-ли пайти средство, чтобы сдѣлать собакъ невоспріимчивыми къ бѣшенству? Такъ какъ въ данномъ случаѣ не было возможности прибѣгнуть къ геніальному способу ослабленія заразы, изобрѣтенному Пастеромъ для куриной холеры и для сибирской язвы, то Пастеръ попытался обойти это затрудненіе: онъ поставилъ себѣ вопросъ, нельзя-ли, при невозможности пользоваться культурами въ колбахъ, воспользоваться тѣломъ животныхъ въ видѣ среды для культуры, гдѣ вирусъ бѣшенства могъ-бы ослабляться или усиливаться. Это былъ первый шагъ къ новымъ опытамъ, это было первымъ фундаментомъ очень важныхъ дальнѣйшихъ наблюденій.

По смерти одной бѣшеной собаки, Пастеръ вскрылъ ее, взялъ кусочекъ спиннаго мозга и привилъ его трепанированному кролику подъ твердую мозговую оболочку: по прошествіи пятнадцати-дневнаго скрытаго периода болѣзни, кроликъ умеръ. Прививая мозгъ этого кролика второму кролику, потомъ отъ второго третьему — и такъ далѣе, и дѣлая всѣ эти прививки по способу трепанациіи, онъ сталъ скоро замѣчать, что кролики приобрѣтаютъ все большую и большую склонность къ уменьшению продолжительности скрытаго периода бѣшенства.

Въ концѣ двадцати или двадцати пяти переходовъ отъ кролика къ кролику, продолжительность инкубационнаго периода стала восьми-дневной. Послѣ новой продолжительной серіи послѣдовательныхъ переходовъ, эти сроки стали только семи-дневными. При девяностомъ переходѣ, продолжительность инкубационнаго периода сдѣлалась немного менѣе семи дней. При такихъ усло-

віяхъ, вирусъ бѣшенства удержался въ одинаковой силѣ на продолжительное время. Итакъ, одна сторона вопроса разъяснилась: удалось раздобыть вирусъ съ установленной силой заразительности. Но сдѣлалось ли теперь возможнымъ найти способъ, способный видоизмѣнить эту заразу? Послѣ безчисленнаго множества опытовъ, Пастеру явилась мысль подвѣсить въ цѣломъ рядъ флаконовъ, — въ которыхъ воздухъ поддерживался въ сухомъ состояніи при помощи юдкаго кали, положеннаго на днѣ сосуда, — куски свѣжаго спиннаго мозга кроликовъ, умиравшихъ отъ бѣшенства регулярно послѣ семи-дневнаго инкубационнаго періода.

Оказалось, что заразительность этихъ сушенихъ мозговъ измѣнялась: чѣмъ больше времени проходило, тѣмъ больше уменьшалась ея заразительность, и, наконецъ, совсѣмъ исчезала. Потомъ приступили къ слѣдующимъ опытамъ: растирали кусочекъ этихъ мозговъ съ бульономъ и прививали эту эмульсію подъ кожу собакамъ помощью правацовскаго шприца, начавши эти прививки мозгомъ, сушившимся пятнадцать дней и, переходя отъ мозга до мозга, доходили до прививки мозга очень заразительнаго, положеннаго только день тому назадъ въ флаконъ для сушки.

Собаки, подвергнутыя этого рода прогрессивнымъ прививкамъ, оказались невоспріимчивыми къ бѣшенству. Имъ впрыскивали потомъ самый сильный вирусъ, давали ихъ сильно искусать бѣшеннымъ собакамъ, — онъ все-таки не заболѣвали. Послѣ всего этого можно было-бы совершенно спокойно оставить въ своихъ клѣткахъ всѣхъ этихъ бродягъ предмѣстій, привезенныхъ изъ псарни въ лабораторію, но ихъ еще удержали, само собою понятно, въ постояннѣмъ заключеніи.

Осталось еще продѣлать второй чрезвычайно важный опытъ: возможно-ли уничтожить такимъ-же образомъ проявленіе болѣзни послѣ укуса бѣшеннымъ животнымъ, какъ это удалось съ предыдущими собаками въ отношеніи предохраненія ихъ отъ послѣствій будущихъ укушеній? И въ данномъ случаѣ методъ оказался совершенно успѣшнымъ.

Для провѣрки этихъ фактовъ была назначена ученая комиссія. Пастеръ представилъ ей массу собакъ всѣхъ возрастовъ

и всѣхъ породъ, сдѣланныхъ невоспріимчивыми къ бѣшенству. Эта стая собакъ, принадлежавшая лабораторіи, помѣщалась въ громадной псацѣ Виленевъ л'Етана.

Несмотря на всю важность этихъ быстрыхъ успѣховъ въ изученіи причины и предупрежденія бѣшенства, Пастеру однако это еще казалось недостаточнымъ, хотя и крайне цѣннымъ научнымъ пріобрѣтеніемъ. Онъ стремился къ тому, чтобы этотъ методъ предохранительной прививки могъ быть примѣненъ когда-либо къ человѣку, укушенному бѣшенной собакой. «Какъ бы я не былъ увѣренъ, сказалъ Пастеръ, относительно успеха у собакъ, я чувствую, однако, что въ тотъ моментъ, когда мнѣ придется сдѣлать прививку человѣку, у меня задрожитъ рука!»

Происшествіе, случившееся въ Эльзасѣ, заставило Пастера бросить свои колебанія. 4-го іюля 1885 года въ 8 часовъ утра, Іосифъ Мейстеръ, девяти лѣтъ отъ роду, старшій сынъ служителя въ булочнѣ, живущаго въ Штейгѣ, шелъ одинъ изъ этой деревни въсосѣднюю школу въ Мейсенготѣ. Онъ шелъ по кратчайшей и уединенной дорогѣ, по которой ходятъ школьніки, — какъ вдругъ собака напала на него и повалила его: мальчикъ не пытался бороться съ ней; онъ только покрылъ свое лицо руками. Собака его кусала, катала его по землѣ, ожесточалась все больше и больше. Каменьщикъ увидѣлъ издали эту сцену и прибѣжалъ. Вооруженный желѣзнымъ ломомъ, онъ нѣсколько разъ удрилъ собаку, которая убѣжала, и вернулась съ намѣреніемъ броситься на своего хозяина. Ея хозяинъ, Теодоръ Фонь, бакалейщикъ въ Мейсенготѣ, взялъ ружье и убилъ ее. При изслѣдованіи собаки, оказалось: слюна въ горлѣ, солома и разные отломки дерева въ желудкѣ, — всѣ признаки буйной формы бѣшенства были на лицо.

Родители маленькаго Мейстера предполагали сначала, что это была простая встрѣча со злой собакою. День прошелъ въ уходѣ за мальчикомъ и въ промываніи его четырнадцати ранъ. Но къ вечеру мать, узнавши подробнѣ все, что произошло, про случай, бывшій съ хозяиномъ собаки, про его внезапное рѣшеніе убить собаку выстрѣломъ изъ ружья, испугалась и повела маленькаго Іосифа къ доктору Веберу въ Виле. Веберъ сдѣлалъ

нѣсколько прижиганій карболовой кислотой и посовѣтовалъ г-жѣ Мейстеръ поѣхать въ Парижъ и повести своего сына къ нѣкоему господину, который одинъ только въ этомъ тяжкомъ случаѣ способенъ дать хорошій совѣтъ. «Этотъ господинъ, живущій въ улицѣ Ульмъ, — прибавилъ врачъ — называется Пастеромъ.»

Теодоръ Фонъ захотѣлъ сопровождать эту мать, все болѣе и болѣе беспокоившуюся, и этого ребенка, у котораго на ногѣ и бедрѣ были такія раны, которыхъ дѣлали его походку неувѣренной и шаткой. Въ понедѣльникъ 6-го іюля, утромъ, они явились въ лабораторію. Пастеръ, очень смущенный, тронутый несчастьемъ этихъ бѣдныхъ людей, вполнѣ увѣренный въ своихъ послѣднихъ опытахъ, но томимый мыслью, что надо будетъ начать на этомъ ребенкѣ приложеніе новаго метода, отправился къ Вюльпіану и къ доктору Гранше, профессору медицинскаго факультета, ученику и другу своему, и сообщилъ имъ о положеніи, съ которымъ онъ столкнулся лицомъ къ лицу.

Вюльпіянъ и Гранше отправились сейчасъ осмотрѣть маленькаго Іосифа Мейстера; они изслѣдовали его раны и единодушно посовѣтовали Пастеру испробовать на этомъ ребенкѣ, почти приговоренномъ къ смерти, методъ, постоянно удававшійся на собакахъ. Пастеръ устроилъ въ одномъ изъ флигелей своей лабораторіи — въ старомъ коллежѣ Роленъ — помѣщеніе для матери и ребенка. Это устройство на скорую руку напоминало перебѣздь на новую квартиру.

Ребенокъ забавлялся здѣсь, наблюдая собакъ, курь, кроликовъ, морскихъ свинокъ, всю массу разнообразныхъ животныхъ для опытовъ, находившихся за оградой въ улицѣ Вокленъ, какъ будто на какой-нибудь фермѣ въ Эльзасѣ. Вечеромъ, въ половинѣ девятаго часа, пошли за нимъ и привели въ лабораторію. Попавши между разными трубочками, колбами, онъ бросалъ кругомъ удивленіе и испуганные взгляды. Вюльпіянъ и Гранше ожидали его. Правацковскій шприцъ, содержавшій первую прививку, былъ уже готовъ. Когда ребенокъ увидѣлъ въ рукахъ Гранше эту стальную иголку, онъ испугался и началъ плакать. Его мать, также плачавшая, раздѣла его и впрыскиваніе, не заразительное въ данномъ случаѣ, было сдѣлано.

Все лечение состояло въ томъ, что ребенку дѣлали уколы подъ кожу, въ области основания реберъ, и впрыскивали тотъ вирусъ, который Пастеръ считалъ нужнымъ для того, чтобы сдѣлать маленькаго Мейстера невосприимчивымъ къ бѣшенству. Но помѣрѣ того, какъ лѣченіе подвигалось къ концу и когда слѣдовали прививки все болѣе сильныхъ вирусовъ, Пастеръ испытывалъ ужасное беспокойство. Дни онъ проводилъ въ мучительныхъ ожиданіяхъ, ночи — безъ сна; быстро переходилъ онъ отъ большихъ надеждъ къ страшному унынію. Вотъ какъ пріобрѣтается слава!

18 іюля, два дня послѣ тринацдатой и послѣдней прививки, Пастеръ, уступая настояніямъ окружающихъ его, довѣрилъ этого мальчика Гранше и позволилъ себѣ отдохнуть вдали отъ своей лабораторіи. Одна гостепріимная семья ждала его въ мирномъ уголку лѣса Морвана. Но посреди этого глубокаго уединенія мучительное беспокойство не оставляло Пастера. Напрасно летѣли успокоительныя письма и депеши отъ Гранше одна за другою, Пастеръ все время имѣлъ предъ глазами образъ ребенка, представлявшійся ему болѣйшимъ, умирающимъ или въ полномъ состояніи бѣшенства.

Только 27 іюля маленький Мейстеръ отправился обратно въ Эльзасъ. Онъ пожелалъ увести съ собою корзинку съ двумя кроликами и двумя морскими свинками, рожденными въ лабораторіи и еще не привитыми. Послѣ его отъѣзда, установилась правильная переписка между Пастеромъ и Іосифомъ Мейстеромъ. Маленький Мейстеръ долженъ былъ присыпать бюллетени о своемъ здоровьѣ вначалѣ черезъ каждые четыре дня, потомъ черезъ 8 дней, потомъ черезъ двѣ недѣли разъ. Съ какимъ нетерпѣніемъ ожидалось полученіе этихъ посланий, писанныхъ грубымъ, дрожащимъ почеркомъ ребенка къ «Дорогому своему господину Пастеру», по привычному выраженію маленькаго эльзасца! Иногда Мейстеръ забывалъ своевременно отвѣтить своему корреспонденту:

«Это довольно неблагородно съ моей стороны — писалъ онъ Пастеру въ послѣднихъ числахъ августа, — не сообщать Вамъ ничего новаго о себѣ, въ то время когда Вы, мой дорогой господинъ Пастеръ, такъ беспокоитесь о моемъ здоровьѣ. Благодарю Васъ

тысячу разъ, также благодарять Васъ мои родители. Съ особенной радостью повторяю Вамъ, что я совершенно здоровъ и ъмъ очень хорошо».

26 октября Пастеръ сообщилъ Академіи Наукъ протоколь этого опыта и показалъ, какимъ образомъ онъ достигъ послѣ пяти лѣтнихъ усилий того, что онъ скромно называлъ счастливой попыткой. Вся Академія аплодировала ему съ глубокимъ чувствомъ, и Вюльпіянъ своимъ спокойнымъ голосомъ, обдумывающій и взвѣшивающій каждое свое слово, сказалъ просто: «Эта новая работа завершаетъ славу Пастера и бросаетъ несравненный блескъ на нашу страну.»

Послѣ маленькаго эльзасца Мейстера явился для предохранительныхъ прививокъ пастухъ изъ Юры, Ж. Б. Жюпиль, сильно искусанный бѣшенной собакою еще шесть дней тому назадъ. Пастеръ былъ немного смущенъ этимъ шести-дневнымъ опозданіемъ. Но признавая вполнѣ разницу между этимъ большимъ промежуткомъ и промежуткомъ въ два съ половиною дня, протекшимъ у Мейстнера со времени укушения, Пастеръ полагалъ, однако, что позволительно еще дѣйствовать. Такъ какъ очень рѣдко случается, чтобы бѣшенство появилось у укушеннаго человѣка раньше мѣсяца или шести недѣль, то можетъ быть будетъ еще достаточно времени на то, чтобы получить надлежащей результатъ отъ прививокъ и помѣшать появленію припадковъ бѣшенства. Въ сущности здѣсь главный вопросъ въ быстротѣ. Бѣшенство, по продолжительности своего инкубационнаго периода, можно сравнить со скоростью пассажирскаго поѣзда, вакцина обгонитъ его со скоростью курьерскаго поѣзда, а, обогнавши его, она будетъ имѣть время помѣшать ему вступить въ соки организма. Весь Парижъ былъ сильно возбужденъ этимъ вторымъ опытомъ надъ Жюпилемъ: въ прессѣ, въ салонахъ, въ кофейняхъ до трутуаровъ включительно, — вездѣ говорили, то съ энтузіазмомъ, то съ осторожностью, иные враждебно и даже оскорбительно о томъ, заслуживаетъ ли новый методъ довѣрія. Кончилось тѣмъ, что толпа заинтересовалась этимъ пастухомъ съ другой точки зрѣнія: ее поразила чрезвычайно рѣдкая храбрость этого пятнадцатилѣтняго мальчика.

Онъ пасъ свое стадо на лугу Вилеръ-Фарлай и увидѣлъ, что бѣшеная собака побѣжала къ группѣ дѣтей, игравшихъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него. Жюпиль бросился, схвативъ свой кнутъ, на собаку. Этимъ онъ далъ возможность дѣтямъ спастись бѣгствомъ. Собака кинулась на Жюпила и тогда началась страшная борьба. Своей правой рукою онъ старался освободить свою лѣвую руку, схваченную идержанную клыками собаки; потомъ, повалившіи собаку, ему удалось связать ей пасть ремнемъ своего кнута. Схвативши потомъ одинъ изъ своихъ деревянныхъ башмаковъ, онъ покончилъ съ ней.

Этотъ большой мальчикъ, который велъ себя, какъ герой, прогуливался по Парижу въ первые дни съ особенной неуклюжестью крестьянина-фланера или рабочаго безъ дѣла. Но мало-по-малу шумъ, поднятый его приключениемъ, вскружилъ ему голову. Весьма забавно было, какъ предметъ для изученія правоъ, прослѣдить вначалѣ удивленіе, потомъ удовлетвореніе и, наконецъ, безмолвное опьяненіе этого пастуха, прославившагося подъ именемъ чудеснаго ребенка и видѣвшаго свой портретъ на всѣхъ углахъ въ газетныхъ кiosкахъ. Французская Академія присудила ему за его храброе поведеніе премію въ 1000 франковъ. Эта сумма облегчила немногого положеніе очень бѣдной семьи Жюпила, который, къ счастью, скоро началъ смотрѣть на свою великую репутацію съ болѣе вѣрной точки зрѣнія. Подобно пастуху Лафонтена, поднятый на время благосклонностью судьбы, онъ уѣхалъ изъ Парижа, какъ будто пробуждаясь отъ сновидѣнія, и вернулся спокойно домой въ Вилеръ-Фарлай.

Весь ученый міръ обратилъ вниманіе на лабораторію улицы Ульмъ. Отовсюду пріѣзжали укушенные. Никогда не предполагали, что бываетъ такая масса укушенныхъ бѣшеными животными. Самъ Пастеръ, не смотря на большое число статистическихъ данныхъ, собранныхъ имъ за пять лѣтъ, никакъ не ожидалъ такого большого числа. Правда, что очень много причинъ затрудняли полученіе точной статистики объ этомъ вопросѣ. Если газеты и разсказываютъ съ ужасомъ о бѣшеной собакѣ, проѣгавшей по большому городу, то онъ совершенно не отмѣчаютъ,

исключая очень большихъ несчастій, случаевъ укушеній бѣшенными собаками изъ глубокой провинціи и изъ деревень. Очень часто, чтобы не употреблять ужасающаго слова, приписываютъ ту или другую смерть отъ бѣшенства воспаленію мозговыхъ оболочекъ.

Посреди этого первого скопленія людей, пріѣхавшихъ лѣчиться, представился, 9-го ноября 1885 года, десятилѣтній ребенокъ, маленькая Луиза Пелетье, укушенная 37 дней тому назадъ. Большая черная собака бросилась на нее въ Варень-Сентъ-Илеръ. Кромѣ раны въ подмышковой впадинѣ, была большая рана на затылкѣ. Можно было сказать, что несчастный ребенокъ былъ скальпированъ: черепные покровы подымались и опускались на эту гноящуюся рану.

«Отчего Вы мнѣ не привезли Вашего ребенка раньше?» не удержался Пастеръ и спросилъ съ сильнымъ беспокойствомъ отца и мать маленькой Пелетье. И пока ждали доктора Гранишѣ для производства первого впрыскиванія, Пастеръ сказалъ себѣ: «Вотъ случай безнадежный! Проявленіе признаковъ бѣшенства надо, вѣроятно, ждать со дня на день. Слишкомъ поздно для того, чтобы можно было ожидать, что предохранительный методъ будетъ имѣть хотя малѣйшій шансъ на успѣхъ. Не обязанъ ли я, въ интересѣ этого метода съ научной стороны, отклонить отъ себя лѣченіе этого, такъ поздно прибывшаго, ребенка и еще при такихъ исключительно тяжелыхъ обстоятельствахъ?»

Положеніе было отчаянное: въ случаѣ несчастнаго исхода, какъ это предвидѣлъ Пастеръ, не рисковаль-ли онъ, что эту неудачу припишутъ методу, и этоброситъ такое сомнѣніе въ умы, что недѣли и мѣсяцы, полныя удачи, можетъ быть не въ состояніи будутъ его разсѣять? Сколько подымется разнорѣчи-выхъ толковъ, за которыми остановки не бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, и сколько укушенныхъ людей погибнетъ, быть можетъ, въ виду того, что они потеряютъ довѣріе къ этому способу, или оттого что имъ отсовѣтуютъ обращаться въ лабораторію!

Да, это было все совершенно вѣрио. Но это все было гипотетическимъ соображеніемъ, а здѣсь, въ сосѣдней комнатѣ для ожидающихъ, сидѣли отецъ и мать, полные тоски. «Если я имѣю

только одинъ шансъ противъ десяти тысячъ спасти этого ребенка, — сказалъ себѣ Пастеръ, — то я долженъ все таки попробовать.» Чувство гуманности пересилило научныхъ соображеній.

Лѣченіе было окончено черезъ нѣсколько дней. Ребенокъ былъ взятъ родителями въ ихъ маленькую квартиру на улицѣ Дофинъ и началъ вести свою обычную жизнь трудащагося полу-пенсіонера. Начинали почти надѣяться на выздоровленіе дѣвочки, какъ вдругъ появились первые признаки водобоязни: ребенокъ отклонялъ всякое питье, припадки удушья стѣсняли его рѣчь; казалось, что слушаешь отрывочное рыданіе, слѣдующее за страшными мученіями ребенка.

Утромъ 2-го декабря наступилъ періодъ покоя, продолжавшійся восемь часовъ. Казалось, что между бѣшенствомъ и предохранительными прививками происходила борьба, — прививки начали опять производиться каждые 2 часа. Но проявленіе болѣзни было уже полное. Бѣшенство оказалось сильнѣе. Къ вечеру припадки усилились, появился бредъ, икота, галлюцинаціи. Бѣдная дѣвочка говорила, что она чувствуетъ, что вода течетъ по всему ея тѣлу. Временами она не узнавала своего отца, она его принимала за чужаго, потомъ, быстро замѣчая свою ошибку, она извинялась и ласкалась къ нему. Она призывала Пастера, она брала его за руки, она ему говорила: «Останьтесь здѣсь у моей кровати, я боюсь, когда Вы уходите! О, я такъ довольна, когда Вы возлѣ меня!» Прерывающіяся слова выходили съ трудомъ изъ ея задыхающейся горла; смерть закрывала уже ея глаза, эти большие черные глаза, глядѣвшіе съ такой тоскою. Въ теченіе этихъ мучительныхъ часовъ ея сестра, удаленная изъ комнаты, продолжала заниматься въ столовой при свѣтѣ лампы и готовила свои уроки для школы.

3-го декабря маленькая Луиза Шелетье умерла. Въ первую минуту поднялось сильное движение въ общественномъ мнѣніи. Вскорѣ на горизонтѣ появилась цѣлая буря. Нѣкоторые журналисты разсчитывали въ этой бурѣ погубить все открытие. Явились статьи, озаглавленныя «Побѣда Пастера». Не довольствовались крикомъ о неудачѣ, старались еще внушить, что смерть ребенка Луизы Шелетье произошла не отъ укусовъ собаки, а отъ вируса

предохранительныхъ прививокъ; Пастеръ не только шарлатанъ, онъ даже убійца. Клевета удвоила свои усплія. Подумать только, какъ хорошо было-бы врагамъ, если-бы удалось винуть недовѣріе и презрѣніе къ этому открытию, еслибы удалось подсказать тѣмъ, которые чувствовали большую патріотическую радость и у которыхъ возбудилась громадная гуманная надежда, если-бы можно было ихъ разубѣдить заключеніемъ: «Однако, кажется, что все это неправда!»

Эти нападки были единичны, но тѣмъ болѣе они были жестоки. Успѣли-ли они помѣшать нѣсколькимъ лицамъ прийти въ лабораторію за помощью? Имъ удалось, по крайней мѣрѣ, поколебать нѣкоторыхъ. Одна венгерка, укушенная бѣшеной собакою и пріѣхавшая немедленно въ Парижъ для лѣченія у Пастера, цѣльныхъ шесть дней не рѣшалась прийти въ лабораторію. Когда Пастеръ спросилъ ее о причинѣ этого замедленія, она ему отвѣтила: «Послѣ того, чего я начиталась, я потеряла вѣру въ это лѣченіе». Въ то время когда въ газетахъ появилось извѣстіе о выѣздѣ изъ Нью Йорка въ Парижъ четырехъ американскихъ дѣтей, укушенныхъ бѣшеной собакою, эти филантропические журналы возвѣстили, что если-бы печальный конецъ маленькой Пелетье былъ извѣстенъ въ Америкѣ, то родители этихъ дѣтей избавили-бы ихъ отъ такого длиннаго и безполезнаго путешествія. Они, однако, пріѣхали и возвратились обратно излѣченными. А послѣ нихъ слѣдовали сотни укушенныхъ. Изъ всѣхъ угловъ Франціи, изъ всѣхъ концовъ Европы они пріѣзжали группами по пятнадцати, по двадцати, по сорока даже заразъ. Очень часто это были бѣдняки и Пастеръ давалъ имъ пріютъ. Сосѣднія гостиницы были превращены въ вспомогательные помѣщенія лабораторіи. Дворъ Нормальной Школы превратился въ дворъ чудесъ, гдѣ царствовало смѣшеніе всѣхъ языковъ. Французы всѣхъ классовъ, маленькие англичане съ широкими бѣлыми воротниками, отвороченными на черныхъ курткахъ; итальянскіе крестьяне, закутанные въ свои большие полотняные плащи; испанцы въ своихъ беретахъ; арабы въ своихъ бурнусахъ,— какіе только укушенные не проходили черезъ эту кабинетъ для прививокъ!

Въ мартѣ мѣсяцѣ, 1886 года, прибыли девятнадцать русскихъ крестьянъ изъ Смоленской губерніи, одѣтые въ полушибки и укушенные бѣшенымъ волкомъ. Этотъ волкъ, бѣгавшій два дня и двѣ ночи по деревнямъ, бѣшено бросался на этихъ крестьянъ, изъ которыхъ однихъ онъ обезобразилъ, другихъ разорвалъ до смерти. Чудовищныя ихъ раны напоминали музей Дююнтрена. Эта серія русскихъ тѣмъ больше заслуживала вниманія, что если по офиціальной статистикѣ изъ шести укушенныхъ бѣшеннной собакой умираетъ одинъ, то отношеніе смертности у укушенныхъ бѣшенымъ волкомъ гораздо больше. Вирусъ здѣсь одинъ и тотъ же, но въ большей части случаевъ собака кусаетъ и уходитъ, а волкъ, остервеняясь на своей жертвѣ, умножаетъ раны, т. е. пути для введенія вируса. Очень часто изъ двадцати укушенныхъ бѣшенымъ волкомъ, всѣ двадцать умираютъ. Это считается чудомъ, если двое или трое остаются въ живыхъ.

Изъ девятнадцати русскихъ, прибывшихъ изъ Смоленска, выздоровѣли шестнадцать.

Отношеніе оказалось обратное. Эти три умершіе имѣли на головѣ страшныя раны. Можетъ быть, они имѣли-бы нѣсколько шансовъ на выздоровленіе, еслибы предохранительныя прививки начались непосредственно послѣ укусовъ. Но какія могли быть средства, чтобы бороться черезъ пятнадцать дней съ такими пораженіями, которыя захватили уже весь организмъ? При вскрытии нашли у одного изъ этихъ несчастныхъ въ черепѣ отломавшейся зубъ волка.

Когда, наканунѣ своего отѣзда, остальные шестнадцать выздоровѣвшихъ переходили въ послѣдній разъ порогъ лабораторіи, они испытывали такое же религіозное благоговѣніе, какъ будто они переступали ворота Кремля.

И въ этотъ дворѣ улицы Ульмъ, при входѣ въ эти маленькие, узкія и низкія комнаты, гдѣ было совершено столько великихъ дѣлъ, прохожденіе этихъ русскихъ посреди всѣхъ тѣхъ, которые ожидали еще въ свою очередь выздоровленія, казалось олицетвореніемъ благодарности народовъ Пастеру.

Приложение 1-ое.

ПЕРЕПИСКА

между французскимъ и прусскимъ учеными во время войны.

Заявленіе г. Шеврёля въ застѣданіи Академіи Наукъ

9-го января 1871 г.

Г. Шеврёль читаетъ въ Академіи слѣдующее заявленіе:

«Садъ цѣлебныхъ растеній, основанный въ Парижѣ по приказу короля Людовика XIII, въ январѣ 1626 г., преобразованный въ Музей Естественной Исторіи декретомъ Конвента 10-го июня 1793 г., былъ бомбардированъ, въ царствованіе Вильгельма I, короля Пруссаго, при канцлерѣ Бисмаркѣ, прусскою арміею, въ ночь съ 8 на 9-ое января 1871 г.; до этого времени онъ пользовался уваженіемъ всѣхъ партій и всѣхъ властей, какъ національныхъ такъ и иностранныхъ».

«*E. Шеврёль*, Директоръ.

Парижъ, 9-го января 1871 г.

Письмо Пастера къ Декану медицинскаго факультета
Боннскаго Университета.

Арбуга (Юра), 18-го Января 1871 г.

Г. Деканъ!

Въ 1868 г. медицинскій факультетъ Боннскаго Университета по собственному почину почтилъ меня титуломъ доктора медицины въ награду за мои работы о броженіяхъ и о роли микроскопическихъ организмовъ. Изъ всѣхъ отличій, которыя повлекли за собою открытия, сдѣланныя мною со временемъ вступленія моего на научную карьеру, въ теченіе двадцати двухъ лѣтъ, не было — признаюсь — ни одного, которое доставило бы мнѣ столько удовольствія. Этимъ въ моихъ глазахъ какъ-бы узаконилась сокровенная мысль, истинность которой все болѣе и болѣе утверждалась, — та мысль, что мои изслѣдованія открыли

новые горизонты для медицинскихъ работъ. Я поспѣшилъ даже помѣстить подъ стекло почетный дипломъ, освящавшій рѣшеніе вашего факультета, и украсилъ имъ мой рабочій кабинетъ. Теперь-же видъ этого диплома мнѣ ненавистенъ и я чувствую себя оскорблѣннымъ, видя мое имя съ прибавленіемъ титула *virum clarissimum*, которымъ Вы его украсили, подъ покровительствомъ имени, обреченаго отнынѣ проклятию моего отечества, имени **Rex Guilelmus.**

Я глубоко уважаю Васъ и всѣхъ знаменитыхъ профессоровъ, подписавшихся подъ рѣшеніемъ вашего факультета, но, повинуясь голосу моей совѣсти, прошу Васъ исключить мое имя изъ архивовъ вашего факультета и принять обратно этотъ дипломъ въ знакъ негодованія, внушаемаго ученому французу варварствомъ и лицемѣріемъ того, который, для удовлетворенія преступнаго самолюбія, упорствуетъ въ избіеніи двухъ великихъ народовъ.

Послѣ Феррьеरскаго свиданія Франція сражается за человѣческое достоинство, а Пруссія за торжество самой отвратительной лжи, состоящей въ томъ, будто будущій миръ Германіи зависитъ отъ раздробленія Франціи, въ то время какъ для всякаго благомыслящаго человѣка ясно, что завладѣніе Эльзасомъ и Лотарингіею поведетъ къ безконечной войнѣ. Несчастны или достойны сожалѣнія народы Германіи, если, разставшись позднѣе нашего съ феодальнымъ рабствомъ, они не понимаютъ, что Франція, хотя и есть владѣтельница земель Эльзаса и Лотарингіи, не господствуетъ однако надъ совѣстью ихъ обывателей. Савоя была бы до сихъ поръ Пьемонтскою провинціею, если-бы ея обыватели по свободному голосованію не выразили согласія сдѣлаться французами. Таково новѣйшее право цивилизованныхъ народовъ, каковое вашъ король топчетъ ногами и за которое Франція сражается. И, можетъ быть, ни въ какую другую эпоху своей исторіи она больше не заслуживала имени великаго народа, двигателя прогресса, свѣточа народовъ.

Пріймите, г. Деканъ, и передайте отъ меня вашимъ ученымъ сотоварищамъ увѣреніе въ моемъ глубокомъ почтеніи.

*Л. Пастеръ,
членъ Института*

Приложение 2-ое.

Нѣкоторыя размышленія о положеніи наукъ во Франціи.

О лабораторіяхъ.

Въ настоящее время уже сдѣлалось несомнѣнно и, слава Богу, безспорною истиною, что одинъ систематической умъ самъ по себѣ безсиленъ создать что-либо стойкое въ ряду физическихъ и естественныхъ наукъ. «Только путемъ тонкихъ, обдуманныхъ и послѣдовательныхъ опытовъ удается заставить природу открыть свои тайны. Всѣ другіе методы всегда оставались безуспѣшными».

Какъ только физикъ и химикъ удаляются изъ своихъ лабораторій, какъ только естествоиспытатель бросаетъ свои коллекціи и путешествія, — они тотчасъ дѣлаются неспособными къ малѣйшему открытию.

Самая смѣлѣя идея, самая правильная разсужденія — только тогда пріобрѣтаютъ тѣло и душу, когда они освящены наблюдениемъ и опытомъ. Лабораторіи и открытія — это два соотносящихся понятія. Уничтожьте лабораторіи, и физическая науки явятся воплощеніемъ безплодія и смерти; они представятъ собою только предметы преподаванія, ограниченные и безсильные, а не науки прогресса и будущаго. Возвратите имъ лабораторіи, и вмѣстѣ съ ними возродится жизнь съ ея плодотворностью и могуществомъ.

Безъ своихъ лабораторій физикъ и химикъ представляютъ собою солдатъ безъ оружія на полѣ битвы.

Выходъ изъ этихъ положеній очевиденъ. Если ваше сердце тронуто побѣдами, столь полезными для человѣчества; если васъ поражаютъ дивные результаты электрическаго телеграфа, фотографіи, анестезіи и многихъ другихъ чудесныхъ открытій; если

васъ интересуетъ, чтобы ваша родина также приняла участіе въ открытии этихъ чудесъ, то, умоляю васъ, обратите вниманіе на эти священныя обители, обозначаемыя выразительнымъ именемъ *лабораторіи*. Требуйте, чтобы ихъ умножали и украшали: онъ — храмы будущаго богатства и благосостоянія; въ нихъ человѣчество растетъ, укрѣпляется и улучшается; въ нихъ оно научается читать въ твореніяхъ природы, въ твореніяхъ прогресса и всемірной гармоніи, въ то время какъ его собственныя созданія часто представляютъ собою творенія варварства, фанатизма и разрушенія.

Между учрежденіями, устроенными Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, можно насчитать всего два или три, которыхъ лабораторіи заслуживаютъ этого имени. Назову высшую Нормальную Школу. И для этого потребовалось еще прямаго вмѣшательства Императора. Большое удовольствіе доставляетъ видѣть въ часы работы — а эти часы тянутся весь день — эту громадную залу, которая составляетъ теперь главную лабораторію этой Школы. Въ ней Анри Сенъ-Клеръ Девиль, любимый учитель цѣлой семьи известныхъ работниковъ, совершаеть свои знаменитыя работы, составляющія честь неорганической химіи. Въ ней Дебрэ, Тростъ, Грандо, Каронъ, Готфель, Лешартье, Лами, Жерне, Москаръ и многіе другіе нашли пріютъ, въ которомъ имъ всюду отказывали, благодаря бѣдности въ научныхъ средствахъ въ нашей странѣ.

Что касается органической химіи, то она еще ждетъ лабораторій, достойныхъ ея громадныхъ успѣховъ, достойныхъ тѣхъ трехъ ученыхъ, которые съ такимъ блескомъ шли по пути, намѣченному ихъ знаменитыми учителями — Шеврелемъ, Дюма, Балардомъ, Пелузомъ: я разумѣю гг. Вурца, Бертело и Кагура.

Лабораторіи, какъ я сказалъ, представляютъ собою воплощеніе жизни и плодотворности. Если вы желаете проникнуться этой истиной, то зайдите въ медицинскій факультетъ въ Парижѣ. Великія химическія открытия г. Вурца привлекаютъ туда со всѣхъ странъ цивилизованного міра талантливыхъ молодыхъ людей, имена которыхъ вамъ укажутъ на различныя національности:

Бейлштейнъ, Бутлеровъ, Опенгеймъ, Либенъ, Бауерь, Луренсо, Крафтсъ, Симпсонъ, Аткизонъ....

Я могъ-бы удлинить этотъ списокъ, но прибавляю, что я лишь называю тѣхъ, которымъ наука уже обязана нѣкоторыми весьма видными работами. Представителями Франціи въ названномъ факультетѣ являются гг. Фридель, Перро, Клермонъ, Каванту, Вилмъ, Готье, достойные работы которыхъ уже много разъ обращали на себя вниманіе Академіи Наукъ.

Хватитъ ли у меня смѣлости говорить о денежныхъ и материальныхъ средствахъ французскихъ лабораторій? Кто повѣрить мнѣ, если я скажу, что въ бюджетѣ Народнаго Просвѣщенія не имѣется ни одного гроша, предназначенаго на преуспѣяніе физическихъ наукъ въ лабораторіяхъ, и что только благодаря какой-то фикції и терпимости администрацій, ученые, считающіеся профессорами, могутъ урвать нѣкоторые расходы на свои личныя работы изъ общественныхъ суммъ въ ущербъ суммамъ, назначеннымъ на расходы по ихъ преподаванію. И сколькихъ изъ нихъ я могъ-бы назвать, которые удѣляютъ изъ своего состоянія на расходы для изслѣдований, которыми они дѣлаютъ честь своей родинѣ! Свои бессмертныя работы Дюма и его ученики сдѣлали въ лабораторіи, устроенной и содержавшейся на ихъ собственный счетъ. Знаменитыя лабораторіи гг. Фуко и Физо, а также лабораторія нашего великаго химика агранома — Буссэнго, были ихъ личною собственностью со всѣми приборами, которые въ нихъ заключались.

Не въ этомъ-ли отношеніи слѣдовало бы указать, что Франція достаточно богата, чтобы платить за свою славу? Есть щедроты отдельныхъ лицъ, которые унижаютъ цѣлый народъ: вышеприведенные принадлежать къ числу таковыхъ.

Закончу другимъ примѣромъ дурной организаціи нашей научной системы: факты извѣстны и имѣютъ отношеніе къ одному изъ членовъ академіи Наукъ. Въ теченіе десяти лѣтъ этотъ ученый даже ни одного дня не пользовался услугами мальчика въ лабораторіи, такъ что всякую посуду, которая ему нужна была, всякий загрязненный стаканъ, онъ вынужденъ былъ вытирать собственными руками. Представьте себѣ, сколько времени

потрачено имъ на эти служительскія занятія, — такого времени, которое онъ могъ-бы употребить на пользу общаго блага, быть можетъ, обогащая науку и промышленность новыми открытиями! На всѣ просьбы, съ которыми онъ обращался, чтобы его избавили отъ этой унизительной обязанности, ему отвѣчали, — и это была правда, — что въ бюджетѣ нѣтъ такой графы, которою можно было-бы мотивировать созданіе должности лабораторнаго мальчика, пущнаго при его работахъ.

Читатель, надѣюсь, извинить эти печальные разоблаченія. Быть можетъ, онъ даже въ нихъ найдетъ нѣкоторый поводъ къ законной гордости, когда, въ скоромъ времени, Министръ Народнаго Просвѣщенія, представляя Императору и странѣ картину прогресса наукъ за послѣдніе двадцать лѣтъ, въ состояніи будетъ назвать участіе въ немъ Франціи широкимъ и прекраснымъ.

Когда онъ увидить размѣры сдѣланнаго, онъ сообразитъ, что могло-бы быть исполнено при средствахъ, болѣе соответствующихъ народному генію. Онъ сможетъ сказать то, что сказалъ недавно одинъ иностранный ученый, выходя изъ одной парижской лабораторіи: «Я почиталъ ваши работы, онъ мнѣ казались великими; теперь, когда я знаю тѣ средства, которыми вы располагаете, — я имъ удивляюсь.»

Январь 1868.



Приложение 3-е.

Почему Франция не нашла выдающихся людей, когда ей угрожала гибель?

I.

Въ народѣ, въ которомъ строго упрочилось политическое и административное единство, въ которомъ общественные нравы приняли это единство и подчинились ему съ такою покорностью, что личная инициатива имѣть только ограниченный кругъ дѣйствія, — необходимо, чтобы всѣ жизненныя силы страны были въ совершенной гармоніи, иначе можно опасаться распаденія всего общественнаго строя.

Подобно тому, какъ движение огромнаго механизма замедляется дурнымъ дѣйствіемъ одного лишь изъ колесъ, обуславливающихъ движение, и жизнь Франціи, въ которой учрежденія имѣютъ между собою такую полную солидарность, можетъ подвергнуться опасности, благодаря какому-либо тяжелому страданію одного изъ источниковъ ея благосостоянія.

Въ настоящей брошюрѣ я задался цѣлью показать, что если Франція, въ моментъ крайней опасности, не нашла выдающихся людей, которые пустили бы въ дѣйствіе ея средства и мужество ея дѣтей, то это слѣдуетъ приписать — я въ этомъ убѣжденъ — тому обстоятельству, что Франція, въ теченіе уже полстолѣтія, относится безучастно къ великимъ работамъ мысли, въ особенности въ области точныхъ наукъ.

Въ наше время легкихъ убѣждений, быстрыхъ и крайнихъ суждений о людяхъ и вещахъ, не лишнее, можетъ быть, прибавить, что разсужденія, которыхъ слѣдуютъ, не имѣютъ въ себѣ ничего новаго, кроме примѣненія къ настоящимъ обстоятельствамъ. Они занимали меня уже въ теченіе двадцати лѣтъ. Я могъ бы привести тому многочисленныя доказательства, но довольно

будетъ и одного: въ одномъ письмѣ, написанномъ къ Императрицѣ Евгениѣ, въ ноябрѣ 1868 г., чтобы поблагодарить ее за одинъ изъ тѣхъ актовъ доброты, которыми ея жизнь была полна, можно найти слѣдующія слова: «Величайшее дѣло, которое надлежитъ теперь выполнить — это обеспечить научное превосходство Франціи».

II.

Нашъ вѣкъ отличается отъ всѣхъ предшествовавшихъ ему удивительнымъ развитіемъ науки и промышленности. Ни въ одну другую эпоху исторіи міра не видно, въ такой короткій періодъ времени, такого накопленія открытій, столько новыхъ примѣненій къ искусствамъ, промышленности, общему благосостоянію народа. Въ этомъ движеніи Франція приняла громадное участіе. Она содѣйствовала ему съ большой славою, и болѣе всякаго другаго народа его подготовила, потому что было бы очень ошибочно думать, что естественные результаты въ родѣ тѣхъ, которые мною приведены, могутъ быть плодомъ скорыхъ трудовъ или стеченія нѣкоторыхъ счастливыхъ обстоятельствъ. Прогрессъ матеріального строя подобенъ распусканію листа или цвѣтка, которые представляются удивленному взгляду только послѣ тихой и темной переработки всѣхъ ихъ частей, даже наиболѣе нѣжныхъ. Открытія также имѣютъ свои скрытые и невидимые зародыши, производительные или бесплодные, въ тѣхъ предѣлахъ, которые для нихъ подготовлены геніемъ, трудомъ, продолжительными успѣями, которые суть для нихъ источники жизни и плодотворности.

Разсматриваемыя, съ этой точки зреінія, новѣйшія открытія связаны тѣснѣйшими узами съ великимъ умственнымъ движеніемъ второй половины XVIII столѣтія. Они непосредственно рождены отъ тѣхъ замѣчательныхъ работъ, которыхъ отмѣтили во всѣхъ направленіяхъ прогрессъ человѣческаго ума въ теченіе этой памятной эпохи. Имѣла-ли когда-либо Академія Наукъ больше значенія, какъ въ теченіе лѣтъ, когда на однѣхъ скамьяхъ сидѣли Клероль, Лакайль, Даламберъ, Кулонъ, Лагранжъ, Реомюръ, Бюффонъ, Добантонъ, и, вскорѣ за тѣмъ, Лавуазье, Лапласъ, Лоранъ-де-Жоссье, Лежандръ, Монжъ, Карно, Деламбръ и многіе другіе? Я называю только наиболѣе знаменитыхъ.

Ужасное политическое и социальное потрясение, которымъ завершились послѣдніе годы XVIII столѣтія, могло задержать надолго развитіе наукъ въ нашей странѣ. Но не только ничего подобнаго не произошло, а, напротивъ, онѣ вскорѣ заблистали новымъ блескомъ, благодаря созданію двухъ учрежденій, которыхъ долго не имѣли соперниковъ въ Европѣ — Музея Естественной Исторіи и Политехнической Школы. Здѣсь умѣстно будетъ привести справедливыя слова нашего великаго физіолога, Клодъ Бернара: «Можно содѣйствовать движенію наукъ двумя различными путями: 1) открытиями и новыми идеями и 2) могуществомъ большихъ средствъ къ научному труду и развитію. Въ движеніи науки изобрѣтенія составляютъ, безъ сомнѣнія, существенную часть. Однако новые идеи и открытия подобны зернамъ: недостаточно родить ихъ и посѣять, — требуется еще воспитать и развивать ихъ научнымъ уходомъ; безъ этого они умираютъ или эмигрируютъ, и тогда можно видѣть, какъ они процвѣтаютъ и даютъ плоды на плодородной почвѣ, которую они нашли далеко отъ той страны, въ которой они родились».

III.

И дѣйствительно, въ Музеумѣ и Политехнической Школѣ или подъ защитою этихъ двухъ учрежденій — этихъ *национальныхъ институтовъ*, какъ ихъ можно было назвать безъ преувеличенія — сосредоточились почти всѣ силы французской науки и столь чистая слава, которою она блистала въ теченіе первой четверти этого столѣтія. Въ Музеумѣ Жофруа-Сентъ-Гилеръ, Кювье, Гаюи и Броніаръ возстановили положеніе естественныхъ наукъ.

Политехническая Школа едва вышла изъ пеленокъ, какъ могла быть уже объявлена въ ученой Европѣ первымъ образовательнымъ учрежденіемъ. По указанію его основателей — Лагранжа, Лапласа, Монжа, Лежандра — избранные изъ ихъ учениковъ, ставшіе соревнователями своихъ учителей, совершили возрожденіе математическихъ и физическихъ наукъ, не уступавшее совершенному Музеумомъ въ наукахъ естественныхъ. Миѣ достаточно назвать знаменитыя имена Прони, Малуса, Біо, Фурье,

Гэ-Люссака, Арраго, Пуассона, Дилонга, Френеля. Всѣ чужіе народы признавали наше превосходство, хотя и они всѣ могли съ гордостью привести имена великихъ знаменитостей: Швеція — Берцеліуса, Англія — Дэви, Италія — Вольты, Германія и Швейцарія — великихъ натуралистовъ и глубокомысленныхъ геометровъ; но нигдѣ, ни въ одной странѣ, они, эти великие люди, память которыхъ сохранить потомство, не были такъ многочисленны, какъ во Франціи. Благодаря Музеуму и Политехнической Школѣ, унаследовавшимъ для точныхъ наукъ то движение идей, которое въ мірѣ политики кончилось революціею 1789 г., одинъ городъ Парижъ насчитывалъ больше изобрѣтателей, чѣмъ ихъ было въ какой-либо другой странѣ міра.

IV.

Мало найдется людей, попимающихъ истинное происхожденіе чудесъ промышленности и народныхъ богатствъ. Какъ одно только доказательство этого, я теперь приведу одно все чаще и чаще употребляемое въ разговорѣ, на офиціальномъ языке, въ разнаго рода статьяхъ, совершенно неподходящее выраженіе — *прикладныя науки*. Кто-то недавно, въ присутствіи одного очень талантливаго министра, выразилъ сожалѣніе, что научныя карьеры бросаются людьми, которые съ успѣхомъ могли бы на нихъ подвизаться. Возражая на это, государственный мужъ старался доказать, что этому не слѣдовало удивляться, *такъ какъ въ настоящее время значеніе теоретическихъ наукъ уступило свое място господству прикладныхъ наукъ*. Нѣть ничего ошибочнѣе этого мнѣнія, нѣть ничего — осмѣлюсь сказать — опаснѣе тѣхъ послѣствій, которыя могутъ возникнуть на практикѣ изъ подобныхъ словъ. Они запечатлѣлись въ моей памяти, какъ очевидное доказательство настоятельной необходимости реформъ, требуемыхъ нашимъ высшимъ образованіемъ. Нѣть, тысячу разъ нѣть, не существуетъ ни одной категоріи наукъ, которой можно было бы дать название *прикладныхъ наукъ*. *Существуютъ науки и примѣненія наукъ*, связанныя между собою, какъ плодъ и родившее его дерево.

Не знаю, какую роль игралъ случай въ зарожденіи промышленныхъ искусствъ на первоначальной ступени общественнаго

развитія, когда человѣкъ появился обнаженнымъ и беззащитнымъ на поверхности земли, не вѣдая еще способа извлеченія и употребленія металловъ, производства стекла и глиняной посуды и проч. Но достовѣрно, что въ наше время въ изобрѣтеніяхъ случаи благопріятствуетъ лишь умамъ, подготовленнымъ къ открытіямъ путемъ усидчивыхъ занятій и упорныхъ трудовъ.

Великія практическія нововведенія, великія усовершенствованія въ промышленности и искусствахъ, даже перемѣны въ отношеніяхъ государствъ — составляютъ результатъ глубокихъ мышленій знаменитыхъ математиковъ, вышли изъ лабораторій ученыхъ физиковъ, знаменитыхъ химиковъ, изъ наблюдений геніальныхъ естествоиспытателей. «Они, эти великія практическія нововведенія — говоритъ Кювье — не болѣе, какъ легкое примѣненія истинъ высшаго порядка, тѣхъ истинъ, которые искались вовсе не съ подобною цѣлью. Творцы этихъ истинъ искали ихъ для нихъ самихъ, увлекаемые единственно жаждою знанія. Тѣ, которые прилагаютъ ихъ къ практикѣ, не открывали ихъ зародышей; тѣ-же, напротивъ, которые открыли эти зародыши, не имѣли возможности предаваться необходимымъ заботамъ, нужнымъ для извлеченія изъ нихъ пользы. Витая въ высокихъ сферахъ, въ которыхъ ихъ переносятъ ихъ размышленія, они едва замѣчаютъ то движеніе, тѣ творенія, которые созидаются изъ сказанныхъ ими нѣкоторыхъ словъ. Эти мастерскія, которые воздвигаются; эти колоніи, которые населяются; эти корабли, которые пересѣкаютъ моря; это изобилие, эта роскошь, это движеніе — все это отъ нихъ исходитъ и все это остается имъ чуждо. Когда доктрина дѣлается достояніемъ практической жизни, они передаютъ ее толпѣ, она ихъ уже болѣе не интересуетъ».

Общественные власти во Франціи съ давнихъ порь не вѣдали этого закона соотношенія между теоретическою наукой и практической жизнью. Будучи, несомнѣнно, жертвою своей политической неустойчивости, Франція ничего не дѣлала, чтобы поддержать, расширить, развить успѣхъ наукъ въ нашей странѣ; она довольствовалась тѣмъ, что подчинялась уже разъ полученному толчку; она жила прошедшими, все считая себя великою-

научными открытиями, потому что она имъ* обязана была своимъ материальнымъ благосостояніемъ, но не замѣчая, что она неблагоразумно даетъ изъякать ихъ источникамъ, въ то время какъ сосѣдние народы, по собственному побужденію, направили эти источники въ свою пользу и, путемъ труда, усилий и благоразумныхъ жертвъ, сдѣлали ихъ плодотворными.

Въ то время, когда Германія увеличивала число* своихъ университетовъ, когда она возбуждала между ними самое спасительное соревнованіе, когда она окружала своихъ профессоровъ и докторовъ почестями и уваженіемъ, когда она учреждала обширныя лабораторіи, снабженныя лучшими инструментами для работы, — Франція, ослабляемая революціями, постоянно занятая бесплодными поисками пайлучшей формы правленія, обращала лишь поверхностное вниманіе на свои учрежденія для высшаго образования.

На той ступени развитія, которой мы достигли и которая обозначается именемъ *новѣйшей цивилизациі*, развитіе наукъ, быть можетъ, еще болѣе необходимо для нравственного благосостоянія народа, нежели для его материальнаго процвѣтанія.

Великія открытия, работа мысли въ искусствахъ, наукахъ и литературѣ, — словомъ, безкорыстныя работы ума во всѣхъ видахъ, образовательные центры, приспособленные для ознакомленія съ ними — вносятъ въ весь соціальный организмъ научный или философскій духъ, этотъ духъ познаванія, который все подчиняетъ строгому разсудку, осуждаетъ невѣжество, разсѣваетъ предразсудки и заблужденія; они поднимаютъ умственный уровень, нравственное чувство; благодаря имъ сама божественная идея распространяется и возвышается.

V.

Я сказалъ, что Музей и Политехническая Школа были, что касается теоретическихъ наукъ, единственными двумя очагами, изъ которыхъ исходилъ свѣтъ на Францію.

И дѣйствительно, наша организація не создала до сихъ поръ другихъ. Высшая Нормальная Школа была долгое время почти исключительно литературной школою, такъ что ея прошлое

вліяніє не можетъ быть принято въ счетъ. Еще очень недавно ея единственнымъ представителемъ въ Академіи Наукъ былъ искусственный физикъ г. Пулье, въ то время какъ въ другихъ отдѣлахъ Института находились въ большомъ числѣ философы, историки и литераторы, которые изъ нея вышли.

Медицина, къ сожалѣнію, представляетъ больше искусство, нежели науку, и потому вліяніе ея факультетовъ на распространеніе знаній не могло быть ощущительнымъ.

Консерваторія Искусствъ и Ремесль содѣйствовала только прогрессу промышленности. Что касается нашихъ факультетовъ, то жизнь въ нихъ всегда отсутствовала по многимъ причинамъ, а, главнымъ образомъ, по отношенію къ наукамъ, по недостатку материальныхъ средствъ. Изъ этого положенія, которое я не разбираю съ точки зрењія создавшой его организаціи, но которое я принимаю, какъ установившійся фактъ со всеми его естественными послѣдствіями, съ очевидностью вытекаетъ, что правительство, изъ опасенія упадка наукъ, должно было употребить всѣ старанія, чтобы создать изъ Музеума, Политехнической Школы и другихъ нашихъ учрежденій безпрерывный разсадникъ ученыхъ и изобрѣтателей.

Только этой цѣною Франція могла бы остаться на высотѣ своей миссіи и сохранить свое первенство, которое она справедливо пріобрѣла и которое въ теченіе пятидесяти или шестидесяти лѣтъ ни одинъ народъ у нея не оспаривалъ. Къ несчастію, ничего подобнаго не имѣло мѣста. *Музей и Политехническая школа не образуютъ большие ученыхъ* — это печальная истина. Эти два учрежденія не перестаютъ имѣть преподавателями знаменитыхъ профессоровъ; чтобы ни происходило, но такая страна, какъ Франція, всегда произведетъ великія научныя индивидуальности, но изъ этихъ учрежденій больше не выходитъ, какъ это когда-то было, людей, преданныхъ свободной работѣ мысли и безкорыстному изученію природы. Когда-то большинство лучшихъ учениковъ Политехнической школы избирало карьеру математическихъ и физическихъ наукъ и высшаго образования. Теперь-же такой фактъ представляется рѣдкимъ.

исключениемъ. Не то, чтобы воспитанниковъ этой великой школы было теперь меньше, чѣмъ прежде, или чтобы они были менѣе способны, чѣмъ ихъ предшественники — Малусы, Пуассоны, Френели — прославить свою страну плодотворными открытиями, но ходъ вещей заставляетъ ихъ внести плоды своихъ трудовъ въ промышленныя операциі, каковы: эксплоатациі минъ, постройка желѣзныхъ дорогъ и проч.

Другаго рода обстоятельства, но находившіяся въ связи съ тою-же непредусмотрительностью и тѣми-же ошибками, также ослабили Музеумъ и уменьшили плодотворность его учебной дѣятельности и его работъ: недостатокъ материальныхъ средствъ, уменьшеніе мѣстъ, уничтоженіе кафедръ, разоренныя галлерей и лабораторіи. Этихъ причинъ было достаточно, чтобы отдѣлить отъ естественныхъ наукъ наиболѣе рѣшительныхъ и способныхъ людей *).

Не уразумѣли, что такое ослабленіе энержіи Политехнической Школы создавало для народа во вредъ наукъ такой пробѣлъ, который могъ имѣть самая гибельныя послѣдствія. Если вы сомнѣваетесь въ правдивости того, что я говорю, то спросите у свѣдущихъ людей, какъ велико число натуралистовъ, которыхъ образовалъ Музей за послѣдніе тридцать лѣтъ и каково число, за этотъ же промежутокъ времени, математиковъ, физиковъ, астрономовъ, химиковъ, вышедшихъ изъ Политехнической Школы. Съ трудомъ можно представить себѣ то состояніе упадка, въ которомъ очутилась-бы въ наше время французская наука, если-бы даровитые люди, образовавшіеся сами по себѣ, безъ офиціальныхъ учителей, каковы. Клодъ Бернаръ, Фуко, Лоранъ и Жераръ, Физо, Девиль, Вурцъ, Бертело, — не явились изъ нѣдръ народа, какъ нѣкогда Шеврель, Дюма, Бусенго и Баларъ.

*.) Вотъ еще черта — одна изъ многихъ — той малой щедрости, которую оказывали наукѣ и знаменитостямъ страны: недавно решено было лишить профессоровъ Музея ихъ квартиръ въ учрежденіи, какъ будто хотѣли затруднить имъ доступъ къ ихъ коллекціямъ и лабораторіямъ и увеличить затрудненія при ихъ работахъ.

VI.

Поверхностные или увлекаемые политическими страстями умы приписываютъ республиканской идеѣ всѣ великия дѣла, совершенныя Конвентомъ или Комитетомъ общественнаго спасенія. Исторія абсолютно отвергаетъ это мнѣніе: спасеніе Франціи было исключительно результатомъ ея научнаго превосходства. И какимъ жалкимъ представляется сравненіе услугъ, оказанныхъ отечеству наукой во время первой революціи и той войны, которая только что кончилась! И еще насколько болѣе омрачается впечатлѣніе, когда подумаешь, что въ 1870 году роли измѣнились въ пользу нашего надменнаго противника!

Опасности, угрожавшія Франціи въ 1792 г., казались одно время выше всякаго возможнаго сопротивленія: вся Европа, вооружившаяся противъ насъ, строгая блокада съ суши и съ моря, междуусобная война, пустые арсеналы, малочисленная или враждебная армія; въ 1870 г. всѣ моря открыты и борьба съ однимъ лишь народомъ. Но, увы, первенство, принадлежащее наукѣ, перемѣстилось! Нашъ соперникъ, не жертвуя ничего на развитіе своего земледѣлія и своей промышленности, отдавая все на нужды наукъ, съумѣль перенести большую часть своего уваженія и своихъ жертвъ на работы ума въ наиболѣе ихъ возвышенной и свободной части, на прогрессъ наукъ во всемъ, что имѣютъ безкорыстнаго, такъ что имя Германіи связано, нѣкоторымъ образомъ, ассоціаціею идей, съ именемъ Университетовъ.

Онъ понялъ, этотъ народъ, что не существуетъ прикладныхъ наукъ, но только примѣненія науки, и что эти примѣненія ничего не значатъ безъ тѣхъ открытій, которыя ихъ пытаютъ, въ то время какъ наши государственные люди въ теченіе пятидесяти лѣтъ, что касается народнаго просвѣщенія, заботились лишь о первоначальномъ и среднемъ образованіи. Они предоставили высшія школы, собственно науку, и высшее образованіе единственно толчку, полученному ими при обновленіи наукъ въ XVIII столѣтіи.

Первоначальное образование можетъ принести счастливые плоды при томъ лишь условіи, если оно вдохновляется высшимъ народнымъ образованіемъ.

VII.

Не будеть-ли съ моей стороны лучшимъ подтверждениемъ вышеприведенныхъ соображеній изложеніе тѣхъ практическихъ результатовъ, которые получились отъ научнаго величія Франціи въ XVIII столѣтіи и отъ ея относительнаго упадка въ XIX-мъ?

Наши несчастія 1870 года еще живы въ памяти у всѣхъ. Поэтому было-бы бесполезно ихъ приводить. Слишкомъ известно, къ несчастію, что не оказалось достойныхъ людей, чтобы привести въ дѣйствіе неизмѣримыя силы народа. Напротивъ, въ 1792 г. Франція, благодаря прогрессу наукъ въ теченіе пятидесяти лѣтъ, предшествовавшихъ революціи, умножила свои силы при помощи генія изобрѣтательности и, въ минуту опасности, нашла людей, которые съумѣли организовать побѣду.

«Конвентъ, говоритъ Араго, издалъ декретъ о наборѣ въ числѣ 900,000 человѣкъ. Нельзя было обойтись меньшимъ числомъ, чтобы противостоять тому урагану, который со всѣхъ сторонъ горизонта обрушился на Францію. Но вслѣдъ за этимъ раздается крикъ отчаянія и вносить уныніе въ умы, самые сильные. Арсеналы оказываются почти пустыми. Едва-ли можно было-бы въ нихъ пайти десятую часть того количества оружія и боевыхъ запасовъ, которое потребуетъ война. Исправить эту непредусмотрительность — другіе считаютъ это разсчитанною измѣною стараго правительства — кажется выше силъ человѣческихъ.

«Порохъ?

«Съиздавна онъ приготавляется во Франціи изъ селитры, привозимой изъ Индіи, а на этотъ источникъ теперь нельзя было расчитывать.

«Боевые пушки?

«Мѣдь входитъ въ видѣ 0,91 части въ смѣсь, изъ которой онъ отливаются; но во Франціи добывается мѣдь въ весьма незначительномъ количествѣ, а Швеція, Англія, Россія, Индія, изъ которыхъ намъ доставляется этотъ металль, для насъ закрыты.

«Сталь?

Она тоже намъ доставляется изъ за-границы; искусство ея приготовленія незнакомо нашимъ заводамъ и мастерскимъ.

На первомъ собраниі избранныхъ ученыхъ, которое было созвано, вопросъ о фабрикаціи пороха, первый по своей важности и затруднительности, омрачилъ умы. Испытанные члены правительства считали его неразрѣшимымъ. «Гдѣ найти селитру?» говорили они съ отчаяніемъ.

«На нашей собственной почвѣ, отвѣтилъ Монжъ не колеблясь: конюшни, погреба, низменная мѣста содержать ея гораздо больше, чѣмъ вы предполагаете». Смѣло оцѣнивъ тогда тѣ безконечные источники, которыми владѣть геній, связанный съ горячимъ патріотизмомъ, Монжъ воскликнулъ: «Дайте намъ земли съ селитрою и черезъ три дня мы зарядимъ пушки!»

Мы также, начиная съ 21-го сентября, слышали подобныя высокія фразы, но вскорѣ онѣ становились смѣшными. Сказанная же Монжемъ — какъ замѣчаетъ Араго — такъ и осталась великою.

«Во вѣкъ концы республики разосланы были въ большомъ количествѣ толковыя и простыя инструкціи, и всякий гражданинъ могъ заняться дѣломъ, которое до того считалось ужасно труднымъ.

«Франція превратилась въ пороховой заводъ.

«Металлъ колоколовъ представляетъ сѣмь мѣди и олова, но въ пропорціяхъ, не подходящихъ для производства военнаго оружія. Химія нашла новые способы разъединить эти два металла.

«Искусство приготовленія стали было неизвѣстно, его создаютъ. Сабля, шпага, штыкъ, копье, ружейное огниво — отнынѣ будутъ фабриковаться изъ французской стали.

«Выдѣлка кожи, необходимой для обуви, требовала цѣлыхъ мѣсяцевъ работы; такие длинные сроки не согласовались съ нуждами нашихъ солдатъ, и кожевенное производство получаетъ неожиданныя усовершенствованія; отнынѣ вместо мѣсяцевъ потребуются лишь дни.

«Воздушный шаръ былъ до 1794 г. простымъ предметомъ любопытства; во время битвы при Флерусѣ шаръ подыметъ генерала Морло въ область тучъ; оттуда будутъ слѣдить за малѣйшими маневрами непріятеля и тотчасъ ихъ отмѣтить, и

такимъ образомъ чисто французское открытие обеспечить блестя-
щее торжество нашему оружію.

«Первые идеи о воздушномъ телеграфѣ, одинаковыми об-
разомъ принадлежащи французу, усовершенствованы, расширены,
примѣнены и, съ этого момента приказы достигнуть армій въ
нѣсколько минутъ».

Таковы тѣ чудеса, который гений знанія и патріотизмъ
воспроизвели на свѣтѣ во время французской революціи. Два
члена Института, Монжъ и Карно, при содѣйствіи знаменитыхъ
коллегъ, Фуркруа, Гюптона де-Марво, Бертоле и др., были
душою этого бессмертного ряда работъ.

О мое отечество! Ты, которое столь долго держало ски-
петръ мысли, почему ты стало безучастно къ своимъ благород-
нѣйшимъ твореніямъ? Они суть божественный факель, освѣща-
ющій міръ, живой источникъ всѣхъ великихъ чувствъ, противо-
вѣсь увлеченіямъ материальными благами.

Природное варварство и дикая надменность твоихъ враговъ
сдѣлали изъ нихъ орудіе ненависти, опустошенія, рѣзни. Въ
твоихъ рукахъ они были источникомъ свѣта для человѣчества,
и, въ моментъ крайней опасности, ты видѣло-бы появление
вдохновенныхъ ими организаторовъ, подобныхъ Карно, и полко-
водцевъ, еще болѣе искусныхъ, нежели лейтенанты Бонапарте.

Мартъ 1871 г.

Л. Пастеръ,
(изъ Института.)



Приложение 4-ое.

Рѣчъ Пастера,

произнесенная на международномъ конгрессѣ врачей въ Лондонѣ,

въ Августъ 1881 г.

Господа!

Я чувствую себя по истинѣ счастливымъ, что за благосклонный приемъ, которымъ Вы меня удостоили, могу Васъ отблагодарить сообщеніемъ о новомъ шагѣ впередъ въ изученіи микроорганизмовъ въ приложеніи къ предупрежденію заразныхъ болѣзней, сопровождающихся столь ужасными послѣствіями, какъ для человѣка, такъ и для животныхъ. Предметъ моего сообщенія составятъ предохранительная прививка по отношенію къ куриной холерѣ и сибирской язвѣ и изложеніе того метода, при помощи котораго мы пришли къ высшей степени важнымъ результатамъ, и плодотворность котораго внушиаетъ мнѣ безграничныя надежды.

Прежде чѣмъ перейти къ обсужденію вопроса о вакцинѣ сибирской язвы, позвольте мнѣ напомнить Вамъ о результатахъ моихъ изслѣдований надъ куриной холерой — тѣхъ самыхъ изслѣдований, путемъ которыхъ были внесены въ науку новые и крайне важные принципы, касающіеся яда (вируса) или заразныхъ свойствъ передаваемыхъ болѣзней.

И такъ, возьмемъ курицу, которой предстоитъ умереть отъ птичьей холеры, и обмакнемъ въ кровь ея кончикъ весьма тонкой стеклянной палочки, соблюдая при этомъ всѣ обычныя предосторожности. Затѣмъ, прикоснемся этимъ кончикомъ палочки въ куриному бульону, къ совершенно прозрачной жидкости, предварительно нагревавшейся до 115° Ц. для умерщвленія въ ней всякихъ низшихъ организмовъ и постановленной въ такія условія, въ которыхъ ни наружный воздухъ, ни употребляемые для опыта сосуды не могли внести никакихъ постороннихъ зародышей, находящихся, какъ известно, въ воздухѣ и на поверх-

ности всѣхъ предметовъ. Если затѣмъ этотъ маленький культурный сосудъ помѣстить въ температуру 25—35° Ц., то вскорѣ Вы увидите, что жидкость становится мутной и переполняется микроорганизмами, имѣющими форму, похожую на 8, и столь малую величину, что они представляются точками даже при крайне сильныхъ увеличеніяхъ. Возьмите изъ этого сосуда самую маленькую каплю — напримѣръ, не болѣе той, которая можетъ помѣститься на острѣ стеклянной палочки, толщиною въ обыкновенную швейную иглу — и перенесите ее въ новую порцію стерилизованаго куришаго бульона, находящагося въ другомъ сосудѣ; послѣдуетъ тѣ-же самыя явленія, какія Вы наблюдали въ первомъ сосудѣ. Подобнымъ-же образомъ Вы поступаете съ третьимъ культурнымъ сосудомъ, съ четвертымъ и такъ далѣе до сотаго или даже до тысячнаго — и неизмѣнно во всѣхъ случаяхъ по прошествіи нѣсколькихъ часовъ культурная жидкость становится мутною и наполняется тѣми же самими мельчайшими организмами. Въ концѣ двухъ или трехдневнаго стоянія при температурѣ около 30° Ц., мутность бульона исчезаетъ, и на днѣ сосуда образуется осадокъ. Это означаетъ, что развитіе микроорганизмовъ прекратилось. Другими словами, всѣ маленькия точки, обусловливавшія мутный видъ жидкости, упали на дно. Положеніе вещей остается въ этомъ видѣ, безъ всякихъ замѣтныхъ измѣненій въ жидкости или осадкѣ, въ теченіе болѣе или менѣе продолжительнаго времени — въ теченіи даже цѣлыхъ мѣсяцевъ — если только Вы приняли мѣры, необходимыя для исключенія доступа постороннихъ зародышей изъ атмосферы.

Возьмемъ теперь одинъ изъ нашего ряда культурныхъ препаратовъ — напримѣръ, сотый или тысячный — и сравнимъ ядовитость его съ ядовитостью крови птицы, умершѣй отъ холеры. Другими словами, привѣмъ подъ кожу, напримѣръ, десяти курамъ, каждой по капелькѣ заразительной крови, и десяти другимъ — по такому же количеству культурной жидкости, предварительно взболтавъ послѣднюю для поднятія осадка со дна сосуда. Передъ нами произойдетъ тогда нѣсколько странное явленіе. Послѣднія десять куръ умрутъ столь же быстро и съ

тѣми же самыми симптомами, какъ и первыя десять птицъ; и въ крови у всѣхъ у нихъ послѣ смерти будетъ открыто присутствіе однихъ и тѣхъ же заразныхъ организмовъ. Это равенство въ ядовитости культурнаго препарата и крови зависитъ повидимому отъ ничтожнаго обстоятельства: можно приготовить описаннымъ образомъ хоть сотню культуры, лишь-бы не оставлялся сколько нибудь значительный промежутокъ времени между производствомъ отдѣльныхъ посѣвовъ. И вотъ, въ этомъ-то и заключается причина упомянутаго равенства въ ядовитости.

Повторимъ тѣперь тѣмъ же самымъ образомъ наши послѣдовательныя культуры, съ тѣмъ только единственнымъ различиемъ, что будемъходить отъ одной культуры къ слѣдующей за ней — скажемъ, отъ сотой къ сто первой, — съ промежутками въ двѣ недѣли, мѣсяцъ, два мѣсяца, три мѣсяца или десять мѣсяцевъ. Если теперь мы сравнимъ ядовитость послѣдовательныхъ культуръ, то мы откроемъ огромную перемѣну. Сдѣлавъ прививки десяти курамъ, мы вскорѣ убѣдимся, что если между засѣваніями одной культурной жидкости микроорганизмами другой протекаетъ достаточно долгій промежутокъ времени, ядовитость данной культуры бываетъ совершенно отлична отъ ядовитости крови и отъ ядовитости предыдущей культуры. Мало этого: мы найдемъ еще, что этимъ способомъ мы можемъ приготавлять культуры, имѣющія различную степень ядовитости. Такъ, одинъ препаратъ будетъ убивать восемь куръ изъ десяти, другой — пять изъ десяти, третій — одну изъ десяти, а иной и вовсе не убьетъ ни одной, хотя микроорганизмы сохранять еще свою способность культивироваться. Если Вы возьмете теперь каждую изъ этихъ культуръ, обладающихъ ослабленной ядовитостью, и сдѣлаете ее исходной точкой для приготовленія послѣдующихъ культуръ, не оставляя при этомъ значительныхъ промежутковъ между посѣвами, то цѣлые ряды такихъ культуръ будутъ воспроизводить ту самую степень ядовитости, которая принадлежала препаратору послужившему исходною точкою для данного ряда посѣвовъ. Такимъ образомъ, если ядовитость исходнаго препарата равнялась нулю, то Вы получите отъ него и неядовитый рядъ культуръ.

Какимъ же образомъ, спрашивается, проявляются эффекты этой ослабленной ядовитости препаратовъ, при прививкѣ послѣднимъ курамъ? Они проявляются въ видѣ мѣстнаго разстройства, въ видѣ болѣе или менѣе глубокаго болѣзниеннаго измѣненія въ мышцѣ, если прививка была сдѣлана въ мышцу. Мышица наполняется микроорганизмами, разпознаніе которыхъ весьма легко, ибо ослабленные микробы имѣютъ почти ту же величину, форму и видъ, какъ и самые ядовитые. Но почему же это мѣстное разстройство не влечетъ за собою смерти? На этотъ вопросъ отвѣчу пока простымъ указаниемъ фактъ, которые таковы: мѣстное разстройство болѣе или менѣе быстро прекращается само собою; микроорганизмы всасываются и, такъ сказать, перевариваются, и мышцы мало по малу возвращаются къ своему нормальному состоянію. Заболѣваніе, словомъ, исчезаетъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда мы прививаемъ микробы, ядовитость которыхъ равна чулю, не бываетъ даже и мѣстнаго разстройства.

Шагъ далѣе, и мы приблизимся къ принципу вакцинаціи. Если курамъ, заболѣвшимъ отъ прививки ослабленного яда, развитіе котораго остановлено длительнымъ сопротивленіемъ, привить сильно ядовитый микробъ, то онъ не претерпѣваютъ никакихъ особенно дурныхъ послѣдствій, или обнаруживаются явленія только переходящаго характера. Онъ уже болѣе не умираютъ отъ дѣйствія смертоноснаго яда, и въ теченіи довольно продолжительнаго времени, который можетъ превосходить даже годовой срокъ, остаются застрахованными отъ куриной холеры — особенно при тѣхъ обычныхъ условіяхъ, при которыхъ контагій существуетъ въ курятникахъ. Что же такое происходитъ въ этомъ критическомъ пункѣ нашихъ опытовъ, то есть, въ тотъ промежутокъ времени, который мы оставляемъ между двумя послѣдовательными культурами и который обусловливаетъ ослабленіе яда? Я покажу Вамъ, что агентомъ, дѣйствующимъ въ теченіи этого промежутка, является ничто иное какъ кислородъ воздуха. Нѣть ничего легче какъ доказать Вамъ это. Стоитъ только произвести культуру въ трубочкѣ, содержащей весьма мало воздуха и запаять эту трубочку на спиртовой лампѣ. Развиваясь, микробъ быстро поглотить

весь кислородъ, содержащійся въ трубочкѣ и жидкости, послѣ чего онъ останется въ всяко го соприкосновенія съ кислородомъ. При подобныхъ условіяхъ, ядовитость микроорганизма не ослабляется даже послѣ истеченія весьма продолжительного времени. Кислородъ воздуха, стало быть, является вѣроятнымъ агентомъ, видоизмѣняющимъ ядовитость микроорганизма куриной холеры, то есть онъ можетъ болѣе или менѣе видоизмѣнять легкость развитія этого микробы въ тѣлѣ животнаго. Не находится ли здѣсь передъ нами общий законъ, приложимый къ заразнымъ ядамъ всякаго рода? Если да, то мы можемъ надѣяться открыть этимъ путемъ предохранительную вакцину противу всѣхъ заразныхъ болѣзней. И съ этими надеждами мы начали наши изслѣдованія съ вакцины той болѣзни, которая во Франціи называется *charbon*, въ Англіи — *splenic fever*, въ Россіи — сибирской язвой, въ Германіи — *Milzbrand*.

Въ самомъ началѣ нашихъ работъ мы встрѣтились съ однимъ затрудненіемъ. Не всѣ низшіе организмы развиваются тѣ зародышевыя тѣльца, на которыхъ я первый указалъ, какъ на одну изъ формъ ихъ возможнаго развитія. Многіе заразные микробы не даютъ этихъ зародышевыхъ тѣлецъ или споръ при культивировкѣ! Сюда относятся пивныя дрожжи, которыхъ обыкновенно, напр., въ пивоварняхъ — развиваются только путемъ особаго дѣленія или почкованія. Изъ одной клѣтки образуются двѣ или болѣе, которыхъ соединяются въ видѣ гирляндъ или четокъ; клѣтки отдѣляются одна отъ другой и процессъ возобновляется. Въ этихъ клѣткахъ обыкновенно не видно настоящихъ зародышей. Сюда же принадлежать микробы куриной холеры и многихъ другихъ болѣзней, такъ что культуры этихъ микроорганизмовъ, хотя они и могутъ существовать по цѣлымъ мѣсяцамъ, не утрачивая способности къ новымъ культивировкамъ, въ концѣ концовъ погибаютъ подобно пивнымъ дрожжамъ, какъ скоро истощился запасъ веществъ, служившихъ для ихъ питанія. Весьма отлично отъ этого ведетъ себя въ искусственныхъ культурахъ микроорганизмъ сибирской язвы. Въ крови животныхъ, какъ и въ культурахъ она встрѣчается въ видѣ прозрачныхъ болѣе или менѣе сегментированныхъ нитей. Эта кровь или эти культуры, при

выставлениі на воздухъ, вмѣсто того, чтобы продолжать размноженіе по этому способу, по истечениі сорока восьми часовъ обнаруживаются присутствіе зародышевыхъ тѣлецъ, располагающихся вдоль нитей болѣе или менѣе правильными рядами. Все вещество вокругъ этихъ тѣлецъ всасывается. Мало-по-малу всякая связь между ними исчезаетъ, и они вскорѣ превращаются въ простую зародышевую пыль. Если Вы посѣте эти тѣльца, то новая культура воспроизведетъ ядовитость, свойственную той нитевидной формѣ, которая дала эти споры, и такой результатъ будетъ представляться Вашему наблюденію даже и послѣ продолжительного соприкосновенія этихъ зародышей съ воздухомъ. Недавно мы открыли ихъ въ ямахъ, въ которыхъ двѣнадцать лѣтъ тому назадъ были зарыты трупы животныхъ, умершихъ отъ сибирской язвы, и культура ихъ обладала столь же ядовитыми свойствами, какъ и посѣвъ микробовъ изъ недавно умершихъ животныхъ.

Къ моему крайнему сожалѣнію, недостатокъ времени меня вынуждаютъ ограничить свои замѣчанія въ этомъ направленіи простымъ указаніемъ, что микробы сибирской язвы, содержавшіеся въ ямахъ, въ которыхъ были зарыты погибшія животныя, выносятся земляными червями на поверхность земли и что въ этомъ фактѣ мы и находимъ всю этиологію болѣзни: пасущіеся животные со своимъ кормомъ, проглатываютъ также и микробовъ.

При попыткѣ примѣнить къ микробу сибирской язвы нашъ методъ ослабленія яда при помощи кислорода воздуха, мы наталкиваемся на большое затрудненіе. Такъ какъ ядовитость въ спорахъ антракса, ускользающихъ отъ дѣйствія воздуха, устанавливается весьма быстро, часто по истечениі уже двадцати четырехъ часовъ, то нечего было и думать объ открытіи вакцины сибирской язвы при тѣхъ условіяхъ, которые дали вакцину куриной холеры. Совершенно отчаявшись, однако, было не зачѣмъ. Въ самомъ дѣлѣ, при болѣе внимательномъ наблюденіи оказывается, что дѣйствительной разницы между способомъ размноженія микробы сибирской язвы путемъ дѣленія и способомъ размноженія микробы куриной холеры вовсе не существуетъ. Слѣдовательно, можно было надѣяться, что мы съумѣемъ преодо-

лѣть остановившее насъ затрудненіе, попытавшись воспрепятствовать микроорганизму сибирской язвы производить зародышевыя тѣльца, и затѣмъ держать его въ этомъ состояніи въ соприкосновеніи съ кислородомъ въ теченіи цѣлыхъ дней, недѣль, мѣсяцевъ. Попытка увѣничалась полнымъ успѣхомъ. Въ нейтральномъ куриномъ бульонѣ микроорганизмъ сибирской язвы теряетъ способность размножаться при температурѣ въ 45° Ц. Но при 42° или 43° Ц. его развитіе происходитъ очень легко, при чѣмъ, однако, онъ уже не производить споръ. Отсюда является возможность держать въ соприкосновеніи съ чистымъ воздухомъ, при температурѣ 42 или 43° Ц. состоящую изъ нитей культуру бактеридій, остающуюся совершенно свободною отъ споръ. Тогда получаются слѣдующіе крайне замѣчательные результаты. Черезъ мѣсяцъ или шесть недѣль культура умираетъ. То есть, если перенести ее въ свѣжую порцію бульона, то послѣдній останется совершенно безплоднымъ. До этого времени жизнь въ сосудѣ, подвергаемомъ дѣйствію воздуха и теплоты, продолжаетъ существовать. Если мы будемъ продолжать изслѣдованіе ядовитости культуры въ концѣ двухъ сутокъ, четырехъ, шести, восьми дней и т. д., то мы найдемъ, что еще за долго до умирания культуры, микробъ уже утратилъ всю свою ядовитость, хотя онъ все еще остается способнымъ къ культивировкоѣ. До наступленія такого периода, мы найдемъ, что культура представляетъ рядъ ослабленныхъ ядовитостей. Все оказывается сходнымъ съ тѣмъ, что происходитъ съ микроорганизмомъ куриной холеры. При этомъ, каждая изъ этихъ степеней ослабленія ядовитости можетъ быть воспроизведена культивировкою. И такъ какъ сибирская язва не рецидивируетъ, то каждый изъ нашихъ ослабленныхъ микробовъ составляетъ родъ вакцины по отношенію къ болѣе ядовитому микроорганизму, то есть, представляетъ ядъ, способный производить заболѣваніе въ болѣе легкой степени.

И такъ, мы обладаемъ методомъ приготовленія вакцины сибирской язвы. Вскорѣ Вы оцѣните практическую важность этого результата; но еще важиѣ другая сторона дѣла: въ этомъ частномъ примѣрѣ Вы можете видѣть доказательство того,

что мы овладѣли теперь общимъ методомъ приготовлениія вакцинъ разныхъ заразныхъ болѣзней — методомъ, основывающимся на дѣйствіи кислорода воздуха, т. е. космической силы, существующей на всей поверхности земного шара. Къ сожалѣнію, по недостатку времени я не могу показать Вамъ, что всѣ эти ослабленныя формы яда весьма легко можно заставить, при помощи извѣстныхъ физіологическихъ приемовъ, возстановить всю ихъ первоначальную максимальную ядовитость.

Едва успѣль сдѣлаться извѣстнымъ только что изложенный мною методъ полученія вакцины сибирской язвы, какъ онъ уже нашелъ себѣ весьма обширное примѣненіе для предупрежденія этой грозной эпизотіи. Во Франціи мы ежегодно теряемъ животныхъ отъ сибирской язвы на сумму двадцати миллионовъ франковъ. Ко мнѣ обратились съ просьбой публично демонстрировать сообщенные мною выше результаты. Разскажу Вамъ этотъ опытъ въ нѣсколькихъ словахъ. Въ мое распоряженіе было доставлено пятьдесятъ овецъ; двадцати пяти изъ нихъ я сдѣлалъ прививку вакцинъ сибирской язвы. Двѣ недѣли спустя всѣмъ пятидесяти животнымъ была сдѣлана прививка самыхъ ядовитыхъ сибираязвенныхъ микробовъ. Двадцать пять вакцинированныхъ устояли противу зараженія; двадцать пять не вакцинированныхъ умерли отъ сибирской язвы въ теченіемъ пятидесяти часовъ. Съ того времени я съ крайнимъ трудомъ усиливаю удовлетворять требованіямъ фермеровъ относительно снабженія ихъ вакцинами. Въ теченіи пятьнадцати дней мы привили въ департаментъ Сены вокругъ Парижа болѣе 20,000 овецъ и большое число рогатаго скота и лошадей.

Въ скорости будутъ обнародованы мои опыты касательно еще другихъ двухъ заразныхъ ядовъ, ослабленныхъ подобными же средствами.



Объ ослаблениі заразъ.

Рѣчъ, читанная на Международномъ Гигиеническомъ Конгрессѣ
въ Женевѣ,

5-го Сентября 1882 года.

Гг. Распорядительный комитетъ настоящаго конгресса, зная, что я долженъ провести вакационное время въ Юрѣ, въ нѣкоторыхъ часахъ юзды отъ вашего прекраснаго города Женевы, былъ такъ обязателенъ, что пригласилъ меня сдѣлать вамъ сообщеніе *объ ослаблениі заразѣ*. Я охотно принялъ это предложеніе считая себя счастливымъ тѣмъ, что могу провести нѣкоторое время среди народа, дружественнаго Франціи, какъ въ хорошіе, такъ и въ дурные дни. Я, кромѣ того, питалъ надежды встрѣтить здѣсь противниковъ моихъ работъ за послѣдніе годы. Если конгрессы представляютъ собою почву для сближенія и примиренія, то они въ одинаковой степени представляютъ удобное мѣсто для учитывыхъ споровъ. Насъ всѣхъ воодушевляетъ одно высшее стремленіе — къ прогрессу и истинѣ.

Гг. Вамъ извѣстно, что наши свѣдѣнія о заразахъ въ послѣднее время обогатились драгоценными данными, получившими начало въ тѣхъ изслѣдованіяхъ, которыя мною опубликованы въ 1880 году о микробѣ болѣзни, называемой *куриной холерою*.

Зараза, даже будучи обусловлена микробомъ, можетъ, безъ явно выраженной перемѣны въ общей морфологіи послѣдняго, быть ослаблена въ своей заразительности, сохранять эту ослабленную заразительность въ культурахъ, производить зародыши и сообщать въ своемъ новомъ видѣ легкопроходящую болѣзнь, способную предохранять отъ смертельной болѣзни, присущей дѣйствію этой заразы въ ея естественномъ, неослабленномъ состояніи.

Это драгоценное видоизменение свойствъ заразы можетъ быть вызвано простымъ дѣйствіемъ кислорода воздуха. Дѣйствіе это, впрочемъ, различно, смотря по температурѣ, при которой оно происходитъ, и по средѣ, въ которой заключается зараза и въ которой она зародилась.

Эти факты, константированные вначалѣ для микробы куриной холеры, оправдались потомъ и на микробѣ сибирской язвы въ рядѣ изслѣдований, произведенныхъ мною при помощи моихъ сотрудниковъ Шамберлана и Ру. При температурѣ $+ 16^{\circ}$, а также при температурѣ $+ 43^{\circ}$ Цельзія (температурахъ, близкихъ къ тѣмъ, при которыхъ культура *бацилла* дѣлается невозможна) этотъ бациллъ болѣе не даетъ споръ въ различныхъ бульонахъ для культуры, напр. въ куриномъ бульонѣ. Соприкосновеніе его съ воздухомъ при этихъ температурахъ, особенно при $+ 42^{\circ}$ и $+ 43^{\circ}$, прогрессивно ослабляетъ его изо дня въ день, уничтожаетъ въ немъ всю его заразительность и даже доводитъ до совершенной погибели, дѣлая его непослѣднимъ къ дальнѣйшей культурѣ.

Что ослабленіе микробы куриной холеры слѣдуетъ приписать дѣйствію кислорода воздуха, тому вѣрнымъ доказательствомъ можетъ служить слѣдующій весьма простой способъ. Нужно сравнить силу культуръ, сохраненныхъ въ соприкосновенія съ кислородомъ, съ подобными же культурами, подвергшимися дѣйствію воздуха. Послѣднія погибаютъ въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, послѣ того какъ онѣ прошли различныя фазы ослабленія, между тѣмъ какъ культуры, сохранившіяся въ соприкосновенія съ воздухомъ, въ закрытыхъ трубочкахъ, обнаруживаются, даже послѣ нѣсколькихъ лѣтъ, весьма большую заразительность этого микробы.

Свойства *bacillus anthracis*, или микробы сибирской язвы, во многихъ отношеніяхъ отличаются отъ свойствъ микробы куриной холеры. Благодаря этому, онъ не такъ поддается наблюденіямъ касательно дѣйствія кислорода, о которыхъ я только что говорилъ. Причина этого кроется въ томъ обстоятельствѣ, что микробъ сибирской язвы, въ формѣ нитей, быстро погибаетъ, будучи заключенъ въ трубкѣ въ соприкосновенія съ воздухомъ.

Возможно, однако, обойти это затруднение и сдѣлать очевиднымъ вліяніе воздуха на заразительность сибириязвенного микробы слѣдующимъ пріемомъ. Предположимъ, что мы засѣваемъ бульонъ и распредѣляемъ его по закрытымъ трубочкамъ, которыхъ сохраняются въ помѣщениіи съ температурою 42° — 43° , и что смерть въ трубочкахъ наступаетъ на 6-ой день, въ чёмъ можно легко убѣдиться, засѣвая ежедневно одну изъ трубочекъ. Ничто тогда не препятствуетъ намъ произвести на 5-ый день, наканунѣ смерти закрытыхъ трубочекъ, новую культуру, также виѣ соприкосновенія съ воздухомъ, которая также будетъ сохраняться при температурѣ 42° — 43° . Если новая культура погреется также на 6-ой день, то можно приготовить третью, которая потомъ опять распредѣляется въ закрытыхъ трубочкахъ, изъ которыхъ на 5-ый день опять будетъ сдѣланъ посевъ и т. д. Въ тоже время, какъ производится рядъ этихъ послѣдовательныхъ культуръ виѣ соприкосновенія съ воздухомъ, приготавливаютъ параллельно культуры въ флаconахъ въ соприкосновеніи съ воздухомъ.

Сравнимъ тогда заразительность закрытыхъ трубочекъ съ заразительностью культуръ, тѣхъ же дней, но которыхъ подвергались соприкосновенію съ воздухомъ. Не трудно удостовѣриться, что заразительность культуры, подвергшихся соприкосновенію съ воздухомъ, болѣе или менѣе ослаблена и не можетъ причинить смерти морскимъ свинкамъ, тогда какъ культуры въ закрытыхъ трубкахъ ихъ убиваютъ.

Вліяніе кислорода воздуха на ослабленіе сибириязвенного микробы, стало быть, также неоспоримо, какъ и его вліяніе на микробъ куричной холеры. Это вліяніе кислорода на ослабленіе сибириязвенного микробы представляеть, кромѣ того, одну замѣчательную особенность. Извѣстно, что г. Туссэнъ обнаружилъ ослабленіе этого микробы однимъ дѣйствіемъ высокой температуры, и что такимъ способомъ можно добыть вакциныя бактеридіи; но мы нашли, что эти бактеридіи не сохраняютъ въ своихъ культурахъ своей первоначальной ослабленности. Уже первая культура изъ согрѣтой крови становится заразительной и смертоносною. Напротивъ того, бактеридіи, ослабленныя дѣй-

ствіемъ кислорода, сохраняютъ свою ослабленность въ своихъ культурахъ. Это отличіе имѣть большую важность и ему нужно приписать трудность практическаго примѣненія метода г. Туссена. Мы вовсе не раздѣляемъ противнаго мнѣнія, высказанаго недавно г. Шово въ сообщеніи, сдѣланномъ въ Академіи Наукъ. Съ другой стороны, ничего неѣть менѣе надежнаго и менѣе правильнаго, какія-бы предосторожности ни были приняты, какъ дѣйствіе высокой температуры на сибире-язвенную кровь, — даже тогда, если температура была-бы постоянная и слой крови быль-бы очень тонкій.

Главная цѣль сообщенія, которое я имѣю честь вамъ дѣлать, заключается въ представлениі новыхъ примѣровъ ослабленія заразъ отъ дѣйствія кислорода и доказать, что мы имѣемъ дѣло съ общимъ методомъ ослабленія пѣкоторыхъ заразъ. Я начну съ одного микробы, который въ первый разъ обнаружился при обстоятельствѣ одинаково интересномъ, какъ и любопытномъ.

Въ изслѣдованіяхъ, о которыхъ я собираюсь говорить, я одинаковымъ образомъ имѣлъ своими сотрудниками Шамберлана и Ру и, кромѣ того въ особенности, Тюлье. Я говорю отъ ихъ имени и моего.

10-го декабря 1880 г. я былъ приглашенъ докторомъ Ланелонгомъ, хирургомъ госпиталя Св. Евгентіи, осмотрѣть бѣднаго ребенка пяти лѣтъ, пораженнаго собачьимъ бѣшенствомъ. Онъ былъ укушенъ за мѣсяцъ до того въ лицо бѣшеннай собакою. Четыре часа послѣ его смерти, послѣдовавшей 11-го декабря, мы сдѣлали прививку двумъ кроликамъ слизью, взятой съ нѣба и разведенной въ водѣ: кролики погибли, меныше чѣмъ черезъ тридцать шесть часовъ. Въ ихъ крови мы открыли особынаго микробы, способнаго культивироваться въ чистомъ видѣ, послѣдовательныя культуры котораго убиваютъ кроликовъ, при постоянномъ присутствіи того-же микробы въ крови.

Посмертныя измѣненія состоять въ частномъ расширеніи венозной системы, въ напуханіи желѣзъ паховыхъ, подмышковыхъ и бронхиальныхъ, каковыя желѣзы принимаютъ красный цвѣтъ. Дыхательное горло всегда покрыто кровоподтеками. Небольшое количество слюны овлажняетъ губы и стекаетъ съ нихъ.

Легкія, вообще отечныя, представляются иногда въ состояніи тенатизаціи. На мѣстѣ прививки, сдѣланной въ кожу живота, въ подкожную клѣтчатку, эта послѣдняя представляется слегка отечною и эмфизематозною.

Въ одномъ опыте, сдѣланномъ съ цѣлью опредѣлить моментъ появленія заразы организма въ крови, видно было, какъ, девять часовъ послѣ прививки, засѣянная кровь культивировала микробъ болѣзни, но подъ микроскопомъ онъ еще не былъ видѣнъ: но двѣнадцать часовъ послѣ прививки онъ уже открывался при помощи этого инструмента. Лихорадка обнаруживалась, какъ только показывался микробъ; смерть слѣдовала тридцать пять часовъ послѣ прививки. Температура спускалась ниже 40° только за два часа передъ смертью. Животное вѣсило $1^{\text{кг}}\ 920$ — въ моментъ прививки; $1^{\text{кг}}\ 730$ — въ моментъ смерти. Всѣ уменьшился на 190 граммовъ въ тридцать пять часовъ.

Слюна умершихъ кроликовъ передаетъ безразлично болѣзнь новымъ кроликамъ.

Молодыя морскія свинки переносятъ превосходно прививку этого микроба; но онъ убиваетъ въ два или три дня морскихъ свинокъ, имѣющихъ лишь иѣсколько дней отъ роду. Дѣлая послѣдовательно прививки отъ одной молодой свинки къ другой, можно усилить заразу и легко достигнуть того, что возможно будетъ убить свинку 1, 2, 3, 4 мѣсяцевъ.... У первыхъ свинокъ подкожная клѣтчатка вокругъ мѣста прививки представляетъ кровянистую отечность, часто плотную и желатинообразную; подлежащіе мускулы жирно-перерождены, пропитаны гноемъ, утолщены. Замѣчательно, что, по мѣрѣ того какъ въ послѣдовательныхъ прививкахъ переходишь отъ одного къ другому привитому животному, наблюдаемыя поврежденія меняютъ свой характеръ. Желатинообразное перерожденіе клѣтчатки, гнойное пропитываніе подлежащихъ мышцъ исчезаютъ и даютъ мѣсто развитію сильной красноты этихъ мышцъ. Наблюдая эти особенныя условія усиленія заразы, можно было бы подумать, что морская свинка погибла отъ острой септицеміи. Микроскопическій организмъ въ изобилии находится въ мышцахъ, напротивъ очень мало въ крови и часто въ такомъ маломъ количествѣ, что его не всегда

можно отыскать подъ микроскопомъ. Оно кажется, какъ будто микробъ вслѣдствіе усиленія заразительности перемѣнилъ мѣсто своего пребыванія. При этомъ обнаруживается еще обстоятельство, въ высшей степени интересное: когда заразительность микробы усилилась переходомъ черезъ морскія свинки, то оказывается, что при прививкѣ его кроликамъ, онъ на нихъ меньше дѣйствуетъ. Это не единственный микробъ, который обнаруживаетъ подобные свойства.

Мы сообщили Парижской Медицинской Академіи о существованіи этого микробы 18-го января 1881 г.

Конечно, тогда можно было видѣть, какія услуги можетъ оказать изученіе микробовъ медицинской этиологии. Въ то-же время, какъ мы занялись изученіемъ этого патогенного микробы, д-ръ Морисъ Рено, блаженной памяти, съ своей стороны также занялся, совмѣстно съ д-ромъ Лапелоонгомъ, опытами зараженія кроликовъ слюною ребенка, умершаго отъ бѣшенства въ больнице Св. Евгентія. Какъ и мы, онъ получилъ смерть привитыхъ животныхъ; но, основываясь всецѣло на клиническомъ наблюденіи и оставляя въ сторонѣ возможность дѣйствія микробовъ, которая могли быть введены вмѣстѣ съ заразою бѣшенства, онъ заключилъ, что кроликамъ сообщалось бѣшенство. «Пока мы не будемъ имѣть доказательства противнаго», сказалъ онъ, «мы будемъ вѣрить, что наши кролики умерли отъ бѣшенства».

Г. Гальте сообщилъ, что онъ привилъ бѣшенство отъ собаки кролику и заявилъ, что средняя продолжительность инкубационного периода равняется 18 дніямъ. Кролики д-ра Мориса Рено умирали гораздо скорѣе: средняя продолжительность, отъ момента прививки до смерти, не перевышала сорока пяти часовъ. Эта разница не вредила заключенію г. Мориса Рено. Такъ какъ онъ, въ своихъ опытахъ, передавалъ кролику бѣшенство не отъ собаки, а отъ человѣка, то онъ этому обстоятельству приписывалъ разницу въ продолжительности инкубационного периода.

Еще до этого, 27-го октября 1879 года, г. Морисъ Рено сообщалъ о томъ, что ему удалось передать кроликамъ при помощи прививокъ бѣшенство отъ человѣка. Это первое заключеніе не отличалось болѣею точностью, нежели то,

о которомъ я только что говорилъ. Но не потому, что не было бы очень легко передавать бѣшенство отъ человѣка собакѣ или кролику — намъ это часто удавалось — но уже въ то время г. Морисъ Рено имѣлъ въ своихъ рукахъ, самъ о томъ не вѣдая, кроликовъ, погибшихъ отъ новаго микроба.

Однако, если быстрая смерть кроликовъ въ этихъ различныхъ опытахъ причинялась новымъ микробомъ, то можно было себѣ задать вопросъ, не находится ли этотъ микробъ въ какомъ-либо скрытомъ соотношениіи съ настоящимъ микробомъ бѣшенства. Развѣ не было странно это слюнотеченіе у нашихъ кроликовъ и то, что ихъ слюною, привитою новымъ кроликамъ, вызывались легко заболѣваніе и смерть?

Кромѣ того, представлялось интереснымъ изслѣдоватъ, не обнаружится ли эта самая заразительность, замѣченная въ слюнѣ ребенка, умершаго отъ бѣшенства въ больницѣ св. Евгениі, и въ другихъ слюнахъ бѣшенныхъ. Вскорѣ представился случай разсѣять всѣ сомнѣнія.

23-го февраля 1881 г., г. Першеронъ, ветеринаръ, мнѣ указалъ дѣвочку шести лѣтъ, представлявшую всѣ признаки бѣшенства. Она была укушена за мѣсяцъ до того въ лицо бѣшенней собакою. Ея смерть послѣдовала въ тотъ-же день 23-го февраля, въ 4 часа вечера. На другой день, 24-го февраля, собрано было немного слюны и привито двумъ кроликамъ, одному въ животъ — правцовскимъ шприцомъ, другому въ лицо — ланциетомъ. Этотъ послѣдній не пострадалъ никакъ; первый же умеръ послѣ трехъ дней. Его кровь изобиловала нашимъ новымъ микробомъ съ его обычной заразительностью.

Въ то-же время одинъ рабочій — кузнецъ, 49 лѣтъ отъ роду, укушеннный бѣшенней собакою четыре съ половиною мѣсяца до того, умеръ 22-го февраля въ больницѣ *Pitié*, въ отдѣленіи д-ра Бруарделя. Полтора часа послѣ его смерти много гимъ кроликамъ была привита слюна изо рта и слизь съ нѣба. Другіе кролики уже были привиты слюною, взятою еще до смерти паканунѣ и нѣсколько часовъ прежде, д-рами Бруардлемъ и Дюжарденъ-Бометцомъ. Благодаря любезности этихъ ученыхъ врачей, я могъ убѣдиться, что не только привитые мною

кролики, но и нѣкоторые изъ тѣхъ, которые ими были привиты, умерли отъ того-же микробы, который настъ запимаетъ.

Если внимательно и продолжительно изучать дѣйствіе прививокъ слюны людей, заболѣвшихъ бѣшенствомъ, то можно констатировать троекаго рода смерть:

смерть отъ новаго микробы;

смерть отъ весьма обильныхъ нагноеній, съ отслоеніемъ кожи, съ припадками септическаго процесса, и

смерть, наконецъ, отъ настоящаго бѣшенства, свойственнаго кроликамъ; оно постоянно имѣть довольно долгій инкубационный періодъ и всегда обнаруживается параличемъ конечностей, продолжающимся 24, 48, 72 часа до смерти. Способность кусаться никогда не существуетъ, такъ сказать, въ бѣшенствѣ кроликовъ. Я однако видѣлъ одинъ подобный случай, но это былъ одинъ изъ сотенъ случаевъ.

Смерть отъ нагноеній можетъ произойти въ нѣсколько дней, какъ и въ нѣсколько недѣль. Въ этомъ случаѣ параличъ встрѣчается рѣдко.

Смерть отъ новаго микробы всегда происходитъ быстро, если не бываетъ осложненія нагноеніями, въ каковомъ случаѣ смерть можетъ запоздать на нѣсколько дней.

Стало быть, слюна людей, заболѣвшихъ бѣшенствомъ, содержитъ, — кромѣ заразы бѣшенства, не охарактеризованной еще микробомъ, способнымъ культивироваться, — еще заразу, причиняемую особеннымъ микробомъ, который легко культивируется, и различными микробами, способными вызвать смерть, благодаря большому развитію гноя, мѣстнымъ чрезмѣрнымъ разстройствамъ и иногда введенію въ кровь обыкновенныхъ микробовъ.

Въ слюнѣ дѣтей, умершихъ отъ бѣшенства, новый микробъ настолько часто появляется и въ такомъ изобилии, что онъ вызываетъ смерть у кроликовъ съ большою скоростью, нежели то дѣлаютъ заразы бѣшенства или тѣ микробы, которые обусловливаютъ нагноенія и гнилостныя разстройства.

Но существуетъ-ли новый микробъ, открытый въ слюнѣ дѣтей, пораженныхъ бѣшенствомъ, только въ этого рода слюнѣ? Этотъ вопросъ, естественнымъ образомъ, возникалъ въ умѣ. Его

собственно необходимо было съ самаго начала разрѣшить, если мы желали убѣдиться въ скрытой связи между этими микробомъ и микробомъ бѣшенства. Въ случаѣ, если-бы оказалось, что новый микробъ существуетъ во всякой слюнѣ, то было-бы ясно, что онъ не зависитъ отъ заразы бѣшенства.

По наблюденіямъ, которыми мы занялись, оказалось, что слюна молодыхъ людей, умершихъ отъ различныхъ болѣзней, не содержала новыхъ микробовъ, или онъ маскировался въ нашихъ опытахъ многочисленными микробами, производящими тной; напротивъ, слюна дѣтей, умершихъ отъ различныхъ болѣзней, убивала кроликовъ, благодаря этому микробу, о которомъ идетъ рѣчь; наконецъ, онъ найденъ былъ въ слюнѣ людей, вполнѣ здоровыхъ.

Микробъ слюны, о которомъ я вамъ говорю, есть третій заразительный микробъ, который мы пробовали ослабить дѣйствиемъ кислорода. Я желаю вамъ представить это ослабленіе; оно еще не опубликовано и весьма интересно по различнымъ подробностямъ своей исторіи.

Вы уже знаете, что происходитъ съ культурами микробы куриной холеры, если переходить отъ одной культуры въ слѣдующую, не оставляя большаго промежутка времени между этими культурами. Заразительность второй культуры воспроизводить заразительность первой, замѣтнымъ образомъ ея не измѣняя, и такъ бываетъ и съ послѣдующими. Только когда даютъ пройти болѣе или менѣе долгому времени между двумя послѣдовательными культурами, то замѣчаютъ уменьшеніе заразительности. Другими словами, кажется, что кислородъ воздуха только тогда въ состояніи ослабить культуру, когда она уже закончилась. Пока кислородъ употребляется на жизненные процессы, на акты питанія микробы, его ослабляющее вліяніе не выражается чувствительнымъ образомъ. Оно не отсутствуетъ совершенно, но ускользаетъ отъ обыкновенныхъ наблюдений.

Нашъ микробъ слюны ведеть себя подобно микробу куриной холеры. Если послѣдовательно производить его культуры черезъ каждые двѣнадцать часовъ, то находятъ во всѣхъ культурахъ ту-же степень заразительности, т. е. если мы возьмемъ кролика

за критерій заразительности, то окажется, что эти животных умирают такъ-же легко и скоро отъ послѣднихъ культуръ, какъ и отъ первыхъ.

Г. Тюлье имѣлъ терпѣніе сдѣлать при этихъ условіяхъ двѣ серіи въ 24 культуры и двадцать четвертая также быстро убивала кроликовъ, какъ и первая. Чтобы замѣтить нѣкоторую разницу, приходилось-бы пожертвовать громаднымъ числомъ кроликовъ или работать надъ животными, болѣе сопротивляющимися заразѣ.

Если мы теперь сравнимъ послѣдовательныя культуры, оставляя ихъ болѣе или менѣе долгое время въ соприкосновеніи съ воздухомъ, прежде чѣмъ переводить ихъ отъ одной въ другой путемъ засѣванія, то въ извѣстныхъ отношеніяхъ дѣла пойдутъ совсѣмъ иначе, нежели при куриной холерѣ: культуры погибаютъ очень быстро. Приходишь въ удивленіе, когда видишь, какъ при попыткѣ засѣять культуру въ новомъ бульонѣ, весьма часто уже послѣ двухъ или трехъ дней стоянія маточной культуры уже имѣется полное бесплодіе и смерть культуры происходитъ тѣмъ быстрѣе, чѣмъ дальше она находится въ ряду послѣдовательныхъ культуръ. Культура, непосредственно засѣянная заразительной кровью, живеть отъ шести до двѣнадцати или пятнадцати дней. Если отъ этой культуры засѣять вторую, отъ второй третью и такъ далѣе, то можно констатировать быстрое уменьшеніе продолжительности жизни и заразительности культуръ. Восьмая будетъ жить отъ трехъ до четырехъ дней, въ то время какъ двѣнадцатая будетъ жить лишь тридцать часовъ, двадцать пятая — двадцать шесть часовъ, сорокъ восмая и слѣдующія приблизительно отъ двадцати до двадцати двухъ часовъ.

Эти культуры, будучи привиты кроликамъ подъ конецъ своей жизни, не всегда убиваютъ ихъ, и легко убѣдиться, что многіе изъ кроликовъ, привитыхъ при подобныхъ условіяхъ, противостоятъ потомъ заразительнымъ прививкамъ. Болѣзнь, стало быть, не рецидивируетъ, по крайней мѣрѣ въ теченіе долгаго времени. Однако, вслѣдствіе быстрой смерти культуры, представляется весьма труднымъ уловить настоящій моментъ, когда засѣваніе культуры

даетъ подходящую вакцину. Слѣдовало-бы значительно удлинить продолжительность жизни культуры. Этого легко достигнуть, составляя среду для культуры изъ бульона и кроличьей крови. Бульонъ, годный для культуры микробы — телячій; бульоны изъ курицы, кролика, быка, овцы не годны. Две части телячьяго бульона и одна часть чистой кроличьей крови, если засѣять ихъ заразительной кровью или культурою изъ бульона, даже высшаго порядка, даютъ культуры, имѣющія продолжительность до сорока или пятидесяти дней. Въ послѣдніе десять дней культуры изъ бульона, засѣянныя на этой кровяной смѣси, образуютъ серію культуры съ постепенной (градуированной) заразительностью, всѣ годныя для вакцинъ въ различной степени.

Это опять таки дѣйствіе кислорода воздуха, видоизмѣняющее культуру и ослабляющее прогрессивно ея заразительность. Доказательство этого можно легко имѣть въ томъ способѣ, которымъ мы уже пользовались, т. е. въ сравненіи культуръ, приготовленныхъ и сохраненныхъ въ соприкосновеніи съ воздухомъ съ тѣми, которые оставались въ закрытыхъ трубочкахъ или въ пустомъ пространствѣ. Въ то время какъ культура, бывшая въ соприкосновеніи съ воздухомъ, погибаетъ въ нѣсколько дней въ телячемъ бульонѣ, та-же культура, сохранявшаяся въ закрытыхъ трубочкахъ или въ пустомъ пространствѣ, обладаетъ еще заразительностью спустя три и четыре мѣсяца, а можетъ быть еще дольше. Впрочемъ, если смерть постигаетъ культуры въ закрытыхъ трубкахъ, то заразительность сохраняется до момента смерти.

Итакъ, у насъ имѣется три аэробныхъ микробы, которые возможно ослабить по одному и тому-же способу, который, кромѣ того, даетъ возможность легкаго приготовленія ихъ вакцинъ: *микробъ куриной холеры, микробъ сибирской язвы, микробъ слюны*, въ особенности слюны бѣщенныхъ. Если я еще прибавлю четвертаго въ этомъ сообщенія, то я полагаю, что этого новаго примѣра будетъ достаточно, чтобы также убѣдить васъ, какъ и я самъ убѣжденъ, въ томъ, что найденъ общій рациональный методъ, вовсе не эмпирическій, ослабленія и приготовленія многихъ вакцинъ.

Дѣло идетъ о новой заразѣ, встрѣченной въ первый разъ при слѣдующихъ обстоятельствахъ.

1881 годъ означеновался въ Парижѣ очень серьезною эпизоотіею того рода заболѣванія, которое известно подъ именемъ *тифоидной горячки лошадей*. Одно только общество омнибусовъ въ Парижѣ потеряло болѣе 1500 лошадей. Мы начали некоторые изслѣдованія обѣ этой болѣзни, которая, къ несчастью для нашихъ опытовъ, не возобновилась въ 1882 г.

Когда мы привили кроликамъ пѣнистую матерію, истекавшую изъ ноздрей лошади, заболѣвшей вышеозначенной болѣзнью, въ моментъ ея смерти, то они погибали и ихъ кровь представляла новый микробъ въ формѣ цифры 8, съ продолговатымъ перехватомъ. Этотъ микробъ вызываетъ у кроликовъ настоящую тифоидную горячку, которая убиваетъ ихъ менѣе, чѣмъ въ двадцать четыре часа. Легкія вообще гепатизированы и плевра воспалена. Нейеровы бляшки набухаютъ и иногда покрыты геморрагіями. Заслонка слѣпой кишкѣ всегда очень припухаетъ и чаще покрыта кровоподтеками, нежели кишкѣ. Въ почкахъ также имѣются кровоподтеки. Печень часто представляется блѣдною. Животное очень быстро впадаетъ въ коматозное состояніе. Уже четыре часа послѣ прививки лихорадочное состояніе обнаруживается повышенiemъ температуры болѣе, чѣмъ на 1° , даже тогда, если смерть только наступаетъ черезъ тридцать шесть часовъ. Воспаленіе брюшины также всрѣчается довольно часто.

Ослабленіе этого микробы получается, когда оставить его культуры въ бульонѣ, въ соприкосновеніи съ воздухомъ; но уловить его чрезвычайно трудно, такъ какъ за періодомъ, когда оно обнаруживается, слѣдуетъ почти непосредственно смерть микробы. Иначе говоря, если сдѣлать культуру этого микробы и оставить ее въ соприкосновеніи съ воздухомъ, испытывая ежедневно ея заразительность, то она оказывается постоянно смертельной для кроликовъ до тѣхъ поръ, пока вдругъ находять культуру мертвую, т. е. неспособной больше культивироваться и безъ всякаго дѣйствія на животныхъ. Въ культурахъ, при соприкосновеніи съ воздухомъ, микробъ переходитъ отъ заразительности къ смерти въ 15—30 дней, если оставить его при-

35°. Напротивъ, если онъ развивался при 35° и оставленъ былъ при окружающей температурѣ, то его культуры сохраняются живыми отъ шести до восьми мѣсяцевъ и болѣе. Въ пустомъ пространствѣ культуры сохраняютъ заразительность по крайней мѣрѣ въ теченіе года, будетъ-ли это въ согрѣвателномъ шкафѣ или при обыкновенной температурѣ.

Чтобы уловить и фиксировать ослабленіе, мы прибѣгли къ слѣдующему пріему, который схожъ съ тѣмъ, который мы только что употребили, чтобы доказать, что ослабленіе сибирязвенного микроба при 43° зависитъ отъ кислорода воздуха. Приготавляютъ культуру при помощи заразительной крови мертваго кролика и предоставляютъ ее самой себѣ. Каждый день засѣвается новый флаconъ съ бульономъ, для того чтобы имѣть столько культуръ, сколько дней живетъ первая культура. Вотъ наступаетъ моментъ, когда посѣвъ, взятый изъ этой маточной культуры, оказывается бесплоднымъ. Достигши этого пункта, вновь берутъ, въ качествѣ маточной культуры для новой серии ежедневныхъ культуръ, культуру, приготовленную наканунѣ смерти первой маточной культуры. Вторая маточная культура умираетъ въ свою очередь; тогда приготавляютъ новую серію ежедневныхъ культуръ, взявши для маточной культуры ту, которая была приготвлена наканунѣ смерти второй маточной культуры и т. д.

Благодаря этому методу, мы достигаемъ того, что получаемъ культуры, которые не причиняютъ уже смерти кроликамъ, а вызываютъ только излѣчимые нарываы, которые иногда чрезвычайно развиты. Въ это время легко убѣдиться, что мы имѣемъ дѣло съ культурами-вакцинами, т. е. что выздоровѣвшіе кролики безпрепятственно переносятъ самыя заразительныя культуры микроскопическаго организма тифоидной горячки кроликовъ. Культуры-вакцины, приготовленныя въ короткіе промежутки времени, сохраняютъ вакцинальную заразительность. Вліяніе кислорода воздуха на ослабленіе заразы доказывается еще культурами, пребывавшими въ пустомъ пространствѣ или виѣ соприкосновенія съ воздухомъ. Онѣ сохраняютъ свою заразительность и умираютъ лишь черезъ очень долгое время, обнаруживая свою заразительность до самого момента смерти культуры.

Резюмируя все вышесказанное, мы полагаемъ, что нѣтъ сомнѣнія, что мы обладаемъ общимъ методомъ ослабленія заразы, примѣненіе котораго только должно быть видоизмѣняемо, смотря по физиологическимъ свойствамъ различныхъ микробовъ. Общіе принципы найдены и трудно не вѣрить, что будущее этого рода изслѣдований преисполнено великихъ надеждъ.

Но какъ-бы блестяща ни была доказанная истина, она не всегда легко принимается. Я встрѣтилъ какъ во Франціи, такъ и за-границею упорныхъ противниковъ.

Позвольте мнѣ выбрать между ними того, который по своимъ личнымъ заслугамъ наиболѣе заслуживаетъ нашего вниманія: я думаю доктора Коха изъ Берлина. Годъ тому назадъ появился въ Берлинѣ «Сборникъ работъ германскаго санитарнаго учрежденія». Мои работы въ немъ подверглись очень горячимъ нападкамъ со стороны д-ра Коха и его учениковъ. Въ нѣкоторыхъ мемуарахъ этого «Сборника» мы наталкиваемся на вещи, по-истинѣ удивительныя. Въ различныхъ статьяхъ тамъ даже намекается на то, что г. Пастеръ не умѣеть культивировать микробовъ въ чистомъ видѣ; что онъ не можетъ сказать, что его работы свободны отъ ошибокъ въ виду того, что онъ незнакомъ со способомъ различенія микроорганизмовъ; что онъ вовлекъ цѣлую школу на обнародование «невѣроятныхъ вѣщей подъ видомъ культуры...» Тамъ заявляется, что употребляемый мною способъ прививки состоить въ инсекціи подъ кожу одной или многихъ ширицовъ жидкости; что я никогда не имѣль въ рукахъ чистой септициеміи безъ прибавленія другихъ болѣзней; что я плохо примѣнилъ слово *септициемія*; что онъ, д-ръ Кохъ, болѣе близокъ къ истинѣ, когда употребляетъ название *злокачественнаю отека*; что г. Пастеръ не умѣеть отличать септическаго вибріона, хотя и открылъ его..... Говоря объ опытѣ съ сибирской язвою, переданной курамъ единственно охлажденіемъ ихъ температуры послѣ прививки, д-ръ Кохъ, который ничего замѣчательнаго въ этомъ опыте не усматриваетъ, спрашивается, не были-ли охлажденные куры, заразившіяся сибирской язвою, такія, которыя способны ею заражаться естественнымъ образомъ; потому что — говоритъ онъ — одинъ

нѣмецкій авторъ, прививая сибирскую язву курамъ, получилъ 11 разъ изъ 31 положительные результаты. Такое завѣреніе не мѣшало бы д-ру Коху провѣрить прежде, чѣмъ сдѣлать изъ него оружіе противъ истины, доказанной самыми точными наблюденіями.

Ученики д-ра Коха превзошли еще своего учителя. Въ ихъ мемуарахъ, напримѣръ, находимъ, что единственno вѣрная гарантія чистоты культуры — это безпрестанный контроль при помощи микроскопа, чего нельзѧ дѣлать съ культурами Пастера. Но вотъ нѣчто еще болѣе сильное: дѣло касается ослабленія заразы. Г. Лефлеръ говоритъ: «когда въ опытахъ Гафки культуры производили неопределеннное дѣйствіе, «ослабленіе заразы», то всегда существовало замѣщеніе весьма сходными организмами съ быстрымъ ростомъ, но не патогенными. Г. Лефлеръ однако болѣе снисходителенъ, нежели его учитель и его сотоварищъ, г. Гафки; онъ мнѣ дѣлаетъ честь, признаваясь, что допускаетъ, что мои культуры были чисты. Но знаете-ли, что, по мнѣнію автора, могло меня ввести въ заблужденіе? Это то, что вмѣстѣ съ превращеніемъ въ вакцины начиналось замѣщеніе микробовъ въ моихъ культурахъ. «Воздухъ лабораторіи — говорить онъ — посвященной въ теченіи долгихъ лѣтъ бактеріологическимъ изслѣдованіямъ, переполненъ громадной массою зародышей; не могъ-ли зародышъ расположиться на иголкѣ, употребленной для вакцинацій, проникнуть въ шаръ, тѣмъ болѣе что приходилось часто испытывать заразительность культуръ? Вотъ что заставило меня допустить ослабленіе заразы куриной холеры. Это еще не все: я полагалъ, что имѣю въ рукахъ вакцинированныхъ куръ, а авторъ предполагаетъ, что я принялъ за подобныхъ куръ такихъ, которыхъ просто были невосприимчивы къ куриной холерѣ. Наконецъ, авторъ не допускаетъ, чтобы я могъ въ нѣкоторыхъ своихъ опытахъ работать надъ 80 курами, какъ я это утверждалъ, потому что это обходилось-бы мнѣ очень дорого. Это однако правда, такъ какъ для установленія великаго факта ослабленія заразъ государство позволило мнѣ не скучиться.

Быть можетъ, въ этомъ собраніи найдутся нѣкоторые, которые раздѣляютъ мнѣнія моихъ противниковъ. Прошу ихъ высказатья. Я буду счастливъ, если имъ дамъ объясненія.

Рѣчъ Пастера

на международномъ съездѣ врачей въ Копенгагенѣ

11-го Августа 1884 года.

Милостивые Государи!

На Вашихъ съездахъ разбираются самые важные вопросы медицины и вмѣстѣ съ тѣмъ намѣчаются пути для новыхъ изслѣдований.

Три года тому назадъ, незадолго до лондонскаго конгресса ученіе о микродахъ, въ примѣненіи къ этиологии заразительныхъ болѣзней, подверглось сильнымъ нападкамъ. Противники прогресса утверждали, что болѣзнь зарождается въ насъ самихъ, въ насъ развивается и нами же передается. Можно было ожидать, что приверженцы самопроизвольного происхожденія болѣзней выступятъ въ Лондонѣ рьяными защитниками своего ученія, но они не осмѣлились на то, и пренія по этимъ вопросамъ не были даже открыты. Такимъ образомъ, пришлось убѣдиться еще разъ, что если все подготовлено къ торжеству новой истины, то и многолюдное собраніе съумѣть единодушно преклониться передъ нею.

Прозорливые умы предчувствовали, что ученіе о самопроизвольномъ происхожденіи болѣзней отживетъ свой вѣкъ, когда самопроизвольное зарожденіе микроскопическихъ организмовъ будетъ признано химерою, а жизнь этихъ существъ будетъ принята за главную причину органическихъ разложеній и броженія. Со времени того-же лондонскаго конгресса была констатирована другая истина, которой предстоитъ великая будущность, — возможность ослабленія яда, измѣненіе и сохраненіе его силы посредствомъ особыхъ культуръ и, наконецъ, примѣненіе всего этого къ ветеринаріи.

Кромѣ микробовъ куриной холеры и сибирской язвы стало известно еще много другихъ. Въ настоящее время насчитыва-

ются десятки тысяч животныхъ, которыхъ посредствомъ прививаній удалось предохранить отъ смертельной болѣзни. Не смотря на странную оппозицію, встрѣтившую эти новыя открытия, они скоро вызвали цѣлый рядъ новыхъ идей.

Слѣдуетъ-ли полагать, что это новое открытие послужить къ предохраненію болѣзней однихъ только животныхъ? Вопросъ этотъ решенъ уже въ принципѣ. Сибирскаа язва, напримѣръ, свойственна животнымъ и человѣку. Поэтому легко сдѣлать невоспріимчивымъ къ этой болѣзни и человѣка, если бы это было найдено полезнымъ. Способъ, примѣняемый къ животнымъ, могъ бы быть примѣненъ и къ нему, такъ сказать, безъ измѣнений. Но съ человѣческой жизнью необходимо обращаться осторожнѣе, чѣмъ съ жизнью быка или овцы. Вместо двухъ вакцинъ человѣку пришлось бы привить три или четыре съ возрастающей степенью ихъ ядовитости, выбирая вакцины настолько слабыя, чтобы не подвергать вакцинируемаго субъекта ни малѣйшему болѣзненному осложненію, какъ бы ни былъ воспріимчивъ къ болѣзни его организмъ.

По отношенію къ человѣку трудность заключается не въ примѣненіи новаго профилактическаго метода, а въ знаніи физиологическихъ свойствъ болѣзнетворныхъ ядовъ. Достигнуть возможной степени ослабленія этихъ ядовъ, воть къ чему должно стремиться изслѣдованіе. Но опытъ, познавательный на животныхъ, можетъ быть преступнымъ въ примѣненіи къ человѣку. Воть въ чёмъ состоить, главнымъ образомъ, затрудненіе при изслѣдованіи человѣческихъ болѣзней. Не нужно, однако, забывать, что изслѣдованія, о которыхъ идетъ рѣчь, принадлежатъ самому послѣднему времени, что они уже дали плодотворные результаты и что мы имѣемъ право ожидать отъ нихъ еще большаго прогресса, когда болѣзни, свойственные однимъ животнымъ, будутъ точнѣе изучены и отдѣлены отъ тѣхъ болѣзней, которыхъ могутъ поражать какъ животныхъ, такъ и человѣка.

Желаніе подвинуться впередъ въ изученіи болѣзней этой второй категоріи и заставило меня заняться изслѣдованіемъ собачьяго бѣшенства, несмотря на окружающую эту болѣзнь таинственность.

Изученіе собачьяго бѣшенства въ моей лабораторіи было начато четыре года тому назадъ и производилось безостановочно не считая, разумѣется, необходимыхъ перевывовъ, связанныхъ съ условіями самаго изслѣдованія. Условія эти очень неблагопріятны. Инкубационный періодъ всегда продолжителенъ, за недостаткомъ мѣста приходится ограничивать число экспериментовъ въ данный моментъ. Тѣмъ не менѣе, несмотря на эти материальныя препятствія, устранившіяся, насколько возможно, французскимъ правительстvомъ, интересующимся научными изысканіями, опыты моихъ помощниковъ и мои — безчисленны. Теперь я ограничусь изложеніемъ послѣднихъ результатовъ этихъ изслѣдованій.

Слово «бѣшенство» немедленно вызываетъ въ умѣ мысль о средствѣ противъ этой болѣзни. Но задаться прежде всего цѣлью отыскать средство — значить подвергать себя, въ большинствѣ случаевъ безплодной работѣ. Гораздо цѣлесообразнѣе прежде всего изучить характеръ, причину и развитіе болѣзни, имѣя отдаленную надежду найти противъ нея мѣры.

Благодаря только этому послѣднему методу изученіе собачьяго бѣшенства сдѣлалось доступнымъ.

Мы убѣдились, что ядъ бѣшенства всегда развивается въ головномъ и спинномъ мозгу, въ нервахъ и въ слюнныхъ желѣзахъ, и притомъ во всѣхъ этихъ органахъ неодновременно. Онъ можетъ, напримѣръ, развиваться въ концѣ спиннаго мозга, прежде чѣмъ будетъ пораженъ головной мозгъ. Его можно найти въ одномъ или въ нѣсколькихъ пунктахъ головнаго мозга, а не вездѣ. Если убить животное въ полномъ развитіи бѣшенства, то приходится довольно долго отыскивать присутствіе яда въ его первной системѣ или въ желѣзахъ. Къ счастью, намъ удалось найти, что у животныхъ, умершихъ отъ бѣшенства, всегда поражена та часть продолговатого мозга, которая соединяетъ послѣдній съ полушаріями большаго мозга и носить название луковицы. Прививка частей продолговатого мозга отъ павшаго животнаго другимъ непремѣнно вызоветъ у послѣднихъ бѣшенство, если только она будетъ сдѣлана посредствомъ трепанациіи и притомъ въ подпаутинное пространство, на поверхности мозга. Всякій можетъ привить бѣшенство любой собакѣ, посредствомъ

трепанациі, употребляя для прививки часть *bulbi* животнаго, павшаго отъ собачьяго бѣшенства. Этимъ способомъ было привито бѣшенство сотнямъ собакъ, взятыхъ безъ всякаго выбора. Не было ни одной неудачной прививки; съ такимъ же успѣхомъ было оперировано нѣсколько сотенъ морскихъ свинокъ и большое количество кроликовъ. Постоянное присутствіе яда въ продолжоватомъ мозгу въ моментъ смерти животнаго и увѣренность сообщить бѣшенство всякому другому животному прививкою яда въ подпаутинное пространство, — эти два главные результата, такъ сказать, экспериментальная аксиомы, представляютъ существенную важность. Примѣняя постоянно эти опытные критеріи въ своихъ изслѣдованіяхъ, мы могли идти впередъ въ столь трудномъ изученіи. Но какъ-бы ни были устойчивы эти экспериментальные основы сами по себѣ, онъ все таки не могутъ дать памъ ни малѣйшаго представленія о способѣ вакцинації противъ бѣшенства. При современномъ состояніи науки для открытія способа прививки противъ заразительныхъ болѣзней предполагается: 1) что ядъ, съ которымъ имѣютъ дѣло, способенъ принимать различную степень заразительности, причемъ слабый ядъ можетъ быть вакциною; 2) что имѣется способъ для полученія его въ различной степени заразительности.

Въ настоящее время въ наукѣ извѣстно только одно бѣшенство. Всякое бѣшенство у собаки, человѣка, лошади, быка, лисицы и пр. происходитъ вслѣдствіе укушенія бѣшенной собакою. Бѣшенство никогда не развивается самопроизвольно ни у собаки, ни у другихъ животныхъ. Всѣ приводимые случаи самопроизвольного развитія бѣшенства не заслуживаютъ серьезнаго вниманія; говорить, что долженъ же быть произойти самопроизвольно первый случай бѣшенства, — значитъ ничего не сказать и затрогивать неразрѣшимую въ настоящее время задачу о происхожденіи жизни вообще. Это было-бы равносильно утвержденію, что дубъ не всегда происходитъ отъ дуба, что нужно-же было первому дубу возникнуть самопроизвольно. Разсужденіе о происхожденіи вещей, при настоящемъ состояніи нашихъ знаній, находится вѣтѣ области науки. Короче сказать, вопросъ о томъ — можетъ ли ядъ собачьяго бѣшенства пред-

ставлять различную степень заразительности, подобно яду куриной холеры, сибирской язвы и пр., прежде всего долженъ подлежать разрешению для предохраненія отъ бѣшенства. Какимъ образомъ можемъ мы опредѣлить различную силу яда собачьяго бѣшенства? Къ какому критерію должны прибѣгнуть, чтобы обнаружить силу яда, который всякий разъ, какъ прививка удается, становится смертельнымъ? Руководствоваться ли внешними симптомами бѣшенства? Но эти симптомы весьма измѣнчивы. Они зависятъ отъ того, въ какихъ частяхъ спинного или головнаго мозга прежде всего локализуется и живетъ ядъ. Бѣшенство, выражающееся у одного животнаго, такъ сказать, въ самой тихой формѣ (потому что таковыя бываютъ), можетъ вызвать у другого животнаго одного и того же вида форму болѣзни самую бурную.

Руководствоваться ли продолжительностью инкубациіи для определенія силы яда? Но нѣтъ ничего измѣнчивѣе этой продолжительности. Пусть бѣженная собака укусить двухъ другихъ собакъ. Одна взбѣсится черезъ мѣсяцъ или полтора, другая же черезъ 2—3 мѣсяца и даже позже. Настолько же различна продолжительность инкубациіи при различныхъ способахъ прививки. Въ однихъ случаяхъ укушенія и подкожныхъ прививокъ бѣшенство проявляется, въ другихъ, при прочихъ равныхъ условіяхъ, — нѣтъ; между тѣмъ какъ прививки на поверхности мозга никогда не остаются безъ результата и инкубационный періодъ бываетъ въ послѣднемъ случаѣ сравнительно очень короткій.

Впрочемъ, есть возможность опредѣлить силу яда бѣшенства довольно вѣрно продолжительностью инкубациіи при слѣдующихъ двухъ условіяхъ: 1) при прививкахъ въ полости черепа и 2) при строгой досѣровкѣ вводимаго яда. Такъ какъ этихъ условій нѣть при поступлении яда въ подкожную клѣтчатку или въ вену и при укушеніяхъ животнаго, то такие случаи и нельзя считать чистыми. Продолжительность инкубациіи находится въ большой зависимости отъ количества дѣйствующаго яда, т. е. отъ того количества с.о., которое безъ измѣненія достигаетъ нервной системы. Хотя количества яда, способныя передать бѣшенство,

могутъ быть безконечно малы, — доказательствомъ чего можетъ служить появление бѣшенства вслѣдъ за укушеніемъ бѣшеннаго животнаго, когда вводится въ организмъ самая минимальная частицы яда, — тѣмъ не менѣе легко сдѣлать вдвое болѣе продолжительную инкубaciю, измѣняя только пропорciю этихъ маленькихъ количествъ прививаемаго яда. Приведу примѣры:

10-го мая 1882 года введено въ подколѣйную вену собаки десять капель жидкости, которая приготовлена была посредствомъ растиранiя части продолговатаго мозга собаки, умершей отъ бѣшенства, въ трехъ или четырехъ по объему частяхъ стерилизованного бульона; другой собакѣ введена $\frac{1}{100}$, а третьей $\frac{1}{200}$ часть этого количества той-же жидкости. Первая собака взбѣсилась черезъ 18 дней, вторая чрезъ 35 дней, третья же осталась здоровою; это значитъ, что послѣдней было введено количество яда, недостаточное для развитiя бѣшенства. Эта послѣдняя собака, какъ и всѣ собаки, вообще, была воспрiимчива къ заразѣ, такъ какъ послѣ повторной инокуляцiи 3-го сентября 1882 года, она черезъ 22 дня взбѣсилась.

Приведу другой примѣръ. Кролику была сдѣлана прививка по иному способу — посредствомъ трепанациi. Продолговатый мозгъ кролика, павшаго отъ бѣшенства вслѣдствiе прививки сильнаго яда отъ бѣшеннаго животнаго, былъ разведенъ двойнымъ или тройнымъ количествомъ стерилизованного бульона. Послѣ того, какъ смѣсь постояла нѣсколько минутъ, одному кролику привито было, посредствомъ трепанациi, двѣ капли этой жидкости; другому $\frac{1}{4}$ и прочимъ $\frac{1}{16}$, $\frac{1}{64}$, $\frac{1}{128}$, $\frac{1}{152}$ части того же количества. Всѣ кролики погибли отъ бѣшенства, а продолжительность инкубaciи была для каждого различна: 8 дней для первого, 9 — для втораго, 10 дней — для третьяго и четвертаго кроликовъ, 12 и 16 дней — для пятаго и шестаго кроликовъ. Измѣненiе продолжительности инкубaciи было вызвано не ослабленiемъ внутренней силы яда, вслѣдствiе разведенiя его, потому что прививка яда отъ всѣхъ этихъ животныхъ новымъ животнымъ дала у всѣхъ инкубационный перiодъ въ восемь дней.

Изъ этихъ примѣровъ мы видимъ, что въ случаяхъ бѣшенства, происходящихъ, отъ укушенiй или подкожнаго введенiя

яда, продолжительность инкубационного периода должна зависеть главнымъ образомъ отъ колебанія въ большихъ предѣлахъ количества яда, доходищаго до центральной нервной системы.

Слѣдовательно, если нужно воспользоваться продолжительностью инкубациі для измѣренія силы яда, то необходимо прибѣгнуть къ способу трепанациі, который даетъ абсолютно вѣрные результаты при прививкѣ яда въ большемъ количествѣ, чѣмъ нужно для зараженія животнаго бѣшенствомъ. При такихъ опытахъ разница въ продолжительности инкубациі отъ одного и того же яда исчезаетъ почти совершенно, потому что при этомъ получается всегда наибольшій эффектъ дѣйствія его, выражющейся наименьшою продолжительностью инкубациі.

Такимъ образомъ мы нашли способъ, при помощи котораго могли опредѣлить степень заразительности и сравнивать эти степени между собою. Весь секретъ этого способа, повторяю, состоить въ прививкѣ посредствомъ трепанациі, употребляя при этомъ такія количества яда, которыя, будучи слабы сами по себѣ, все таки больше тѣхъ, какія вызываютъ бѣшенство. Этотъ способъ ставить продолжительность инкубациі въ исключительную зависимость отъ силы яда, которая опредѣляется минимумомъ продолжительности инкубациі.

Первый разъ этотъ способъ былъ примененъ при изученіи собачьяго бѣшенства и преимущественно вопроса: всегда ли бѣшенство собакъ одинаково, съ той лишь разницей, которая обусловливается породой этихъ животныхъ?

Возьмемъ напр. бѣшеныхъ собакъ самыхъ различныхъ породъ, въ различное время одного и того же года или несколькиихъ лѣтъ. У каждой изъ нихъ отдѣлимъ продолговатый мозгъ и посредствомъ трепанациі привьемъ одному или двумъ кроликамъ по двѣ капли вещества его, растертаго въ двухъ или трехъ частяхъ стерилизованного бульона. Прививка дѣлается со всевозможными предосторожностями правацовскимъ шприцемъ, игла котораго, нѣсколько согнутая на концѣ, вкладывается въ *dura mater* и вводится въ подпаутинное пространство. При этомъ наблюдается слѣдующее: у всѣхъ кроликовъ, отъ какой бы бѣшеннай собаки ни былъ взятъ ядъ, инкубациі всегда и безъ

исключенія продолжается отъ 12 до 15 дней. Никогда она не бываетъ въ 11, 10, 9 и 8 дней, также какъ въ нѣсколько недѣль и мѣсяцевъ.

Слѣдовательно, степень ядовитости собачьяго бѣшенства всегда одинакова, а видоизмѣненія этой болѣзни, очень впрочемъ ограниченныя, зависятъ, повидимому, отъ неодинаковой восприимчивости различныхъ породъ. Но мы сейчасъ увидимъ и глубокое измѣненіе силы яда собачьяго бѣшенства.

Прослѣдимъ одного изъ кроликовъ, которому былъ привитъ ядъ собачьяго бѣшенства отъ уличной собаки, и когда онъ умретъ, привьемъ приготовленную извѣстнымъ способомъ изъ его продолговатаго мозга жидкость въ количествѣ двухъ капель, другому кролику посредствомъ трепанациі; продолговатый мозгъ отъ послѣдняго послужить намъ матеріаломъ для прививки третьему кролику, продолговатый мозгъ этого — четвертому и т. д. Съ первыхъ же опытовъ станетъ очевидною наклонность къ укороченію инкубационнаго периода и у каждого послѣдующаго кролика. Приведу примѣръ.

Въ концѣ 1882 года пали на одной фермѣ въ окрестностяхъ Мелина 15 коровъ и одинъ быкъ, вслѣдствіе укусенія ихъ, второго октября, бѣшеною собакою. Голова одной изъ этихъ коровъ, павшей 15 ноября, прислана въ мою лабораторію г. Росиноломъ, ветеринаромъ въ Мелинѣ. Многочисленные опыты, произведенныя на собакахъ и кроликахъ, показали, что части головнаго мозга: *bulbus*, мозжечекъ, *lobus frontalis*, *lobus sphenoidalis*, — содержали въ себѣ ядъ. Кролики, которымъ сдѣлана была, посредствомъ трепанациі, прививка изъ этихъ частей мозга, заболѣли на 17-й и 18-й день послѣ прививки. Отъ продолговатаго мозга одного изъ павшихъ кроликовъ сдѣлана прививка двумъ другимъ: одинъ заболѣлъ на 15-й, другой на 23-й день послѣ прививки.

Замѣчу разъ навсегда, что, если мы привьемъ ядъ собачьяго бѣшенства отъ какого-либо животнаго животному другаго вида, ранѣе чѣмъ ядъ у первого достигаетъ наибольшей силы, — продолжительность инкубационнаго периода у прививаемыхъ животныхъ будетъ колебаться въ широкихъ границахъ. Это мы и

видимъ въ приведенномъ примѣрѣ, когда одинъ и тотъ же ядъ, при прочихъ равныхъ условіяхъ, далъ періодъ инкубациіи въ 15 дней у одного кролика и въ 23 дня у другаго.

Отъ продолговатаго мозга первого кролика сдѣлана прививка двумъ другимъ также посредствомъ трепанациіи. Одинъ изъ нихъ заболѣлъ черезъ 10, другой черезъ 14 дней. Отъ продолговатаго мозга первыхъ изъ этихъ двухъ кроликовъ сдѣлана прививка еще двумъ кроликамъ: бѣшенство обнаружилось черезъ 10 дней у одного и черезъ 12 дней у другаго. Въ пятой серіи опытовъ бѣшенство у двухъ кроликовъ появилось черезъ 11 дней; въ 6-ой серіи у двухъ — также черезъ 11 дней; въ 7-ой серіи — черезъ 12 дней; въ 8-ой серіи — черезъ 10 и 11 дней; въ 9-ой и 10-ой серіяхъ — черезъ 10 дней; въ 11-ой серіи — черезъ 9 дней; въ 12-ой серіи — черезъ 8 и 9 дней и т. д. съ колебаніями, самое большее, въ предѣлахъ 24-хъ часовъ до 21-ой серіи, когда бѣшенство обнаружилось черезъ 8 дней; въ дальнѣйшихъ опытахъ оно появлялось постоянно на 8-ой день до 50-ой серіи, произведенной на дпяхъ. Эта длинная серія опытовъ, начатая 15-го ноября 1882 года, продолжается и теперь, чтобы сохранить силу яда на самой высокой степени, какой онъ достигъ, какъ мы видѣли, уже давно.

Позвольте обратить ваше вниманіе на то, что эти изслѣдованія съ прививками велись непрерывно втеченіе двадцати мѣсяцевъ; черезъ каждые 12 дней кроликамъ дѣлалась трепанация съ прививкою яда собачьяго бѣшенства, полученного изъ одного источника.

У морскихъ свинокъ ядъ собачьяго бѣшенства скорѣе достигаетъ максимума своей силы. У нихъ продолжительность инкубациіи также различна и неправильна въ первыхъ серіяхъ опытовъ, но затѣмъ довольно скоро останавливается на минимумѣ 5-ти дней. Семь или восемь переносовъ отъ одной свинки на другую даютъ ядъ наибольшей силы. Впрочемъ, число такихъ переносовъ у кроликовъ и морскихъ свинокъ бываетъ различно, смотря по происхожденію первого прививаемаго яда.

Если ядъ, достигшій максимума силы у кроликовъ и морскихъ свинокъ, перенести на собакъ, то получается ядъ бѣ-

шенства, далеко превосходящий по силѣ обычный ядъ той-же болѣзни у этихъ животныхъ.

Спѣшу пояснить, какую пользу можетъ принести умѣнье приготавлять ядъ различной силы и притомъ гораздо болѣе сильный, чѣмъ обыкновенный ядъ собачьяго бѣшенства. Изслѣдователь никогда не пренебрегаетъ никакими знаніями, встрѣчающимися ему на научномъ пути, но для толпы, которую приводить въ ужасъ самое имя собачьяго бѣшенства, требуется нѣчто иное. Какая же польза для человѣка отъ знанія свойствъ яда бѣшенства и умѣнія ослаблять его силу? Та, что при этомъ можно надѣяться получить вакцины извѣстной силы, подобно тому какъ мы уже получили такія вакцины для яда куриной холеры, микробовъ слюны, краснухи свиней, острой септицеміи. Къ несчастью, способы, употреблявшіеся при полученіи упомянутыхъ вакцинъ, оказались непримѣнимыми по отношенію къ бѣшенству и пришлось отыскивать новые.

Дженеръ первый доказалъ возможность ослабленія яда, путемъ переноса съ одного животнаго на другое; такъ, ядъ, которому онъ далъ название *grease* и который мы называемъ *horse-poх*, будучи имъ перенесенъ съ лошади на корову, значительно ослаблялся въ своихъ свойствахъ и могъ безопасно быть привитъ человѣку. На основаніи уже этого факта могла явиться мысль о возможности ослабленія и яда собачьяго бѣшенства, путемъ переноса черезъ цѣлый рядъ промежуточныхъ животныхъ. Въ этомъ направлениі пами было сдѣлано много изслѣдований, но большинство испробованныхъ животныхъ, подобно кроликамъ и морскимъ свинкамъ, не только не ослабляли, а наоборотъ, — увеличивали силу яда. Къ счастью, получились хорошие результаты съ обезьянкою.

6-го декабря 1883 года обезьянѣ сдѣлана была, посредствомъ трепанациіи, прививка продолговатаго мозга бѣшенной собаки, зараженной ядомъ, добытымъ отъ ребенка, умершаго отъ водобоязни: черезъ 11 дней животное заболѣло собачьимъ бѣшенствомъ. Отъ этой первой обезьянѣ сдѣлана прививка второй, которая также заболѣла бѣшенствомъ черезъ 11 дней; у третьей бѣшенство обнаружилось только черезъ 23 дня и т. д.

Продолговатый мозгъ каждой обезьяны всегда прививался двумъ кроликамъ посредствомъ трепанациі. Кролики, получившие ядъ отъ первой обезьяны, заболѣли бѣшенствомъ между 13-мъ и 16-мъ днемъ; отъ второй — между 14-мъ и 20-мъ днемъ; отъ третьей — между 26-мъ и 30-мъ днемъ; отъ четвертой — оба привитыхъ кролика заболѣли черезъ 28 дней; отъ пятой — черезъ 27 и отъ шестой — черезъ 30 дней.

Эти опыты не оставляютъ никакого сомнѣнія, что, при переносѣ съ одной обезьяны на другую и съ различныхъ обезьянъ на кроликовъ, сила яда, по отношенію къ послѣднимъ, ослабляется; точно также она ослабляется и по отношенію къ собакамъ. Прививка собакѣ яда, полученнаго отъ 6-ой обезьяны, дала инкубационный періодъ въ 58 дней, хотя прививка была произведена посредствомъ трепанациі.

Другія наблюденія той-же категоріи, сдѣланныя надъ цѣлымъ рядомъ обезьянъ, привели къ тѣмъ-же результатамъ. Слѣдовательно, мы имѣемъ способъ ослаблять ядъ собачьяго бѣшенства. Послѣдовательныя прививки отъ одной обезьяны другой даютъ такие яды, которые, будучи привиты кроликамъ, удлиняютъ инкубационный періодъ развивающагося у нихъ бѣшенства. Но если мы станемъ прививать ядъ послѣднихъ другимъ кроликамъ, то будемъ наблюдать опять законъ возрастанія силы яда, о которомъ говорили выше.

Эти факты даютъ намъ возможность примѣнить предохранительное привививание отъ бѣшенства на собакахъ. Для того чтобы собака не погибла отъ введенія ей яда подъ кожу или въ вену, этотъ ядъ необходимо взять у кролика, зараженнаго отъ одной изъ послѣднихъ обезьянъ. Слѣдующія предохранительныя прививанія ей дѣлаются отъ кроликовъ, которымъ привить ядъ первого кролика.

Въ нашихъ опытахъ мы обыкновенно брали ядъ отъ павшаго кролика, у которого инкубационный періодъ болѣзни продолжался четыре недѣли; прививая его послѣдовательно отъ кролика кролику, мы получали ядъ для предохранительныхъ прививаній, которыя повторяли 3 или 4 раза. Не стану входить

здесь во все подности, тѣмъ болѣе, что все это на практикѣ можетъ быть упрощено.

Мое сообщеніе, м. гг., представляетъ, однако, большой проблѣ; я не говорю о микробѣ бѣшенства, такъ какъ его у насъ нѣтъ. Способъ изолированія этого микробы оставляетъ желать еще многаго, и мы не могли побѣдить всѣхъ трудностей для культивированія его въ животнаго организма, хотя средою для культуры избирали свѣжее первное вещество. Тѣмъ болѣе вниманіе должно быть обращено на наши методы изслѣдованія. Долго еще придется бороться съ заразными болѣзнями, микробы которыхъ не поддаются изслѣдованію. Чрезвычайно трудно найти способъ прививки заразной болѣзни, не получивъ ея яда, не умѣя изолировать и культивировать ея микробы.

Открывши способъ вакцинировать собакъ и имѣя у себя большое количество этихъ животныхъ, находящихся въ состояніи иммунитета къ бѣшенству, вспомнивъ также ту оппозицію, которую встрѣтили въ началѣ открытия Дженера, я пожелалъ передать изложенные факты на обсужденіе компетентной комиссіи. Министръ народнаго просвѣщенія Фальерь, которому я сообщилъ свой проектъ, одобрилъ его и поручилъ гг. Беклару, П. Беру, Булею, Эмеро, Вилемену и Вульпіану подвергнуть контролю факты, коротко сообщенные мною въ засѣданіи Академіи Наукъ 19 мая настоящаго года. Комиссія, избравъ въ предсѣдатели Булея, а въ секретари Вилемена, немедленно приступила къ занятіямъ, и мнѣ пріятно сообщить вамъ, что она уже представила министру первый отчетъ. Факты, приводимые въ первомъ отчетѣ упомянутой комиссіи, слѣдующіе.

Я представилъ комиссіи 19 собакъ вакцинированныхъ, т. е. сдѣлавшихся невосприимчивыми къ бѣшенству вслѣдствіе предохранительныхъ прививаній. Эти собаки, изъ которыхъ только 13 подвергались контрольной прививкѣ посредствомъ трепанациіи, сравнивались по различнымъ серіямъ съ 19-ю контрольными собаками. Прежде всего 1-го июня, посредствомъ трепанациіи, сдѣлана была прививка яда бѣшеної собаки двумъ вакцинированнымъ и двумъ контрольнымъ собакамъ. 3-го июня вакцинированная и контрольная собаки были укушены бѣшеної со-

бакою. 4-го іюня эта же бѣшеная собака укусила еще одну вакцинированную контрольную собаку. 6-го іюня бѣшеная собака, служившая для опытовъ 3-го и 4-го іюня, пала и ея продолжаватый мозгъ послужилъ материаломъ для прививки посредствомъ трепанациі тремъ вакцинированнымъ и тремъ контрольнымъ собакамъ. 10-го іюня еще одна вакцинированная и одна контрольная собаки были укушены бѣшеною собакою. 16-го іюня две собаки — вакцинированная и контрольная — были укушены одною изъ контрольныхъ собакъ, взбѣшившейся 14-го іюня вслѣдствіе прививанія, сдѣланаго ей 1-го іюня. 19-го іюня въ присутствіи комиссіи была сдѣлана прививка въ подкожную вену тремъ вакцинированнымъ и тремъ контрольнымъ собакамъ изъ продолжавшаго мозга бѣшеної собаки. 20-го іюня, также въ присутствіи комиссіи была сдѣлана прививка черезъ вену 6-ти вакцинированнымъ и 4-мъ контрольнымъ собакамъ. 28-го іюня комиссія, получивъ извѣстіе, что у г. ветеринара, Поля Симона, находится бѣшеная собака, подвергла укушенію этой собаки двухъ вакцинированныхъ и двухъ контрольныхъ собакъ. Комиссія такимъ образомъ наблюдала 38 собакъ, изъ числа которыхъ 19 вакцинированныхъ и 19 контрольныхъ. Оставившіяся изъ нихъ въ живыхъ находятся еще подъ наблюдениемъ. До настоящаго времени изъ 19 контрольныхъ собакъ умерли отъ бѣшенства: три изъ шести укушенныхъ, пять изъ семи, зараженныхъ черезъ впрыскиваніе въ вену и все пять, привитыхъ по способу трепанациі, между тѣмъ такъ изъ 19 вакцинированныхъ собакъ ни одна не заболѣла бѣшенствомъ.

Во время опытовъ 13 іюля одна вакцинированная собака умерла отъ діарреи, появившейся у ней въ первыхъ числахъ іюля. Чтобы убѣдиться, что она умерла не отъ бѣшенства, сдѣлана была по способу трепанациі прививка ея мозга З кроликамъ и морской свинкѣ: все 4 животныхъ здоровы до сихъ поръ. Это можетъ служить явнымъ доказательствомъ, что собака умерла не отъ бѣшенства.

Во второмъ отчетѣ комиссіи будетъ сообщено объ иммунизитетѣ 20 собакъ, вакцинированныхъ самой комиссіей.

Паконецъ, Пастеръ сообщилъ еще о полученномъ имъ первомъ отчетѣ комиссіи, изъ котораго видно, что изъ 23 вакцинированныхъ собакъ ни одна не заразилась бѣшенствомъ отъ укусенія бѣшеными животными, тогда какъ между контрольными собаками, втеченіе только двухъ мѣсяцевъ, бѣшенство развилось отъ той же причины у 66 %.

Приложение 5-ое.

Парижская Медицинская Академія.

Предохранительное лѣченіе бѣшенства по методу Пастера.

Засѣданіе 5-го іюля 1887 года.

Г. Пастеръ представляетъ академическому бюро экземпляръ отчета Local government Board о предохранительномъ лѣченіи бѣшенства — отчета, который подтверждаетъ экспериментальные результаты, полученные въ Парижѣ, въ дѣлѣ предохранительного лѣченія этой болѣзни. Онъ прибавляетъ, что чтеніе этого отчета было для него источникомъ наиболѣе чистой радости за всю его долгую ученую дѣятельность.

Г. Петеръ. Въ январѣ прошлаго года я нашелъ нужнымъ представить вниманію академіи опасность интенсивнаго метода. Съ того времени методъ настолько измѣненъ, что вовсе не походитъ уже на тотъ, который былъ мною разсмотрѣнъ. Уже болѣе не осмѣливаются прививать на третій день свѣжій однодневный мозгъ. Въ самомъ отчетѣ Горсли объявлено, что методъ совершенно измѣненъ. Не смотря на это, я утверждаю, что и смѣшанный методъ, какимъ его примѣняютъ теперь, не можетъ практиковаться безопасно, въ подтвержденіе чего я приведу только слѣдующій фактъ, который произошелъ на дняхъ въ больницѣ св. Антона: человѣкъ, укушенній собственою собакой

29 мая прошлого лѣта, былъ предохраненъ въ тотъ же день въ институтѣ Пастера. Онъ былъ привитъ однімъ изъ учениковъ самого Пастера, — слѣдовательно, нельзя возражать, что прививающій былъ не компетентенъ. Ему была привита жидкость пастеровская; нельзя сказать, что жидкость была дурнаго качества. Черезъ 32 дня послѣ этихъ прививокъ, въ несчастномъ обнаружились признаки бѣшенства и онъ умеръ отъ конвульсивнаго бѣшенства черезъ 35 дней послѣ укушенія, т. е. въ періодъ времени обыкновенной инкубациіи бѣшенства. Это бѣшенство было конвульсивнымъ, а не паралитическимъ. Больной пришелъ пѣшкомъ въ госпиталь и представилъ во время болѣзни всѣ припадки несомнѣннаго бѣшенства. Г. Гаемъ можетъ, если нужно, описать вамъ ихъ. Я прибавлю, что этотъ человѣкъ, умершій отъ конвульсивнаго бѣшенства, пополняетъ собою среднюю цифру 9-ти послѣднихъ мѣсяцевъ, равную обычной для Франціи.

Оцѣнка пригодности метода, какой-бы онъ ни былъ, какъ бы высоко ни стоялъ его авторитетъ, есть *понижение смертности. Вы можете сколько угодно доказывать, что прежде статистика была хуже, что только ваша точна, но вѣдь это значитъ присвоить себѣ слишкомъ много преимущества. Говорить, что прежде скрывали бѣшенство, не есть серьезный аргументъ. Есть въ некоторыхъ семьяхъ болѣзни, которые скрываютъ, потому что знаютъ, что они могутъ быть наследственны — таковы чахотка, ракъ, сифилисъ, эпилепсія, сумасшествіе; но не станутъ скрывать смерти вслѣдствіе пожара комической оперы, такъ какъ хорошо знаютъ, что наследственность здѣсь не причемъ.

Г. Пастеръ. Я прибавлю лишь одно слово: въ январѣ этого года, вамъ въ этой академіи сказали, что методъ предохранительной прививки бѣшенства во-1-хъ — недѣйствителенъ, во-2-хъ — опасенъ.

Что касается первого упрека, я прошу замѣтить, что не было дано ни одного дѣйствительного доказательства безполезности прививокъ, а теперь англійская комиссія, въ которой принимали участіе знаменитѣйшіе доктора и физіологи Англіи, заявляетъ, что этотъ методъ вполнѣ дѣйствителенъ. Я поэтому считаю произнесенные предъ вами слова пустыми и неосновательными.

Во 2-хъ, вамъ было сказано, что методъ опасенъ. Этому не было дано ни одного научнаго доказательства. Есть только одинъ способъ доказать, что смерть произошла отъ бѣшенства (и это также самыи категорическимъ образомъ подтверждается англійской комиссіей): это есть прививка продолжатаго мозга человѣка, умершаго отъ паралитического или всякаго другаго бѣшенства, прививка кроликамъ или другимъ животнымъ. Если прививка произведеть въ нихъ бѣшенство, тогда можно утверждать, что больной умеръ отъ бѣшенства.

Было-ли вамъ дано такое доказательство теперь? Итакъ, вы ничѣмъ не можете доказать недѣйствительность или опасность предохранительныхъ прививокъ. Что же касается дальнѣйшихъ споровъ съ лицомъ, только что говорившимъ, то я отказываюсь отъ нихъ, такъ какъ считаю это лицо некомпетентнымъ какъ клинически, такъ и экспериментально...

Петеръ. Нельзя быть некомпетентнымъ, цитируя факты...

Пастеръ. Академіи извѣстно, что много врачей французовъ и иностранцевъ присутствовало при всѣхъ операціяхъ и опытахъ прививокъ бѣшенства въ моей лабораторіи. Въ настоящее время нѣсколько изъ этихъ врачей назначены директорами антирабическихъ институтовъ (число ихъ простирается теперь до 15, считая Европу, обѣ Америки и Парижъ). Эти доктора дѣлали многочисленные опыты и всегда получали результаты, согласные съ моими. Нѣсколько докторовъ: Фришъ — изъ Вѣны, г. Рензи и Аморозо — изъ Неаполя (въ сущности я не долженъ бы считать г. Рензи, такъ какъ онъ только сотрудникъ г. Аморозо и не былъ въ Парижѣ), г. Абре — изъ Португалии дѣлали опыты съ материаломъ, которымъ я ихъ снабдилъ, или-же материаломъ, полученнымъ ими отъ другихъ директоровъ антирабическихъ институтовъ — и они получили результаты, совершенно противуположные тѣмъ, которые они передъ тѣмъ видѣли въ Парижѣ.

Фришъ, напримѣръ, опубликовалъ въ формѣ краткихъ выводовъ настоящій обвинительный актъ противъ моего метода, но такъ какъ не были представлены подробности опытовъ, послужившихъ для его заключеній, то я ничего не могъ отвѣтить.

Впослѣдствіи Фришъ издалъ трудъ болѣе пространный, котораго я ожидалъ съ нетерпѣніемъ и который я поручилъ перевести, какъ только онъ появился. Я сейчасъ-же отвѣтилъ этому изслѣдователю, что всѣ его опыты были неточны, такъ какъ бѣшенный ядъ, который данъ ему, испортился въ его рукахъ. Доказано, въ самомъ дѣлѣ, что малѣйшій посторонній микробъ ведетъ къ чрезвычайно важнымъ послѣдствіямъ, когда дѣлаются прививки.

Опыты гг. Рензи и Аморозо также, впрочемъ, какъ и Фриша, были опровергнуты въ «Лѣтописахъ Пастеровскаго института», редактируемыхъ г. Дюкло. Всякій можетъ ознакомиться съ изложеніемъ тамъ опроверженіемъ, которое я считаю совершенно правильнымъ. Опыты г. Абре еще болѣе ошибочны: онъ прививаетъ здоровый кроличій мозгъ путемъ трепанациі на поверхность мозга и получаетъ параличи, напоминающіе типичные для бѣшенства. Эти результаты совершенно не точны. Въ моей лабораторіи много разъ прививали здоровый мозгъ на поверхность мозга, и ни въ одномъ случаѣ это не вызывало ни малѣйшаго нарыва; животное чувствовало себя хорошо и скоро выздоравливало. Вещество, употребляемое г. Абре, было навѣрное не чисто. Слѣдовательно, его опыты могутъ быть отнесены къ ничего незначащимъ и ничего не стоющимъ. Докладъ англійской комиссіи достаточно доказателенъ. Всѣ англійскіе ученые достигли тѣхъ-же результатовъ, которые были получены въ моей лабораторіи. Я повторяю, что не намѣренъ вступать въ пренія съ только что говорившимъ членомъ академіи, такъ какъ его считаю не компетентнымъ. Даже довольно странно, что, послѣ 7—8 лѣтъ ежедневныхъ опытовъ въ моей лабораторіи, является лицо, которое осмѣливается въ такомъ обществѣ, какъ медицинская академія, говорить, что все сдѣланное было не точно, ложно, опасно, и т. д. и, повторяю еще разъ, что возражать не буду до тѣхъ поръ, пока мнѣ не представятъ результатовъ серьезныхъ опытовъ.

Петеръ. Я прошу слово.

Г. предсѣдатель. Г. Петерь, я только по поводу представлений, сдѣланного г. Пастеромъ, позволилъ вамъ говорить; если

вы будете еще возражать, то начнутся настоящія пренія, а у насъ много текущихъ вопросовъ; такъ что, если вы желаете, я вамъ представлю слово въ слѣдующемъ засѣданіи.

Нѣсколько голосовъ. Къ текущимъ дѣламъ!...

Петеръ. Согласно желанію г. предсѣдателя, я отвѣчу въ слѣдующемъ засѣданіи.

Засѣданіе 12-го іюля.

Петеръ. По странному совпаденію, наканунѣ того дня, когда г. Пастеръ представилъ академіи отчетъ англійской комиссіи, подтверждающей, повидимому, дѣйствительность его метода, я получилъ отъ доктора Микеля телеграмму, извѣщающую меня о смерти отъ бѣшенства человѣка, привитаго Пастеромъ.

По не менѣе странному совпаденію, черезъ 8 дней, когда я долженъ былъ взойти на эту трибуну, чтобы высказать передъ вами мою некомпетентность по части бѣшенства, я получилъ отъ доктора Девилье изъ Гиза департамента Эны телеграмму, извѣщающую о смерти другаго, привитаго Пастеромъ. Вотъ эта телеграмма:

Гизз, 11-го іюля.

«Буржо, община Одинь (Энъ), укушенній 24 апрѣля; собака бѣшеннная; лѣчился въ институтѣ Пастера 28 апрѣля; вышелъ 21 мая, умеръ сегодня отъ бѣшенства. Докторъ Девилье».

Эта новая жертва бѣшенства была привита черезъ 4 дня послѣ укушенія. Такимъ образомъ, нельзя ссылаться на то, что слишкомъ много времени прошло отъ зараженія организма до примѣненія лѣкарства. Словомъ, человѣкъ умеръ черезъ 48 дней послѣ укушенія, т. е. въ обычновенный срокъ классической инкубациіи бѣшенства, которую не могли продлить прививки Пастера. Итакъ гг., еще никогда не было столько смертности отъ бѣшенства, какъ со времени открытия спасительного лѣкарства. Теперь поговоримъ о моей некомпетентности. Прошлый вторникъ я представилъ академіи случай смерти Гюро, привитаго въ институтѣ Пастера, при условіяхъ самыхъ благопріятныхъ для

успѣшности метода; а на это мнѣ отвѣчаютъ, что я некомпетентъ,— некомпетентъ во всѣхъ отношеніяхъ, не только опытно, но и клинически. Я не понимаю!

Развѣ Гюро не умеръ? Умеръ не отъ бѣшенства? Не отъ бѣшенства — послѣ укушенія? Не послѣли и не смотря на прививки? Не въ среднихъ предѣлахъ инкубациіи бѣшенства? Въ предѣлахъ, которые прививка, якобы предохраняющая, не въ состояніи была даже расширить? Какъ?! Я представляю случай смерти отъ бѣшенства, не смотря на якобы предохранительную прививку, — смерти, которая рѣшительно доказываетъ ея недѣйствительность, а мнѣ отвѣчаютъ, что англійская комиссія рѣшила, что методъ дѣйствителенъ! Какъ?! Я представляю случай смерти отъ бѣшенства, произведенаго однимъ и единственнымъ укушеніемъ въ палецъ, а не въ лицо (укушеніе въ палецъ считается пастеріанцами менѣе опаснымъ, чѣмъ въ лицо), — а мнѣ говорять, что англичане дали свое *satisfecit* методу въ тоже время, какъ изслѣдователи въ Вѣнѣ, Неаполѣ и Лисабонѣ производили работы, ничего не стоящія!..

Вотъ что называется уклоненіемъ отъ отвѣта! Выносишь впечатлѣніе, что Пастеръ вспомнилъ рѣчь, приготовленную заранѣе и предназначеннуу опровергать возраженія, которыя ему не были сдѣланы. Такимъ образомъ уста того, который мнѣ не захотѣлъ отвѣтить, ошиблись какъ числомъ, такъ и предметомъ.

Итакъ рѣшено: я говорю о случаѣ смерти отъ бѣшенства, не смотря на будто-бы предохраняющую прививку, а меня называютъ некомпетентнымъ.

Некомпетентнымъ какъ? Почему? Некомпетентнымъ относительно неуспѣшности метода, будто-бы предохраняющаго: но надо не имѣть глазъ, чтобы этого не видѣть; некомпетентнымъ относительно опасности интенсивнаго метода: но надо вовсе не имѣть мозговъ, чтобы его не осудить. Однако, разсудивъ, я начинаю понимать: я некомпетентенъ потому, что не дѣлалъ опытовъ. И $\frac{99}{100}$ изъ моихъ коллегъ въ этой академіи въ этомъ случаѣ также некомпетентны, какъ и я. Не дѣлалъ опытовъ! Но тотъ, который думаетъ, что открылъ предохраняющее средство отъ бѣшенства, дѣлалъ ихъ за меня. Чаконецъ опыты фонъ-

Фриша въ Вѣнѣ, Абре въ Лиссабонѣ, Рензи и Аморозо въ Неаполѣ привели къ результатамъ, противнымъ пастеровскимъ.

Къ тому же я быль-бы очень затрудненъ: будучи клиницистомъ 35 лѣтъ и взявшиесь вдругъ за опыты, я по справедливости могъ бы заставить сомнѣваться въ моей компетентности. Потому я имѣю полное право въ этомъ опытномъ дѣлѣ руководиться опытами другихъ.

Но здѣсь опять я перестаю понимать. Тотъ, который претендуетъ на открытие предохранительного лѣчения бѣшенства, дѣлалъ опыты въ Парижѣ; онъ посвятилъ въ нихъ людей такихъ, какъ гг. Фришъ (профессоръ бактериологии въ Вѣнѣ), Абре (членъ академіи наукъ въ Лиссабонѣ), Аморозо (доцентъ медицинского факультета въ Неаполѣ); и вотъ мы видимъ, что въ Вѣнѣ, Лиссабонѣ и Неаполѣ посвященные самимъ Пастеромъ, тѣмъ, который думаетъ, что открылъ бѣшенство, приходятъ къ выводамъ, совершенно противоположнымъ пастеровскимъ. Тутъ могло-бы имѣть мѣсто сомнѣніе, но Пастеръ не колеблется объявить, что опыты въ Вѣнѣ, Лиссабонѣ и Неаполѣ ошибочны, и потому ничего не стоятъ. Такимъ образомъ, и экспериментаторы, какъ фонъ-Фришъ, Аморозо и Абре объявлены некомпетентными, какъ и клиницисты Петеръ.

Наоборотъ, Пастеръ заявляетъ, что изслѣдованія Горсли, молодаго человѣка 29 лѣтъ, профессора, какимъ быль и я, когда читалъ лекціи въ Практической школѣ, получившаго результаты, сходные съ тѣми, которые были получены въ улицѣ Вокеленъ, одни только и цѣнны, и что Горсли одинъ компетентъ. Такъ что въ этомъ экспериментальномъ вопросѣ улица Вокеленъ имѣеть противъ себя число, потому что ея опыты опровергнуты тремя и подтверждены однимъ. Но опыты улицы Вокеленъ дѣлались для достиженія практической цѣли, для выработки метода предохраняющаго, т. е. врачеванія, и здѣсь меня также объявляютъ некомпетентнымъ. Но въ этомъ случаѣ компетентность ограничивается простымъ сужденіемъ о способѣ лѣченія. Не я примѣняю это лѣченіе, оно примѣняется личностями компетентными посредствомъ компетентныхъ жидкостей; я оцѣниваю только результаты. Всякое лѣченіе судится по умень-

шеною смертности, и годичная смертность отъ бѣшенства, со временем примѣненія предохраниющаго лѣченія, одинакова со средней смертностью отъ бѣшенства въ нашей странѣ. Ничего, такимъ образомъ, не измѣнилось во Франціи: стало только однімъ методомъ, якобы предохраниющимъ отъ бѣшенства, больше.

Вотъ, впрочемъ, официальное перечисленіе умершихъ отъ бѣшенства послѣ прививки г. Пастеромъ съ 1 января 1887 г.

- 1) Янзенъ, 1 января 1887 года.
- 2) Жераръ, 3 января 1887 года.
- 3) Горіо, 14 января 1887 года.
- 4) Берже (изъ Бордо), ребенокъ, 30 января 1887 г.
- 5) Фоплю (департ. Useph), 24 октября 1887 г.
- 6) Альфонъ (женщина), изъ Винье (Нижніе Альпы), 30 января 1887 г.
- 7) Сентисъ (изъ Алжира), 24 февраля 1887 г.
- 8) Шаваньякъ (ребенокъ изъ Арбъ), 10 марта 1887 г.
- 9) Гидрамъ (изъ Саллена) 56 лѣтъ, 17 апрѣля 1887 г.
- 10) Гаше (изъ Вьерлона) 25 лѣтъ, 2 мая 1887 г.
- 11) Гюро (въ Парижѣ) 42 года, 4-го іюля 1887 г.
- 12) Буржо (изъ Гиза), 11 іюля 1887 г.

Нужно прибавить къ этому умершихъ безъ прививки. Взявъ среднее число за 1886 г., которое составляетъ 18, на полгода 9, и прибавивъ къ вышепазваннымъ 12-ти, получимъ 21 случай за полгода, т. е. 42 за годъ. Это болѣе обыкновенной средней смертности.

Я знаю, что въ своихъ статистикахъ вы нагромождаете Пелонъ на Оссу, горы привитыхъ на горы укушенныхъ, но эти ужасающія статистики не убѣдительны для серьезныхъ врачей.

Я прекрасно знаю, что мнѣ возразить, что прежнія статистики были дурно составлены и что хороши только тѣ, которыя составлялись въ улицѣ Бокеленъ.

Но это уловка: слишкомъ ужъ удобно отвергать официальные данные, потому что числа ихъ говорятъ противъ предохраниющаго лѣченія. Случай смерти отъ бѣшенства слишкомъ ужасенъ, чтобы пройти незамѣченнымъ, не произвести шума и не быть записаннымъ въ официальныхъ запискахъ. Бѣшенство

у человѣка есть очень рѣдкая болѣзнь. Я видѣлъ впродолженіе своей 35-лѣтней практики, какъ городской, такъ и больничной, только 2 случая; и мои коллеги въ больницахъ и въ деревняхъ считаютъ такие случаи единицами, а не десятками и отнюдь не сотнями. Чтобы придать своему методу болѣе благодѣтельности, Пастеру выгодно предполагать, что смертность отъ бѣшенства во Франціи больше настоящей, но не таковъ интересъ истины. Хотите ли знать, напримѣръ, сколько умерло отъ бѣшенства въ Дюнкиркѣ за 25 лѣтъ? — Одинъ. А хотите ли знать, сколько умерло въ томъ-же городѣ со времени примѣненія метода Пастера за одинъ годъ? — Одинъ Янзенъ: это говорить за благодѣтельность метода! Предположить, съ другой стороны, что прежніе статистики ошибались, такъ какъ смерть отъ бѣшенства скрывали, какъ постыдную для семьи, — сущій вздоръ: скрываютъ, если можно, болѣзни наследственныя, чего нельзя сказать про бѣшенство. На дѣлѣ, опыты г. Пастера были предприняты съ цѣлью выработать способы лѣченія. Этотъ способъ можетъ быть судимъ, конечно, только по своимъ результатамъ, и мнѣ вовсе не нужно для оцѣнки ихъ передѣлать всѣ опыты лабораторіи. Какъ клиницистъ, я разбираю фактъ терапевтической клиники и я здѣсь компетентенъ — или не существуетъ никакой логики! Г. Пастеръ возражаетъ мнѣ, что я не доказалъ, что въ случаяхъ смерти отъ паралитического бѣшенства, послѣдовавшихъ вслѣдъ за интенсивнымъ методомъ, если не вслѣдствіе его, я не доставилъ доказательства путемъ прививки продолговатаго мозга этого человѣка и, такимъ образомъ, мое заявленіе не имѣть основанія. Онъ еще не дошелъ до того, чтобы доказывать, что несчастный не умеръ вовсе; онъ только говоритъ, что онъ умеръ иначе. Вы можете сдѣлать то-же возраженіе относительно Гюро (изъ Парижа) и Буржо (изъ Гизы), такъ какъ мозгъ ихъ не былъ привитъ. Я не знаю, такъ-ли требовательны въ доказательствахъ минералоги, въ отдѣленіи которыхъ состоитъ членомъ Пастеръ, по мы, обыкновенные смертные, доктора, болѣе довѣрчивы и, чтобы объявить, что большой умеръ, напримѣръ отъ оспы, мы не доказываемъ этого прививкой.

Для этого достаточно констатировать предвестники болезни и увидать пустулы.

Нѣкогда и по поводу бѣшенства мы осмѣливались говорить, что больной умеръ отъ бѣшенства, если знали, что онъ укушенъ былъ бѣшеной собакою и представлялъ явленіе или конвульсивнаго, или, особенно со временемъ интенсивнаго метода, паралитическаго бѣшенства, съ предшествовавшими и сопровождавшими болями въ поясницѣ и животѣ. Но г. Пастеръ все это измѣнилъ.

Здѣсь я долженъ коснуться одного изъ важнѣйшихъ вопросовъ доктрины.

Г. Пастеръ воображаетъ себя продолжателемъ Дженнера, въ чёмъ онъ ошибается, какъ и во многихъ другихъ вопросахъ медицины. На самомъ дѣлѣ, онъ продолжаетъ прежнія прививки, — прививки оспы, со всевозможными опасностями, которыя бывали результатомъ этихъ прививокъ, не смотря на многочисленныя предосторожности, которыми ихъ окружали.

Дженнеръ прививалъ естественный ядъ *cow-pox*, всегда безвредный и не способный произвести опасной болезни; а прививатели употребляли ядъ оспы что дѣлаетъ и Пастеръ: онъ прививаетъ ядъ сибирской язвы, краснухи свиней со всѣми несчастными случаями, связанными съ подобными операциами.

И на дѣлѣ такие случаи бываютъ: ослабленный ядъ его получается путемъ искусственной фабрикаціи, а не естественной, потому и подверженъ всѣмъ случайностямъ фабрикаціи. Такъ, отъ времени до времени умираютъ животныя отъ сибирской язвы или краснухи, отъ которыхъ ихъ хотѣли предохранить, и приходится тогда платить неустойки владѣльцамъ стадъ.

Съ научной точки зрењія, это странное злоупотребленіе словами — называть вакцинацией подобныя инокуляціи.

А практически это значитъ презирать человѣческую жизнь, примѣняя къ человѣку по случаю бѣшенства такое лѣченіе. Къ тому еще, во всей этой исторіи съ бѣшенствомъ тотъ, который думаетъ, что нашелъ предохранительное лѣченіе для него, занимается только эмпирізмомъ подъ соусомъ противорѣчій. Противорѣчіе — относительно ученія о заразительныхъ болѣзняхъ:

каждая заразительная болѣзнь должна имѣть своего микроба, а бѣшенство его не имѣть. Тогда тотъ, которому я отвѣчаю, обходится смѣло безъ него: эмпиризмъ, — когда онъ культивируетъ не микроба, котораго онъ не знаетъ, а бѣшеные мозги, которые онъ переводить изъ одного живаго организма въ другой; эмпиризмъ, — когда онъ переходитъ въ своихъ прививкахъ отъ организма кролика къ организму собаки; еще большій, смѣлѣйшій, но наименѣе основательный эмпиризмъ, — когда онъ переходитъ отъ своихъ опытовъ надъ собаками до укушенія, къ опытамъ надъ человѣкомъ послѣ укушенія бѣшенымъ животнымъ. Есть громадная разница между организмами человѣка и собаки, и еще большая между опытами надъ собакой не укушенной и надъ человѣкомъ укушеннымъ, т. е., который зараженъ бѣшенымъ ядомъ. И эту двойную пропасть Пастеръ хочетъ перешагнуть, пользуясь хрупкимъ мостомъ обманчивой индукціи; такъ какъ, замѣтьте это, тотъ, которому я отвѣчаю, думаетъ, что опровергъ опыты гг. Рензи, Аморозо, и Абрѣ на томъ основаніи, что они производились надъ кроликами, и нельзя по кроликамъ заключить о собакахъ, — онъ-же безъ колебанія и страха осмѣливался по собакѣ судить о человѣкѣ. Я хочу сказать, что г. Пастеръ сдѣлалъ рядъ опытовъ, которые имѣютъ значеніе, какъ произведенные надъ собаками, привитыми до укушенія. Я знаю, что известное число этихъ собакъ, яко-бы предохраненныхъ отъ бѣшенства, взбѣсились послѣ укушенія. Громадная ошибка дѣлать заключенія по собакѣ, привитой до укушенія, о человѣкѣ, привитомъ послѣ него. Однако, именно на этой ошибкѣ зиждется вся система. Я сказалъ, что смертность отъ бѣшенства во Франціи не стала меньше со времени примѣненія метода Пастера, что число смертей осталось то-же, что и въ прежнихъ статистикахъ, и я еще прибавлю, что изъ 4 человѣкъ, укушенныхъ 29 мая, при одинаковыхъ условіяхъ, одинъ умеръ, именно Гюро, слѣдовательно, трое живутъ и, я надѣюсь, выживутъ. Но изъ 6 человѣкъ, укушенныхъ бѣшенымъ животнымъ, пять выживаютъ безъ всякаго лѣченія это — по статистикѣ нашего уважаемаго коллеги г. Леблана. По Гентеру, число оставшихся въ живыхъ было бы еще болѣе, такъ какъ субъекты, избѣгшіе смерти, составляютъ 95%.

Нужно вспомнить, что бѣшенство не есть болѣзнь, свойственная человѣку, что человѣкъ по природѣ къ нему не воспріимчивъ, что и объясняетъ незаболѣваніе многихъ индивидовъ; но эта невоспріимчивость исчезаетъ у лицъ, предрасположенныхъ къ заболѣванію вслѣдствіе порочности ихъ первої системы. Бѣшенство, въ сущности, есть первая болѣзнь, отличающаяся отъ другихъ заразительныхъ болѣзней существенными признаками: она не имѣеть точнаго периода инкубациіи, не сопровождается лихорадкой, не вызываетъ кровотеченій, не сопровождается накожной высыпью, не влечетъ за собой увеличенія селезенки, не имѣеть типическихъ анатомическихъ поврежденій и т. д. Такимъ образомъ, эта болѣзнь и въ основаніи своеемъ — первая, такъ что послѣ укушенія, расположены къ ней тѣ, которые первы или по temperamentу, или вслѣдствіе боязни, горя, или пьянства. Гуро, вслѣдствіе алкоголизма, былъ въ условіяхъ, благопріятныхъ для развитія бѣшенства. Было бы торжествомъ для этихъ прививокъ, если бы онъ предохранили его отъ бѣшенства. Итакъ, трое изъ 4, привитыхъ 29 мая, не заболѣли послѣ прививки и прививатели радуются и торжествуютъ. Имъ это легко дается и, право, они не требовательны. Ихъ торжествомъ было бы, если бы Гуро не умеръ отъ бѣшенства, а онъ умеръ отъ бѣшенства, прежде обычныхъ 40 дней и несмотря на прививки.

Какъ это всегда бываетъ съ изобрѣтателями новыхъ и секретныхъ лѣченій, и въ данномъ случаѣ изобрѣтатель склоненъ ссылаться на смягчающія обстоятельства: одинъ заболѣлъ бѣшенствомъ, несмотря на прививку, которая должна была его предохранить, потому, что велъ безпутную жизнь; другой — потому, что пилъ; третій — потому, что былъ слишкомъ нервнымъ и т. д. Итакъ методъ, абсолютно предохранявшій вначалѣ, сталъ теперь условнымъ. Онъ предохраняетъ только тѣхъ, которые вели чистую жизнь и которые могутъ представить удостовѣреніе въ хорошей жизни и поведеніи.

Мы говорили до сихъ поръ о недѣйствительности метода, но гораздо важнѣе вопросъ о его опасности, происходящей

вслѣдствіе смѣлыхъ операцийъ, производимымъ надъ несчастнымъ субъектомъ, какъ напр. прививка ему на третій день однодневнаго мозга. Я уже обращалъ вниманіе на эту опасность; ее признали и прививатели улицы Вокеленъ; она указана также въ отчетѣ англичанъ, которымъ такъ превозносится тотъ, который думаетъ, что открылъ методъ предохранительного лѣченія бѣшенства. Въ самомъ дѣлѣ, я не могу привести болѣе уничтожающихъ словъ, какъ слѣдующія: «чтобы избѣжать какой-бы то ни было опасности, даже мало вѣроятной, Пастеръ значительно видоизмѣнилъ свой интенсивный методъ, да и въ этой видоизмѣненной формѣ употребляетъ его только въ крайнихъ случаяхъ». Итакъ, по признанію самихъ учениковъ того, который претендуетъ на открытие предохраняющаго лѣченія, интенсивный способъ можетъ повлечь за собой возможность случаевъ (а случай въ этомъ дѣлѣ есть смерть, произведенная вашей прививкой). Какъ же вы осмѣлились, не смотря на возможность такихъ случаевъ, примѣнить этотъ интенсивный методъ къ людямъ? А если подобные случаи невѣроятны, то почему же вы его оставили? Вы не можете выйти изъ этой дилеммы, которая васъ уничтожаетъ. Тотъ, который думаетъ, что нашелъ предохраняющее лѣченіе бѣшенства, хвалится частнымъ успѣхомъ, который онъ недавно получилъ въ Англіи. Но онъ ничего не говорить о неблагопріятномъ отвѣтѣ изъ Брюсселя на предложеніе основать заведеніе для лѣченія бѣшенства; не говорить также о подобномъ же отвѣтѣ изъ Флоренціи на подобное же предложеніе вице-президента Августа Микелачи, профессора. Вотъ этотъ отвѣтъ: «Принимая во вниманіе, что при настоящемъ положеніи вопроса о предохранительномъ лѣченіи бѣшенства нельзя ручаться ни за его несомнѣнную успѣшность, ни за его безопасность, санитарный совѣтъ Флоренціи не находитъ возможнымъ рекомендовать предложеніе основать во Флоренціи лѣчебный институтъ такого рода, но изъявляетъ желаніе, чтобы какой-нибудь институтъ занялся продолженіемъ изысканій съ цѣлью придать вопросу полную и желательную научную точность».

Самое оригинальное то, что англійская комиссія не заключаетъ въ пользу основанія Пастеровскаго института, по говорить

о строгомъ примѣненіи полицейскихъ мѣръ. Вотъ дословно за-
ключение этого отчёта.

1) Приказать истребить при извѣстныхъ условіяхъ всѣхъ
собакъ, не имѣющихъ хозяина и бродящихъ въ деревняхъ и въ
городахъ.

2) Уменьшить налогами или другими мѣрами количество
безполезныхъ собакъ.

3) Запретить ввозъ или подвергать карантину собакъ,
перевезенныхъ изъ мѣстностей, гдѣ свирѣпствуетъ бѣшенство.

4) Сдѣлать обязательнымъ ношеніе намордника въ мѣстно-
стяхъ, гдѣ свирѣпствуетъ бѣшенство; приказать полиції задер-
живать всѣхъ подозрительныхъ собакъ, безъ намордниковъ;
можно было-бы сдѣлать исключение для овчарокъ или другихъ
собакъ, служащихъ для полезныхъ цѣлей.

Я бы могъ еще многое сказать, но слѣдуетъ умѣть огра-
ничиваться. Желаю, однако, привести еще нѣсколько личныхъ
соображеній. Прошлый вторникъ я заявилъ о смерти одного
изъ привитыхъ Пастеромъ, при чёмъ я сдѣлалъ нѣсколько на-
учныхъ замѣчаній по поводу этого случая и все это высказалъ
языкомъ, который мнѣ кажется академическимъ. Тотчасъ-же г.
Пастеръ возразилъ въ выраженіяхъ и перифразахъ, удивившихъ
академію странными оборотами и тономъ. Милостивые Государи,
я долженъ заставить уважать въ себѣ тройное достоинство —
доктора, академика и профессора; я твердо рѣшился не позво-
лить никому себя оскорблять и отвѣтить, какъ подобаетъ.
Еще нѣсколько словъ, чисто личныхъ: въ моихъ научныхъ пре-
ніяхъ и въ преподаваніи я боролся противъ трехъ вещей: во
1) противъ лѣченія тифа холодными ваннами, во 2) лѣченія
проколомъ въ случаяхъ острого плеврита, въ 3) такъ называе-
мago леченія бѣшенства и особенно интенсивнаго метода. Лѣче-
ніе тифа холодными ваннами теперь оставили во Франціи и
употребляютъ холодная ванны только въ случаяхъ, указанныхъ
мною — не съ тѣмъ, чтобы отнять тенло, т. е. понизить тем-
пературу, но чтобы измѣнить состояніе нервной системы. Фи-
зіологические опыты, сообщенные прошлый понедѣльникъ инсти-
туту, потврдили справедливость моихъ положеній. Здѣсь, какъ

это часто бываетъ, клиника предшествовала опыту. Проколь груди не практикуется болѣе во всѣхъ случаяхъ острого плеврита, а только въ иѣкоторыхъ, точно указанныхъ, когда обильный выпотъ принуждаетъ къ этому оператора.

Наконецъ, благодаря вызываемымъ, примѣненiemъ интенсивнаго метода, опасностямъ, онъ отжилъ свой вѣкъ. Благодаря ихъ неуспѣшности, первоначальный и смѣшанный методы тоже исчезнутъ и во всякомъ случаѣ давно уже осуждены умами не предубѣжденныхъ врачей.

Я этимъ заканчиваю, прибавивъ, что академія, какъ и всѣ медики, съ болѣшею пользой могли бы заняться продолженiemъ плодотворныхъ изысканій о переутомлениі мозга и профилактикѣ сифилиса, чѣмъ выслушивать препія о такой рѣдкой болѣзни, какъ бѣшенство. (На скамьяхъ для публики рукоплесканія).

Г. Бруардемъ. Англійская комиссія, посланная въ Парижъ 12 апрѣля 1886 г., болѣе года работала надъ изслѣдованиемъ лѣченія водобоязни по методу Пастера. Методъ веденія ея работъ и способъ ея изслѣдованія образцовы. Она избрала по списку Пастера между случаями съ самыми продолжительными сроками послѣ прививки 90 изъ тѣхъ, которые живутъ по близости Парижа, Лиона и Снт.-Этьена; кромѣ этого выбора, другаго не было сдѣлано. Спрашивая и посѣща больныхъ на дому, комиссія собрала для каждого изъ нихъ совершенно полныя свѣдѣнія: дѣйствительно-ли или предполагаемо бѣшенство собаки; мѣсто и характеръ укушенія, непосредственное лѣченіе ранъ и разъясненія докторовъ или ветеринаровъ, дававшихъ полезныя указанія. Изъ этихъ 90 чел. 24 были укушены въ открытые части тѣла собаками, несомнѣнно бѣшеными, раны не были прижжены и не подвергались никакому лѣченію, которое могло бы помѣшать дѣйствію яда. Въ 31 случаѣ бѣшенство не было удостовѣрено, а въ остальныхъ укушенія были произведены чрезъ одежду. Комиссія думаетъ, что изъ 90 лицъ по крайней мѣрѣ 8 погибли-бы безъ прививки, но всѣ живы.

Комиссія при этомъ провѣрила въ лабораторіи Горсли точность всѣхъ фактовъ, представленныхъ Пастеромъ и безусловно и вполнѣ ихъ подтвердила. По ея мнѣнію, этотъ способъ при-

вивки или вакцинацій, какъ называетъ его иногда Пастеръ, можетъ быть примѣнімъ не только противъ бѣшенства, но могъ бы предохранять человѣка и домашнихъ животныхъ противъ другихъ ядовъ, такихъ-же сильныхъ, какъ ядъ бѣшенства. Имена, подписанныя мною подъ этимъ отчетомъ, не допускаютъ ни комментаріевъ, ни сомнѣй. Послѣ столькихъ доказательствъ, собранныхъ уже втеченіе 2-хъ лѣтъ, — доказательствъ какъ безвредности, такъ и дѣйствительности метода, особенно послѣ отчета англійской комиссіи, Пастеръ имѣетъ право оставить пренія и вернуться въ лабораторію. Но мы не допустимъ, чтобы его противники не встрѣтили отпора и какъ бы ни были они упорны въ своихъ нападеніяхъ, эти нападенія всегда будутъ разбиты во славу французской науки. Вспомните, что произошло въ началѣ этого года?

Въ концѣ декабря разнесся слухъ, что случаи смерти лицъ, привитыхъ Пастеромъ, часты и г. Петеръ представилъ 4 января 1887 года формальное обвиненіе противъ метода.

По его мнѣнію, простая прививка не дѣйствительна, а интенсивная опасна. Тогда-же и въ томъ-же смыслѣ появились заключенія фонъ-Фриша, противныхъ методу, опыты гг. Рензи и Аморозо въ Неаполѣ и Абре въ Португаліи. Всѣ одинаково стоять въ противорѣчіи съ результатами, полученными г. Пастеромъ.

Петеръ могъ думать, что онъ имѣть полное основаніе для своихъ заключеній, онъ могъ съ полнымъ правомъ сказать: я не дѣлалъ опытовъ, но ихъ дѣлали другіе и они отрицаютъ методъ Пастера. Петеръ представилъ также и клиническія доказательства; онъ говорить: новая форма бѣшенства появилась со времени пастеровскихъ прививокъ, — бѣшенство паралитическое, котораго мы прежде не знали и причина котораго кроется въ прививкахъ мозговъ кроликовъ, всегда умирающихъ бѣшенствомъ паралитическимъ.

Отсюда два новыхъ вида бѣшенства, по учению г. Петера: бѣшенство пастеровское и смѣшанное бѣшенство или собачье-пастеровское, которыя онъ противопоставилъ буйному извѣстному бѣшенству или водобоязни.

Наконецъ, г. Петеръ сказалъ: годичная смертность отъ бѣшенства не уменьшилась, она была и осталась отъ 30 до 40; слѣдовательно, методъ недѣйствителенъ.

Тогда г. Вульшанъ и я — мы представили противъ такой точки зрѣнія факты, которые съ тѣхъ поръ ничего не потеряли въ своей цѣнности; однако-же съ тѣхъ поръ обнародованъ еще цѣлый рядъ фактovъ и опытовъ, которые вполнѣ видоизмѣнили всю постановку вопроса: я послѣдовательно разберу данные, относящіяся къ опытаамъ, клиникѣ и статистикѣ.

Опыты. Опыты г. фонъ-Фриша, на которые ссылается г. Петеръ, ошибочны.

Опроверженіе ихъ было сделано Пастеромъ въ письмѣ, адресованномъ Императорскому и Королевскому Обществу врачей въ Вѣнѣ; все, вѣроятно, помнятъ его аргументы: Пастеръ упрекаетъ г. фонъ-Фриша, что тотъ не сумѣлъ сохранить довѣренного ему яда. Фришъ въ 26 контрольныхъ кроликахъ лишь случайно находилъ ядъ предохранительныхъ прививокъ; эти факты, говорить Пастеръ, не только вполнѣ уничтожаютъ тѣ опыты, о которыхъ идетъ рѣчь, но и подрываютъ всякое довѣріе къ труду г. фонъ-Фриша.

Мнѣніе г. доктора Гамалѣя, товарища завѣдующаго бактериологическою станціею въ Одессѣ, объ опытахъ г. фонъ-Фриша вполнѣ согласно съ мнѣніемъ Пастера.

«Г. фонъ-Фришъ, говорить онъ, прививаетъ интенсивно животныхъ, которыя умираютъ въ 3, 4, 5 и 6-ти дневные періоды инкубациіи — срокъ, неизвестный при бѣшенствѣ, и изъ этихъ неудачныхъ опытовъ заключаетъ объ опасности метода».

Но умерли ли эти животныя отъ бѣшенства? Вовсе нѣть, «потому что мозгъ этихъ животныхъ, умершихъ вслѣдствіе интенсивного предохраненія, привитый кроликамъ посредствомъ трепанации, произвелъ въ нихъ не типическую шестидневную инкубацию бѣшенства, а смерть чрезъ разные сроки: отъ 0, 1, 3 до 38 дней. Это можетъ происходить только вслѣдствіе нечистоты яда». Г. Гамалѣя заключаетъ: «...Я повторяю, что методъ Пастера не отвѣтственъ за неудачи г. фонъ-Фриша и что работа послѣдняго ведетъ только къ одному очень скромному выводу, что для

успѣха предохранительныхъ прививокъ необходимъ чистый материалъ».

Опроверженіе опытовъ гг. Рензи и Аморозо, еще болѣе плохихъ, чѣмъ фришевскіе, помѣщено въ «Лѣтописяхъ Пастеровскаго института».

Что касается португальскаго врача, такъ докторъ Бомбордо, разсматривавшій его отчетъ, кончаетъ тѣмъ, что просить правительство о посылкѣ ученаго въ Парижъ, чтобы изучить методъ Пастера и упрочить его въ Лиссабонѣ.

Если опыты, противорѣчащіе методу Пастера, признаны ошибочными, то зато многочисленные опыты со всѣхъ сторонъ міра подтверждаютъ методъ.

Въ Америкѣ Эрнѣстъ, въ Варшавѣ Буйвидъ, въ Вѣнѣ Ульманъ, въ Неаполѣ Вестео, въ Туринѣ Піони и Бордоли Уфредучи получили результаты, сходные съ пастеровскими.

Въ Одессѣ г. Бардаху удается предохранить не только животныхъ свѣжихъ или привитыхъ подъ кожу, но даже собакъ трепанированныхъ и привитыхъ ядомъ уличнаго бѣшенства. На 15 собакъ 9 разъ предохраненіе интенсивнымъ методомъ было удачно и г. Бардахъ говоритъ: «я очень счастливъ, что мои опыты являются подтвержденіемъ изслѣдованій, о которыхъ г. Пастеръ говоритъ въ концѣ своего сообщенія отъ 2-го ноября, гдѣ сказано, что можно предохранять даже послѣ трепанациі».

Наконецъ, англійская комиссія подвергла не трепанациі, а укушенію собаки въ буйномъ бѣшенствѣ собакъ свѣжихъ и «предохраненныхъ» или привитыхъ; первыя погибли, а вторыя все остались въ живыхъ.

Коммисія подтверждаетъ, равнымъ образомъ, возможность прививать животныхъ и человѣка послѣ укушенія, такъ какъ она говоритъ:

«Изъ этихъ очевидныхъ фактовъ мы заключаемъ, что прививки, производимыя Пастеромъ надъ субъектами, укушенными бѣшенными животными, помѣшали, въ большинствѣ случаевъ, развитію бѣшенства, которое появилось бы, если бы не были сдѣланы прививки».

Итакъ, я полагаю, что опытная сторона дѣла решена въ пользу Пастера.

Клиника. Г. Петеръ въ январскихъ преніяхъ привелъ клиническія возраженія, указывая на подобіе симптомовъ паралитического бѣшенства кроликовъ съ тѣми, которые представляли нѣкоторые субъекты, привитые въ лабораторіи Пастера. Онъ заключаетъ, что паралитическое бѣшенство было передано интенсивными прививками. Этотъ аргументъ имѣлъ тогда нѣкоторую силу, такъ какъ мы мало и плохо были знакомы съ паралитическимъ бѣшенствомъ и въ статьѣ словаря, которую я составлялъ, эта форма бѣшенства не описана.

Ванъ Свитенъ указалъ, однако, на одинъ случай бѣшенства, до точности сходный съ тѣмъ, которое г. Петеръ хотѣлъ приписать дѣйствію пастеровской лабораторіи. Но случай казался исключительнымъ.

Въ дѣйствительности же, этотъ видъ бѣшенства встречается гораздо чаще, нежели мы предполагали.

Уже г. Вульшанъ въ своемъ отвѣтѣ г. Петеру привелъ нѣсколько случаевъ паралитического бѣшенства, помимо прививокъ.

Съ тѣхъ поръ г. Гамалля издалъ наблюденія надъ 19 случаями различныхъ типовъ этой формы.

Въ Россіи этотъ видъ бѣшенства довольно обыкновененъ, особенно послѣ многочисленныхъ и тяжкихъ укусовъ.

Г. докторъ Рикошонъ опубликовалъ только что новый случай этой же формы.

Словомъ, у привитыхъ или непривитыхъ, привитыхъ простымъ или интенсивнымъ способомъ, бѣшенство клинически имѣть разнообразныя формы проявленія, такъ какъ ядъ можетъ дѣйствовать на мозгъ спинной, или на мозгъ головной, или же на продолговатый.

Приведу только одинъ фактъ — случай съ Берже, котораго лѣчили интенсивнымъ способомъ: онъ умеръ съ признаками смѣшанного бѣшенства, формой черепно-спинной или собачье-пастеровской, если выразиться языккомъ г. Петера. Его продолговатый мозгъ былъ привить частью въ Бордо профессоромъ Питромъ, частью въ Парижъ въ лабораторіи г. Пастера. Въ Бордо, какъ и въ Парижѣ, животныхъ, послужившихъ

для опытовъ, погибли черезъ три недѣли. Такимъ образомъ было доказано, что ядъ, убившій Берже, былъ ядомъ уличнаго бѣшенства, а не лабораторный.

Я имѣлъ основаніе говорить въ январѣ въ моемъ первомъ отвѣтѣ г. Петеру, что бѣшенство пастеровское и пастеровско-собачье есть миѳъ, плодъ его воображенія. И я утверждаю, что на этой почвѣ, чисто клинической, г. Петеръ не приведетъ ни одного доказательства своего мнѣнія. Напротивъ, мы знаемъ теперь, что форма паралитическая — одна изъ формъ бѣшенства, довольно обыкновенная, чтобы не сказать болѣе. Мы ее не знали, но этого мало, чтобы утверждать, что она не существуетъ и что г. Паsterъ создалъ ее своими прививками.

Гораздо справедливѣе сознаться въ несовершенствѣ нашихъ познанійъ эъ этой области патологіи; напротивъ, пользуясь этими новыми свѣдѣніями, мы можемъ спросить себя, не упускали ли мы изъ виду много случаевъ бѣшенства? Съ тѣхъ поръ, какъ вниманіе привлечено къ человѣческому бѣшенству, замѣчено въ нѣсколькихъ случаяхъ, что симптомы паралитического бѣшенства затѣмъ смыняются симптомами обыденнаго. Въ другихъ же случаяхъ страданіе все время ограничивается пораженіемъ продолговатаго мозга и смерть наступаетъ безъ появленія какихъ-бы то ни было мозговыхъ симптомовъ, которые прежде считались необходимыми при бѣшенствѣ. Молодой англичанинъ умеръ недавно у г. Гранше въ больницѣ для дѣтей. Прививки ему не были закончены. Симптомы его заболѣванія указывали на пораженіе одного продолговатаго мозга: затрудненное дыханіе, дыхательные спазмы, удушье. Не было ни одного проявленія паралитического или психического бѣшенства.

Во время утренняго обхода онъ спокойно разговаривалъ и г. Гранше обратилъ вниманіе своихъ учениковъ на малое количество симптомовъ, которые наблюдались на этомъ ребенкѣ; въ тотъ же вечеръ онъ умеръ.

Въ самомъ дѣлѣ, эта форма бѣшенства — самая быстрая, тяжелая и наименѣе проявляющаяся внѣшними признаками. Она легко можетъ остаться незамѣченной, если неизвѣстно предшествовавшее укушеніе. Предположите, что поименованный ребенокъ

живеть въ деревнѣ: при ничтожности симптомовъ, указанныхъ г. Гранше, можетъ быть не былъ бы призванъ даже врачъ или призванъ слишкомъ поздно, чтобы поставить диагнозъ *de visu*.

Мы всѣ медики должны еще многому поучиться въ вопросахъ о клиническихъ формахъ бѣшенства.

Статистика. Наконецъ, г. Петерь приводитъ въ свою пользу статистику. Здѣсь нашъ коллега пользуется страннымъ приемомъ. Онъ складываетъ всѣ смерти, произошедшия послѣ прививки и безъ прививокъ, и восклицаетъ: число смертности не уменьшилось,— значитъ, методъ недѣйствителенъ. Г. Пастеръ не въ состояніи же понизить смертность между лицами не привитыми и по здравому смыслу нельзя этого и требовать.

Въ 1886 году 19 лицъ, по крайней мѣрѣ, умерло отъ бѣшенства среди того малаго количества людей, которые не прививались, а изъ 1929 лицъ изъ Франціи и Алжира, привившихся въ лабораторіи Пастера, 21 умерли, несмотря на лѣченіе, т. е. 1,08%. Это — официальные числа и въ нихъ входятъ всѣ случаи смерти отъ бѣшенства, даже такие, которые умерли менѣе, чѣмъ черезъ 15 дней послѣ конца лѣченія.

Этихъ послѣднихъ слѣдовало бы не считать. Г. Петерь въ представленной имъ статистикѣ приходитъ къ другимъ результатамъ: онъ считаетъ въ пассивѣ не только лицъ, умершихъ безъ прививки, но онъ еще не допускаетъ, чтобы бывшіе въ лабораторіи Пастера могли умереть отъ чего-нибудь другаго, кроме бѣшенства. Такъ, онъ насчитываетъ 50 случаевъ и обвиняетъ г. Пастера въ томъ, что онъ не лѣчитъ, а распространяетъ бѣшенство. Онъ идетъ дальше и какой-то чудесной ариѳметикой высчитываетъ, что процентъ смертности привитыхъ составляетъ 50%, вмѣсто 1,08%. Чтобы получить такія числа, г. Петерь утверждаетъ, что только 30 или 40 человѣкъ укушены животными, несомнѣнно бѣшенными.

Опытная проверка укушенія бѣшенными животными сдѣлана на 233 лицахъ и для 1333 человѣка были даны свидѣтельства ветеринаровъ. По какому праву г. Петерь такъ сокращаетъ и опытныя и клиническія доказательства? Съ другой стороны, когда приходится опредѣлять смертность отъ бѣшенства до и

послѣ примѣненія метода Пастера, г. Петеръ то приводить статистику Леблана, которая высчитываетъ 16%, то ложную статистику Гюнтера, дающую 5%. Но статистики Гюнтера вовсе не существуетъ. Онъ приводить только одинъ исключительный случай, гдѣ на 21 укушенныхъ умеръ 1. Эта смертность въ 5%, установленная такимъ образомъ, не можетъ служить основаниемъ для сравненія. Но даже принявъ эту статистику и считая только укушенныхъ животными, бѣшенство которыхъ доказано опытнымъ путемъ, надо признать дѣйствительность метода. Дѣйствительно, изъ 233 лицъ зачисленныхъ въ эту категорію, умерло 4, т. е. 1,71%, считая и Мормона, который пришелъ въ лабораторію на 43-й день послѣ укушенія. Безъ него смертность составляетъ 1,28%. Что можетъ быть доказательнѣе этого? Въ статистикѣ, относящейся къ лицамъ, укушеннымъ волками, дѣйствительность метода проявляется въ еще болѣе яркомъ свѣтѣ. Здѣсь всѣ статистики согласны. Статистики Рено (254 случая), Валле (395 случаевъ), Дюмениля (342 случая), Бомбарда (168 случаевъ), Гамалъя (127 случаевъ) даютъ смертность отъ 60% до 64%. Если же сложить всѣ случаи лицъ, укушенныхъ бѣшенымъ волкомъ и привитыхъ, то получимъ:

Парижъ	52	случаевъ,	9	смертей
Одесса	46	случаевъ,	8	смертей
Москва	18	случаевъ,	2	смерти
Самара	4	случаевъ,	0	смертей

Въ общемъ, 120 случаевъ и 19 смертей, считая въ неудачахъ даже лицъ, умершихъ во время лѣченія.

Если считать только тѣхъ, которые умерли послѣ прививки, получимъ:

Парижъ	50	случаевъ,	7	смертей
Одесса	39	случаевъ,	1	смерть
Москва	16	случаевъ,	0	смертей
Самара	4	случаевъ,	0	смертей.

Въ общемъ, 109 случаевъ, 8 смертей. Средняя смертность, такимъ образомъ, 7,8% вмѣсто 62%.

Разница между привитыми и непривитыми такъ велика, что ставить дѣйствительность метода въ сомнѣнія. Вотъ оффи-

ціальна статистика лабораторії г. Пастера за первое полугодіе 1887 года. Къ 1-му іюля было привито 943 лица, 140 были укушены животными, бѣшенство которыхъ было доказано опытно (таблица А), 661 укушены животными, бѣшенство которыхъ засвидѣтельствовано ветеринарами (табл. В), 154 укушены животными, сильно заподозрѣнными въ бѣшенствѣ (таблица С). (Слѣдуетъ затѣмъ таблица этихъ 943 лицъ, раздѣленныхъ по національностямъ). Двое умерло во время лѣченія и не должны быть зачислены, при вычислениіи %. Это испанецъ Санцъ и ирландецъ Гайденъ. 6 умерло, не смотря на лѣченіе, считая Гуро, который умеръ послѣ 1-го іюля. Всѣ почти 6 умерли вскорѣ послѣ лѣченія: Синтеръ 11 дней, Бальтеросъ 12 дней, Гаше 8 дней, Сіера 11 дней, Гуро 17 дней — спустя послѣ окончанія прививокъ. Научно именно мы имѣемъ право исключить изъ статистики эти неудачные случаи. Извѣстно, вѣдь, что уличное бѣшенство послѣ прививки трепанаціей проявляется лишь спустя 15—20 дней.

Слѣдовательно, больные, умершие до этого срока послѣ лѣченія, были въ періодѣ первої инкубаціи уже въ то время, когда шло ихъ лѣченіе. А послѣднее имѣеть цѣлью только противиться этой инкубаціи и не можетъ подѣйствовать, не будучи законченнымъ. Однако, мы считаемъ и эти случаи въ пассивѣ метода. Такимъ образомъ смертность къ 1 іюля 1887 года составляетъ 0,64% по общей статистикѣ и 0,4% по статистикѣ франко-алжирской. Значитъ, статистика 1887 года еще болѣе благоприятна, чѣмъ 1886 года. Интересно знать, къ какой таблицѣ относятся неудачные случаи. Два — Бальтеросъ и Гоше — принадлежать къ таблицѣ С: они были укушены животными, подозрѣваемыми въ бѣшенствѣ. Остальные 4 принадлежать къ таблицѣ В; они укушены животными, бѣшенство которыхъ засвидѣтельствовано ветеринаромъ. А въ 140 случаяхъ таблицы А, укушенныхъ животными, бѣшенство которыхъ доказано опытно, не было ни одного смертного (рукоплесканія). Это доказывается, во 1-хъ, что собаки, подозрѣваемыя въ бѣшенствѣ большою частию бѣшенныя; во 2-хъ, что удостовѣренія ветеринаровъ имѣютъ большое значеніе вопреки мнѣнію, будто эти удостовѣренія выдаются по невѣдѣнію или даже изъ любезности, и въ 3-хъ, что лѣченіе

имѣть непосредственное вліяніе на смертность. Уже въ прошломъ году г. Вульпіанъ обратилъ внимание на то, что проценты смертности таблицы А и В почти одинаковы, и онъ заключилъ поэтому, что свидѣтельства, выдаваемыя ветеринарами, вполнѣ серьезны и точны. Въ этомъ году таблица А не можетъ записать ни одного случая смерти изъ 140 случаевъ, когда укушение было произведено животными, бѣшенство которыхъ доказано, что происходитъ оттого, что для этой категоріи лѣченіе всего болѣе энергично, болѣе продолжительно, словомъ, болѣе интенсивно и значитъ болѣе дѣйствительно. Доказательство зависимости успѣшности лѣченія отъ энергичности его вполнѣ установлено; оно дано уже г. Вульпіаномъ при сравненіи результатовъ простаго и интенсивнаго методовъ. 136 случаевъ укушеній въ лицо и голову, лѣчимыхъ простыми прививками, дали 9 случаевъ смерти, — смертность 7%. Изъ 50, укушенныхъ въ лицо и голову и лѣчимыхъ интенсивными прививками, ни одинъ не умеръ до настоящаго часа. Въ Одессѣ эти результаты еще очевиднѣе. Интенсивный методъ тамъ примѣняется безъ измѣненій со времени его появленія. Всѣ прививаемые получаютъ двухдневный мозгъ, а многіе однодневный. Кромѣ того, они содержатся въ больницахъ впродолженіи мѣсяца и въ это время стараются устраниить отъ нихъ возможность алкоголизма или пьянства, простуды или утомленія, что много разъ шло рука объ руку съ развитиемъ бѣшенства у нашихъ пациентовъ.

Эти условія несравненно выше чѣмъ тѣ, которыми мы окружаемъ нашихъ больныхъ, и результаты одесской статистики лучше нашихъ. Г. Гамалля въ письмѣ отъ 11-го юна сообщилъ г. Пастеру слѣдующее: «предохраненіе отъ бѣшенства по прежнему удачно: у насъ всего 553 привитыхъ и по прежнему нѣтъ новой смерти съ ноября прошлаго года».

Итакъ, успѣшность метода строго пропорціональна качеству и количеству яда. Нельзя дать доказательства болѣе точнаго, болѣе несомнѣннаго дѣйствительности самого метода. Г. Петерь настаиваетъ еще на другомъ возраженіи, почерпнутомъ изъ статистики: онъ рассматриваетъ не процентное отношеніе, а общее число случаевъ смерти въ годъ. Въ моей статьѣ въ словарѣ я

привелъ среднюю цифру 30 для Франціи, считая ее и тогда очевидно слишкомъ низкой, но я и не воображалъ, насколько официальные документы имѣютъ мало цѣнности во Франціи, въ дѣлѣ гигіенѣ и общественнаго здравія. Меня просвѣтилъ докладъ, прочитанный гг. Бертерономъ и Мартиномъ 23 мая 1887 г. въ совѣщательномъ по гигіенѣ комитетѣ. Относительно 1886 года, говорится въ докладѣ, мы пользовались тремя родами документовъ: 1) Доклады префектовъ, адресованные въ министерство торговли и промышленности. 2) Ежемѣсячный отчетъ департамента эпизоотіи, адресованный министерству земледѣлія. 3) Статистика Пастеровскаго института. Оказывается, что отчеты префектуръ приводятъ въ этомъ году 21 случай человѣческаго бѣшенства; министерство земледѣлія знаетъ только 8 случаевъ, а статистика Пастера 18 у лицъ привитыхъ и 17 у непривитыхъ.

Г. Пастеръ, въ своемъ мемуарѣ отъ 2 ноября, далъ имена и свѣдѣнія о жительствѣ 17 лицъ, умершихъ отъ бѣшенства безъ прививокъ. Къ этому числу нужно прибавить еще два умершихъ также безъ прививокъ въ 1886 г., — итого 19 чел. въ небольшомъ числѣ непривитыхъ. А желаете-ли вы знать, сколько изъ случаевъ несомнѣннаго человѣческаго бѣшенства занесены въ отчеты префектовъ? Ни одного. И это въ 1886 г., когда бѣшенство возбуждало всеобщее вниманіе. Въ Италии, напротивъ, гдѣ санитарный надзоръ энергичнѣе дѣйствовалъ, насчитываются для 1886 г. сто случаевъ смерти отъ бѣшенства. Нужно поэтому не принимать среднія цифры официальной статистики, чтобы не сдѣлать грубыхъ ошибокъ. Бертеронъ и Мартинъ заключаютъ, что администрація знаетъ во Франціи только ничтожное меньшинство укушенныхъ, и, навѣрное, гораздо меныше половины смертей. Д-ръ Рикашонъ провѣрилъ официальныя цифры для своего департамента и нашелъ 25 случаевъ смерти, изъ которыхъ только одинъ указанъ въ одномъ изъ официальныхъ отчетовъ. Итакъ, я считаю себя вправѣ заключить, вмѣстѣ съ англійской комиссіей, принимая самыя низкія цифры, «что по крайней мѣрѣ 100 чел. были спасены прививками». Я приступаю, наконецъ, къ вопросу, который больше всего возбуждаетъ интересъ г. Петера, — вопросу объ интенсивномъ лѣченіи и объ измѣненіяхъ, кото-

рымъ оно подвергалось. Г. Петеръ, кажется, думаетъ, что его критика побудила г. Пастера видоизмѣнить методъ; правда, г. Фришъ оспариваетъ эту честь. Къ сожалѣнію, я долженъ, на основаніи записей лабораторіи, разсѣять эти иллюзіи. Интенсивное лѣчепіе было видоизмѣнено втеченіе ноября и декабря, задолго до появленія критикъ г. Петеръ и напечатанія опыта Фриша. Послѣдовательно были отброшены мозги 1, 2 и 3 дней; безъ сомнѣнія, на самихъ научныхъ основаніяхъ, главнѣйшее изъ которыхъ — то, что ядовитость мозга зимой увеличивается. Замѣтили, что зимой сила 3—4 дневнаго мозга совершенно равна 1—2 дневному лѣтомъ. Это зависитъ отъ большей мягкости и болѣе быстрого высыханія лѣтнихъ мозговъ, которые скорѣе теряютъ ядовитость, чѣмъ зимніе.

По этой же причинѣ новому измѣненію въ обратномъ смыслѣ съ іюня мѣсяца этого года было подвержено лечение при слукахъ сильныхъ укушеній. Вотъ гдѣ истина! Но если бы даже г. Петеръ и былъ причиной уничтоженія интенсивнаго леченія, можно ли было его съ этимъ поздравить? Я не думаю, такъ какъ не увѣренъ, что при большей рѣшительности нельзя было бы спасти еще больше жизней. Но г. Пастеръ придерживался его съ крайней осторожностью въ виду тѣхъ ожесточенныхъ нападеній, которыя встрѣтили его методъ (интенсивнаго леченія). Посмотрите на одесскую лабораторію: русскіе ученые, болѣе увѣренные, не знаютъ не успѣха. Можетъ быть, потому, что они свободнѣе въ своихъ дѣйствіяхъ и мирно работаютъ, не заботясь о самозаштѣтѣ противъ ежедневныхъ ожесточенныхъ нападеній.

Если, какъ мнѣ кажется, человѣколюбіе единственный стимулъ, воодушевляющій критиковъ, то уже пора оставить въ покое прекрасный трудъ г. Пастера и предоставить каждому составить о немъ то или другое мнѣніе. Я боюсь, что этого не будетъ. Обвиняютъ Пастера въ томъ что онъ пробуетъ, и говорятъ, что методъ ничего не стоитъ, разъ въ немъ производятъ хотя бы и самыя незначительныя измѣненія. Я нахожу, что мы, врачи, слишкомъ требовательны: г. Пастеръ, дѣйствительно, не изъ нашей корпораціи, но это еще не основаніе тре-

бовать отъ него чудесъ. Кромѣ того, слишкомъ забываютъ, что здѣсь вопросъ не о вакцинаціяхъ въ простомъ смыслѣ этого слова, не объ аналогіи простымъ прививкамъ оспы. Методъ Пастера состоитъ въ предохраненіи послѣ укушенія посредствомъ серіи прививокъ бѣшенаго яда, что ведетъ къ насыщенію организма или къ приспособленію его къ этому же яду.

И значитъ, кромѣ послѣдовательности въ мозгахъ, составляющей сущность метода, вопросъ о дозѣ также чрезвычайно важенъ. Если это такъ, а я доказалъ это выше, то какъ-же можно требовать отъ г. Пастера, чтобы онъ угадалъ *a priori* ту дозу яда, которая должна быть сообразована съ каждымъ частнымъ случаемъ? Развѣ мы не пробовали долго, прежде чѣмъ узнали, дозу и способъ приема хини при каждомъ видѣ перемежающей лихорадки? Упрека-же въ ненаучности метода я, признаюсь, и не понимаю. При такомъ отношеніи нужно признать прививки Дженнеровскія еще болѣе ненаучными, такъ какъ онъ предохраняютъ отъ одной болѣзни посредствомъ другой. По моему мнѣнію, только то не научно, что не истинно.

Если бы мнѣ доказали, что бѣшенство можетъ быть излѣчиваemo какои-нибудь необыкновенной яичницей или раковинами устрицъ, я и это призналь-бы научнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, тѣ, которые вступаютъ въ споръ съ Пастеромъ, спрашиваютъ, «по-чему и отчего» его метода, на что онъ сможетъ отвѣтить только тогда, когда и мы дадимъ отвѣтъ на вопросъ нашего великаго комика: «почему опіумъ усыпляетъ?»

Я заканчиваю, такъ какъ старался представить академіи доказательства только научнаго характера. Повѣрьте, что я съ нѣкоторымъ успліемъ могъ подавить свои личныя чувства, такъ какъ не могъ выслушать безъ горестнаго изумленія обвиненій, направленныхъ противъ человѣка, сдѣлавшаго втеченіе 30 лѣтъ столько блестящихъ и полезныхъ открытій (апплидисменты). Что касается меня, то я всегда отношусь съ уваженіемъ, какъ къ своему учителю, предъ которымъ остаюсь въ долгу, къ человѣку, открывшему мнѣ новые горизонты къ наукѣ,— даже и въ томъ случаѣ, если я не вполнѣ съ нимъ согласенъ. Кто изъ

вась, въ этой академіи, скажеть, что Пастеръ не былъ его учителемъ? (Тройной взрывъ рукоплесканій).

Г. Вильменз. Теперь, послѣ подтвержденія англійской комиссіей прекрасныхъ трудовъ г. Пастера о бѣшенствѣ, академія, безъ сомнѣнія, вспомнитъ, что въ концѣ марта 1884 года г. Фальтеръ, тогда министръ народнаго просвѣщенія, назначилъ, вслѣдствіе просьбы самого г. Пастера, комиссію, проконтролировавшую опыты нашего знаменитаго собрата, которая и обратила особенное вниманіе на то, что собаки могутъ быть сдѣланы неспособными къ заболѣванію бѣшенствомъ. Предсѣдательствовалъ въ этой комиссіи г. Булей; я имѣлъ честь быть ея секретаремъ. Наши незабвенные собратья: гг. Вульпіанъ, Бекларъ, Полль Беръ засѣдали въ ней, а также и Тиранъ, директоръ земледѣлія. Отчетъ комиссіи, напечатанный въ концѣ августа въ «Офиціальномъ журналь»), подтвердилъ достовѣрность фактовъ по отношенію къ слѣдующему:

- 1) предохраненіе собакъ послѣ укушенія;
- 2) предохраненіе собакъ до укушенія;
- 3) зараженіе большимъ количествомъ уличнаго яда предохраненныхъ отъ бѣшенства собакъ;
- 4) продолжительность иммунитета предохраненныхъ собакъ.

Экспериментальные факты, представленные въ комиссію, слѣдующіе.

А) По отношенію къ продолжительности иммунитета: 6 собакъ, предохраненныхъ въ прошломъ году, не погибли отъ трепанациіи уличнымъ ядомъ. В) По отношенію къ предохраненію уже укушенныхъ собакъ: изъ трехъ предохраненныхъ послѣ укуса одна погибла отъ бѣшенства до окончанія предохраненія; во второмъ опыте изъ двухъ укушенныхъ непривитая погибла, привитая осталась въ живыхъ.

Эти опыты до сихъ поръ не были представлены въ отчетѣ офиціальной комиссіи, такъ какъ новый предохранительный методъ сдѣлалъ излишнимъ продолженіе трудовъ комиссіи.

Г. Шарко. Я заговорилъ, главнымъ образомъ, съ цѣлью напомнить академіи, какъ 18 сего января г. Вульпіанъ, нашъ незабвенный г. Вульпіанъ, взошелъ на кафедру защищать съ

энергіей методъ, за примѣненіе котораго (и въ этомъ одиа изъ его заслугъ предъ потомствомъ) онъ съ самаго начала мужественно и могущественно стоялъ. Если бы мы не имѣли несчастія его потерять, теперь онъ быль бы здѣсь на своемъ посту и, съ двойнымъ авторитетомъ испытанаго клинициста и талантливаго экспериментатора, онъ, человѣкъ прежде всего добросовѣстный, еще разъ опровергъ бы всѣ сегодняшнія возраженія. Доказательства, приводимыя имъ тогда, онъ нашель бы усиленными, вслѣдствіе увеличенія цифръ, благопріятныхъ методу и собранныхъ за послѣднее полугодіе въ лабораторіяхъ — парижской и заграничныхъ; онъ могъ бы еще опереться на этотъ важный и достопамятный документъ изъ Англіи, подписанный знаменитѣйшими среди знаменитыхъ именъ. Нѣтъ, сказалъ бы онъ, методъ не опасенъ и въ интенсивной формѣ. Онъ сказалъ бы, что ни разу не могли указать ни на малѣйшую опасность, вызванную прививками, и въ доказательство утвержденія, онъ кромѣ статистическихъ данныхъ могъ бы привести въ примѣръ 30 лицъ (изъ которыхъ 14 изъ одесской бактериологической станціи), которые добровольно подверглись интенсивному лѣченію во всѣй его силѣ, безъ всякаго вреда для здоровья. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ напомнилъ бы 20 случаевъ паралитического бѣшенства у людей не привитыхъ, слѣдовательно, оно не было продуктомъ лабораторіи. Безъ сомнѣнія, сказалъ бы онъ, никто не утверждаетъ, что методъ непогрѣшимъ, и поэтому, по крайней мѣрѣ, неприлично подымать трезвонь и въ будущемъ хоронить его при всякомъ новомъ неудачномъ случаѣ. Но, въ самомъ дѣлѣ, есть ли что-нибудь непогрѣшимое въ терапіи? И если методъ не непогрѣшимъ, то за то онъ дѣйствителенъ, такъ какъ уже спасъ большое число жизней, приговоренныхъ роковымъ образомъ къ ужасной смерти. Затѣмъ г. Вульпіанъ закончилъ бы, вѣроятно, повтореніемъ того, что было сказано имъ полгода тому назадъ. Я привожу буквально его простыя, но истинныя слова: «Открытие предохранительного лѣченія бѣшенства послѣ укушенія, обязанное исключительно опытному гению Пастера, есть одно изъ прекраснѣйшихъ открытій, которые когда-либо были сдѣланы какъ съ научной

точки зрѣнія, такъ и съ общечеловѣческой». «Да,— скажу я въ свою очередь, убѣжденный, что выражаютъ мнѣніе всѣхъ врачей, которые безъ предразсудковъ и безъ предвзятыхъ мнѣній занялись этимъ вопросомъ,— изобрѣтатель противобѣшеннаго прививокъ можетъ теперь больше, чѣмъ когда либо, съ высоко поднятой головой продолжать путь къ решенію своей славной задачи, не оборачиваясь ни на минуту ни на крикъ систематическихъ противорѣчій, ни на завистливый ропотъ подпольной клеветы!» (Горячіе аплодисменты.) Засѣданіе закрыто.

Приложение 6-ое.

Объ истребленіи кроликовъ въ Австралии и въ Ново-Зеландіи.

Пастеръ послалъ генеральнымъ агентамъ правительствъ Австралии и Ново-Зеландіи слѣдующее сообщеніе:

Парижъ, 5 января 1888 г.

Въ «Revue des Deux Mondes» за 15-ое августа 1887 года была напечатана статья С. de Varigni, изъ которой я приведу слѣдующія строки.

Разбогатѣвшіи внезапно во время войны Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ, вслѣдствіе возвышенія цѣнъ на шерсть, благодаря пріостановкѣ американской производительности, поселенцы Австралии вдругъ начали располагать большими доходами.

Ревностные подражатели всѣхъ англійскихъ обычаевъ, они переняли у нихъ и страсть къ охотѣ и основали въ Австралии и Ново-Зеландіи общества акклиматизаціи для ввоза изъ Европы зайцевъ и кроликовъ. Это было настоящее бѣшенство, какое-то

безумное повѣтріе, охватившее всѣ колоніи.... Каждый крупный собственникъ ни о чёмъ больше не думалъ, какъ только устроить себѣ собственную охоту. Почва и климатъ въ высшей степени способствовали разведенію кроликовъ: въ Англіи бываетъ у кроликовъ отъ четырехъ до шести пометовъ въ годъ, съ приплодомъ въ три или четыре за-разъ, а въ Австралии доходило до десяти пометовъ въ годъ, каждый отъ восьми до десяти.

Напрасно старались огораживать извѣстныя площади заборами: кролики подкапывались повсюду вдоль и поперекъ, къ великому отчаянію собственниковъ, которые удвоивали свои усилия и заботы для уменьшенія числа кроликовъ. Они настолько размножились, что теперь эта язва опустошаетъ Австралію и Ново-Зеландію. Всѣ огороды разорены; мѣста, производившія нѣсколько лѣтъ назадъ 150 четвериковъ ячменя и отъ 75 до 80 мѣръ пшеницы на гектаръ, теперь должны были быть брошены. Въ нѣкоторыхъ округахъ никакое хлѣбопашество не было возможно.

Крафольдъ разсказываетъ случай съ однимъ крупнымъ землевладѣльцемъ, который истратилъ 40,000 ф. с. (милліонъ франковъ) на борьбу съ этимъ новымъ бичемъ и въ концѣ концовъ долженъ былъ отъ этого отказаться. На нѣкоторыхъ фермахъ ихъ число доходило до сотни тысячъ и каждый годъ ихъ ростъ увеличивался вмѣстѣ съ ихъ числомъ. Будучи крайне прожорливы, они съѣдаются траву до корня и превращаютъ громадныя пастбища, питавшія прежде отъ 25 до 30 овецъ на гектарѣ, въ голыя и пыльные пустыни. Виноградники разрушены ими, и всѣ средства, употребляемыя до сихъ поръ для истребленія этихъ животныхъ, не дали никакихъ ощутимыхъ результатовъ. Охотятся на нихъ, убиваютъ ихъ, отравляютъ ихъ, — а они все-таки кишмя кишатъ.

Г. Вильямсонъ увѣряетъ, что при одной экспедиціи, которую онъ сдѣлалъ вмѣстѣ съ делегатомъ отъ правительства, они видѣли, что во всемъ округѣ трава исчезла. Цѣлые стада громадныхъ кроликовъ перебѣгали поле и едва разступались, чтобы дать проѣхать ихъ повозкѣ.

По почвѣ, изрытой порами, трудно было проѣхать безъ предосторожностей.

«Повсюду кролики,— говорить онъ,— на дорогѣ, въ полѣ; они скачутъ цѣлыми стадами, бѣгутъ другъ за другомъ по пескамъ; цѣлыми сотнями сидять они около своихъ поръ.... Если ихъ преслѣдуютъ въ одномъ мѣстѣ, они перебѣгаютъ на другое и размножаются съ такой быстротой, что только какое-нибудь естественное наводненіе могло бы съ ними справиться».

Вскорѣ появилась слѣдующая публикація, подтверждающая все выше разсказанное.

9 ноября и 2 декабря 1887 года въ парижской газетѣ *Temps* появилось слѣдующее объявление, исходящее отъ правительства Южной Ново-Галліи:

Управлениe Менъ, Сидней, 31 августа 1887 г.

Симъ объявляется, что правительство Южной Ново-Галліи обязуется уплатить сумму въ 625,000 франковъ (25,000 ф. с.) тому, кто обнародуетъ и покажетъ на свой счетъ методъ*или способъ, неизвѣстный до сихъ поръ въ колоніи, для окончательнаго истребленія кроликовъ,— способъ, удовлетворяющій слѣдующимъ условіямъ:

1) этотъ методъ или способъ по истеченіи пробнаго года долженъ быть одобренъ комиссіей, избранной для этого правительствомъ по согласію съ исполнительнымъ Совѣтомъ;

2) чтобы этотъ методъ или способъ былъ, по мнѣнію комиссіи, безвреднымъ для лошадей, овецъ, верблюдовъ, козъ, свиней и собакъ, и чтобы при этомъ не употреблялись средства, которыхъ могутъ быть вредными для здоровья этихъ домашнихъ животныхъ;

3) комиссія обязуется не разглашать подробностей этого метода или способа, — развѣ если комиссія рѣшится начать опыты съ этимъ методомъ или способомъ.

Всѣ сообщенія относительно какого-нибудь способа должны быть адресованы.....

Нѣсколько дней до появленія этой новости въ *Temps*, я получилъ отъ одного изъ жителей Ново-Зеландіи извѣстіе объ

опустошенияхъ, производимыхъ кроликами также и на этомъ островѣ.

27 ноября 1887 г. я написалъ въ газету *Temps* слѣдующее письмо, напечатанное 29 ноября:

Господину Редактору *Temps*.

Вашъ журналъ объявилъ нѣсколько времени тому назадъ, что правительство Южной Ново-Галліи, будучи безсильнымъ въ борбѣ съ своеобразнымъ бичемъ — размноженіемъ кроликовъ, предложило премію въ 625 тысячъ фр. за открытие средства, способнаго ихъ истребить.

Значительныя части Ново-Зеландіи, не менѣе опустошаляемыя чѣмъ и Австралия, оставлены фермерами, отказавшимися отъ овцеводства, по невозможности прокормить стада. Каждую зиму убиваютъ миллионами кроликовъ, безъ того чтобы это имѣло значительное вліяніе на уменьшеніе ихъ числа. Позвольте мнѣ сообщить посредствомъ Вашей газеты этимъ странамъ нѣсколько мыслей, примѣненіе которыхъ въ состояніи будетъ, можетъ быть, имѣть нѣкоторый успѣхъ.

До сихъ поръ употребляли для истребленія этого бича минеральныя вещества, преимущественно фосфорныя соединенія. Обращаться къ такимъ средствамъ, не значитъ-ли это итти по ложному пути? Что можно достичнуть такими минеральными ядами? Вѣдь эти яды убиваютъ на мѣстѣ ихъ употребленія — тамъ гдѣ ихъ положать. Для того чтобы истребить существо, распространяющееся по закону прогрессивной страшной жизни, не лучше-ли, въ самомъ дѣлѣ, для одоленія такого существа употребить такой ядъ, который, если можно такъ выразиться, обладаетъ такой-же жизнью, способный также, какъ и врагъ, размножаться съ удивительной плодовитостью?

Я желалъ-бы, чтобы пытались внести смерть въ норы Южной Ново-Галліи и Ново-Зеландіи, попробовавши сообщить кроликамъ болѣзнь, которая могла-бы стать эпидемической.

Существуетъ болѣзнь, известная подъ названіемъ холеры курь и давно уже изучаемая въ моей лабораторіи. Эта болѣзнь свойственна также кроликамъ. Вотъ опыты, которые я сдѣлалъ: я бралъ въ ограниченномъ пространствѣ известное количество

куръ и давалъ имъ пищу, загрязненную микробомъ, составляющимъ причину куриной холеры. Вскорѣ онъ начали погибать. Птички иногда опустошаются настоящими эпидеміями этой болѣзни, распространяющейся, безъ всякаго сомнѣнія, изверженіями первыхъ больныхъ куръ, которыми загрязняется почва и пища.

Я думалъ, что тоже самое случится и съ кроликами, и что, возвращаясь умирать въ свои норы, они могутъ передать болѣзнь другимъ кроликамъ, а эти въ свою очередь распространять болѣзнь дальше. Но, спрашивается, какимъ образомъ устроить, чтобы первые кролики восприняли въ себя эту разрушительную болѣзнь? Оказывается, что ничего нѣть легче.

Вокругъ какой-нибудь норы я устроилъ-бы легкую изгородь, окружающую известное пространство, куда кролики приходить искать себѣ пищу. Опытъ намъ показалъ, что очень легко культивировать въ совершенно чистомъ видѣ и въ какихъ-угодно размѣрахъ микробъ куриной холеры въ бульонѣ какого-бы то ни было мяса. Этой жидкостью, переполненной микробами, поливаютъ пищу кроликовъ, которые, наѣвшись, будутъ погибать въ томъ или другомъ мѣстѣ и, такимъ образомъ, распространять болѣзнь повсюду.

Я прибавляю, что паразитъ этой болѣзни, о которомъ я говорю, совершенно безвреденъ для домашнихъ животныхъ, за исключеніемъ, само собою разумѣется, куръ, но эти послѣднія не бываютъ конечно въ открытомъ полѣ.

Не сомнѣваюсь, что въ странѣ, разоренной кроликами, найдутся люди, готовые приложить предлагаемый мпою способъ, который очень простъ и который стоить, во всякомъ случаѣ, чтобы его попробовать.

Примите увѣреніе и т. д.

Вскорѣ послѣ отправки этого письма въ газету *Temps* мнѣ представился удачный случай сдѣлать прямые опыты на кроликахъ. Я зналъ, что куриная холера передается легко кроликамъ, но я не дѣлалъ послѣдовательныхъ опытовъ надъ этими грызунами. Я часто видѣлъ, что кролики погибаютъ, если они помѣщены въ недезинфицированной клѣткѣ, въ которой куры пали отъ куриной холеры. — Вопросъ еще въ томъ,— хотя нѣ-

заторые рѣшили его въ положительномъ смыслѣ, — не составляетъ ли куриная холера септициемію кроликовъ, изученную когда-то Давеномъ.

Я вскорѣ убѣдился, съ какой легкостью и быстротою эти грызуны умираютъ, если малѣйшая часть данной имъ пищи загрязняется культурой микроба куриной холеры.

Вотъ нѣсколько опытовъ, которые я поручилъ сдѣлать студенту медицины Луару, занимающемуся въ моей лабораторії.

27 ноября посадили въ клѣтку пять кроликовъ; они тамъ оставались до 6 часовъ вечера безъ пищи. Въ шесть часовъ вечера взяли чашку въ 100 куб. сант., налили въ нее заразительную культуру куриной холеры и намочили въ ней листья капусты. Давши потомъ стечь жидкости съ листьевъ, ихъ дали съѣсть пяти кроликамъ, которые въ нѣсколько минутъ кончили свою ёду. Въ 12 часовъ ночи къ нимъ посадили еще трехъ новыхъ незараженныхъ кроликовъ.

28 ноября, въ 8 часовъ утра, пять зараженныхъ кроликовъ оказались больными. Въ 11 часовъ двое умерло, черезъ 17 часовъ послѣ зараженной ёды; остальные три кролика умерли въ 3 часа дня, черезъ 20 часовъ послѣ ёды.

28 ноября, въ 7 часовъ вечера, нашли еще одного мертваго кролика, одного изъ тѣхъ, которыхъ посадили въ полночь къ кроликамъ, съѣвшимъ зараженную пищу. Остальные два, помѣщенные почью, кролика, остались здоровы.

Въ субботу, 3-го декабря, въ 5 часовъ вечера дали ёсть четыремъ кроликамъ листья капусты, которые были облиты 10 куб. сант. вирулентной культуры куриной холеры, разведенными въ 100 граммахъ стерилизованной воды. Все было вскорѣ съѣдено. Въ полночь помѣстили къ этимъ кроликамъ четыре новыхъ кролика.

4-го декабря, въ 8 часовъ утра, 2 кролика казались скучными; въ 11 часовъ одинъ умеръ; въ 2 часа еще двое умерло; въ 4 часа умеръ послѣдній изъ тѣхъ, которые ёли зараженную пищу.

Трупы ихъ были оставлены въ клѣткѣ съ тѣми, которые были помѣщены накапунѣ въ полночь въ клѣтку.

5-го декабря одинъ изъ этихъ кроликовъ найденъ мертвымъ; 6 декабря — другой; 7 декабря — третій, четвертый, наконецъ, умеръ 9-го декабря.

Всѣ вышеописанные кролики были комнатные.

17-го декабря дали кролику изъ садка 10 к. с. культуры куриной холеры также на листѣ капусты: 18-го декабря онъ умеръ.

Во всѣхъ вышеописанныхъ случаяхъ смерть произошла, какъ это было удостовѣreno, отъ микроба куриной холеры.

3-го декабря и въ послѣдующіе дни дѣлали также опыты со слѣдующими животными: свиньями, собаками, козами, овцами, крысами, лошадьми и ослами, всегда заражая ихъ кормъ. Ни одно изъ этихъ животныхъ не заболѣло.

Еще болѣе того: дѣйствіе этого микроба на кроликовъ такъ быстро, прибавлять же зараженной пищи почти не нужно, такъ что я убѣжденъ, на основаніи своихъ опытовъ съ курами, что эти послѣднія не умирали бы, еслибы ихъ пустить на почву, загрязненную отчасти кормомъ кроликовъ: онѣ гораздо менѣе воспріимчивы къ этой болѣзни, чѣмъ кролики.

Въ соприкосновеніи съ воздухомъ микробъ куриной холеры погибаетъ довольно быстро. Онъ теряетъ свою заразительность при температурѣ 51° Ц.; такая высокая температура бываетъ иногда, какъ говорятъ, въ Австраліи лѣтомъ, но съ кроликами никогда не придется имѣть дѣло на открытомъ воздухѣ при такой жарѣ.

Напротивъ, сохраненіе вируса куриной холеры очень легко: соприкосновенія съ воздухомъ втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ, такъ что можно всегда имѣть въ запасѣ очень заразительный вирусъ. Мои опыты, изложенные Академіи Наукъ въ прежнее время, доказываютъ это.

Культура микроба куриной холеры можетъ быть сдѣлана въ бульонѣ изъ мяса какого-бы то ни было животнаго. Безъ сомнѣнія, въ данномъ случаѣ будетъ выгоднѣе всего культивировать его въ бульонѣ изъ мяса кроликовъ.

Изъ предшествовавшихъ опытовъ вытекаетъ, что не только кролики, съѣвшіе загрязненный микробомъ кормъ, быстро умира-

ютъ, менѣе чѣмъ въ 24 часа, но что, кромѣ того, кролики, побывшіе съ ними вмѣстѣ и не ъвшіе изъ зараженной пищи, также умираютъ въ большомъ количествѣ.

Я не касаюсь теперь вопроса о способѣ зараженія этихъ послѣднихъ: этимъ вопросомъ я займусь впослѣдствіи.

Правда-ли, что кролики одной норы не приходятъ въ соприкосновеніе съ кроликамисосѣдніхъ норъ?

Нечего бояться неудачи этого способа истребленія кроликовъ, — даже въ томъ случаѣ, если принять, что кролики изъ одной норы не приходятъ въ соприкосновеніе съ кроликамисосѣдніхъ норъ и, слѣдовательно, не переносятъ туда заразу послѣ своего зараженія.

Болѣзнь такъ легко передается посредствомъ пищи, что если даже принять, что болѣзнь не передается отъ заразившихся кроликовъ здоровымъ, то все-таки истребленіе кроликовъ будетъ чрезвычайно легко.

Я сказалъ въ своемъ письмѣ въ газету *Temps*, что надо устроить легкіе заборы вокругъ норъ. Это оказалось совершенно лишнимъ.

Я представляю себя опытъ въ большихъ размѣрахъ въ слѣдующемъ видѣ: я велю скосить известное количество травы, которую потомъ сгребутъ къ выходнымъ отверстіямъ норъ кроликовъ, передъ ихъ ночнымъ выходомъ. Эта трава, загрязненная культурой микроба, будетъ съѣдена кроликами которые увидятъ, ее на своей дорогѣ. Барьеръ, чтобы ихъ удержать и заставить съѣсть эту траву, совершенно ненуженъ. Такимъ образомъ, получится повтореніе опыта, сдѣланнаго въ Реймсѣ, о которомъ я сейчасъ сообщу.

Было конечно, желательно производить подобнаго рода опытъ въ большихъ размѣрахъ.

Случай вскорѣ доставилъ мнѣ возможность производить такой опытъ при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ.

Г-жа Поммери въ Реймсѣ, владѣтельница большой торговли шампанскихъ винъ, носящихъ ее имя, прочитавъ мое письмо въ газетѣ *Temps*, прислала мнѣ слѣдующее письмо.

Реймсъ, 3 декабря, 1887 г.

Милостивый Государь!

Я владѣю въ Реймсѣ восьмью гектарами земли, находящимися надъ моими погребами и окруженными кругомъ заборами. Я возъимѣла несчастную мысль пустить туда кроликовъ, чтобы доставить моимъ внучатамъ охоту у себя дома, въ городѣ.

Эти животные до такой степени размножились и до такой степени подрыли почву, что я желаю ихъ истребить. Хорьки не въ состояніи заставить ихъ вылезать изъ большихъ мѣловыхъ насыпей, куда они прячутся.

Если вы желаете испытать способъ, предложенный Вами для истребленія кроликовъ въ Австралии, то я предлагаю Вамъ примѣнить его у меня.

Примите и т. д.... Ч. Поммери.

Вскорѣ я узналъ отъ моей интеллигентной корреспондентки, что изъ боязни, чтобы кролики, побуждаемые голодомъ, не прошли бы слишкомъ своихъ подземныхъ ходовъ и этимъ не повредили бы прочности сводовъ погребовъ, издавна зародилась мысль удержать ихъ въ своихъ норахъ недалеко отъ поверхности почвы, разбрасывая ежедневно вокругъ ихъ норъ кормъ изъ люцерны или сѣна. Понятно, слѣдовательно, какъ становилось легко испытать способъ истребленія кроликовъ въ усадьбѣ Поммери.

Въ пятницу, 23 декабря, я послалъ въ Реймсъ г. Луара облить ихъ дневной кормъ свѣжей культурой куриной холеры.

Какъ это бывало обыкновенно, кормъ былъ весь съѣденъ втечение пѣсколькихъ минутъ. Результатъ отъ этого получился, такъ сказать, поразительный.

Г-жа Поммери писала мнѣ 26 декабря:

«Въ субботу утромъ (слѣдовательно на другой день послѣ зараженного корма) сосчитали 19 труповъ виѣ норъ.

Въ воскресенье же не было осмотрѣно.

Въ понедѣльникъ утромъ насчитали еще 13 труповъ и съ субботы не видѣли ни одного живаго кролика, который бѣгалъ бы по землѣ. Кромѣ того, такъ какъ выпало немного снѣгу за

ночь, то не было также замѣтно слѣдовъ кроличьихъ лапокъ вокругъ норъ.

Вообще, кролики умираютъ въ своихъ норахъ. Тридцать два трупа, найденные на полѣ, представляютъ чрезвычайно слабое меньшинство изъ числа умершихъ, какъ это сейчасъ будетъ выяснено».

Въ другомъ письмѣ, отъ вторника, 27-го декабря, г-жа Поммери пишетъ мнѣ:

«Люцернъ, положенный вокругъ норъ въ понедѣльникъ вечеромъ, не былъ тронутъ и опять не видно было никакихъ слѣдовъ лапокъ на снѣгу. Все мертвъ...»

И, дѣлая намекъ на англійскіе журналы, раскритиковавшіе совершенно предложенный мною способъ и которые она мнѣ при этомъ письмѣ прислала, г-жа Поммери прибавляетъ:

Что станетъ съ англійскими нападками въ виду такихъ результатовъ? Поле въ восемь гектаровъ, кишѣвшее кроликами, стало мертвымъ полемъ.

Пастерь отравилъ обыкновенную порцію корма этихъ кроликовъ и на слѣдующій день ничего не двигалось. Все кончилось, все мертвъ.

Трудно узнать въ точности сколько кроликовъ умерло въ норахъ. Г-жа Поммери извѣстила меня однако въ письмѣ, только что полученному мною сегодня, 5 января, «что рабочіе считаютъ гораздо больше, чѣмъ въ тысячу, то число кроликовъ, которые приходили ежедневно съѣдать порцію корма въ видѣ восьми корзинъ сѣна, разбрасываемаго вокругъ ихъ норъ.»

«Съ другой стороны, прибавляетъ г-жа Поммери, гдѣ бы только ни открывали немнога мѣловыя насыпи, въ которыхъ жили обыкновенно кролики, вездѣ встрѣчаются кучи труповъ по два, три, четыре и пять кроликовъ.»





8040

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ
„ЗАПИСКИ
ИМПЕРАТОРСКАГО Общества Сельск. Хоз. Южной Россіи“
существуетъ съ 1830 года.

Адресъ Редакціи „ЗАПИСОКЪ“

*Городской садъ, зданіе Императорскаго Общества
сельскаго хоз. южной Россіи.*

По этому адресу Редакція покорнѣйше просить лицъ, желающихъ принять участіе въ журналѣ, высылать предположенные для помѣщенія въ журналѣ статьи, а равно обращаться и за всякаго рода, до изданія относящимися, справками и свѣдѣніями.

Статьи, присылаемыя въ редакцію безъ обозначенія условій, считаются бесплатными.

Въ Редакціи, а равно и въ типографіи Л. Нитче, принимаются для напечатанія въ «Запискахъ» объявленія съ платою за первый разъ 20 коп. за строку и 7 руб. 50 коп. за страницу; за повторенія: 10 коп. за строку и 4 руб. за страницу. Объявленія годовыя и занимающія болѣе страницы — по соглашенію съ Редакціей. Отпечатокъ клише оплачивается по соображенію съ величиной части страницы, занятой клише.

Лица, требующія отвѣтовъ отъ Редакціи, благоволятъ присыпать почтовую марку.

О книгахъ, присыпаемыхъ въ редакцію, будуть помѣщаться бібліографическія замѣтки.

Подписьная цѣна на годъ:

Съ пересылкою или доставкою 5 р. 50 к.

Безъ пересылки и доставки 5 " — "

Отдельныя книжки «Записокъ» за текущ. годъ 1 " — "

Подписка и объявленія принимаются въ Канцеляріи Общества, въ городскомъ саду.

Редакторъ П. Забаринский.