




НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ
УЧАСТЮ




СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

для здобувачів вищої освіти
другого (магістерського) рівня


23–24 квітня 2026 року

Тези доповідей

Одеса • ОНМедУ • 2026



НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ
УЧАСТЮ



СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

для здобувачів вищої освіти
другого (магістерського) рівня

23–24 квітня 2026 року

Тези доповідей

УДК 06.091.5:061.3:61-057.875
С91

Головний редактор:

в. о. ректора, член-кореспондент НАМН України,
професор Станіслав ШНАЙДЕР

Редакційна рада:

професор Валерія МАРІЧЕРЕДА
професор Людмила ВЕНГЕР
професор Алла ВОЛЯНСЬКА
професор Олег ГЕРАСИМЕНКО
професор Володимир ГОРОХІВСЬКИЙ
професор Ніна МАЦЕГОРА
професор Ярослав РОЖКОВСЬКИЙ
професор Олена СТАРЕЦЬ
професор Ольга ЮШКОВСЬКА
доцент Катерина НІТОЧКО

Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини для С91 здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня [Електронне видання] : наук.-практ. конф. з міжнар. участю. Одеса, 23–24 квітня 2026 року : тези доп. — Одеса : ОНМедУ, 2026. — 132 с.
ISBN 978-966-443-142-9

У тезах доповідей міжнародної науково-практичної конференції здобувачів другого (магістерського) рівня освіти наведено матеріали учасників зібрання, а також іменний покажчик доповідачів.

УДК 06.091.5:061.3:61-057.875

Мета роботи. Дослідити вплив різних матеріалів ортопедичних конструкцій на процес адаптації м'яких тканин та визначити матеріал, що забезпечує найбільш сприятливу реакцію тканин пародонта.

Матеріали та методи. У дослідженні Sailer та співавт. було проаналізовано клінічні результати у 188 пацієнтів, яким було встановлено 278 металокерамічних коронок. Протягом періоду спостереження у частини пацієнтів відзначалися підвищені показники ясенного індексу та ознаки запальної реакції у пришийковій ділянці.

У дослідженні Pjetursson та співавт., що включало понад 200 пацієнтів, проводилося порівняння металокерамічних та безметалевих керамічних коронок. Було встановлено, що безметалеві конструкції демонструють кращі показники стану ясен.

У клінічному огляді Mizrahi зазначається, що реставрації з діоксиду цирконію характеризуються високою біосумісністю та низькою адгезією мікроорганізмів.

У рандомізованому клінічному дослідженні Liu та співавт., у якому брали участь понад 300 пацієнтів, було встановлено кращі пародонтальні показники у пацієнтів із цирконієвими реставраціями.

Результати. У дослідженні, яке було взято за основу даної роботи, брали участь 34 пацієнти, у яких було відновлено 74 зуби у фронтальній ділянці одиночними коронками з діоксиду цирконію. До лікування товщина ясен становила $(1,26 \pm 0,48)$ мм. Через один рік після встановлення коронок вона збільшилася до $(1,52 \pm 0,51)$ мм (приріст 33,3 %).

Глибина пародонтального зондування протягом усього періоду спостереження знаходилася в межах 0–3 мм у 98,3 % випадків. Рецесія ясен протягом 6 років спостерігалася лише у 2,9 % випадків і становила 0,5–1 мм.

Висновки. Ортопедичні конструкції з діоксиду цирконію демонструють найбільш сприятливу взаємодію з м'якими тканинами порівняно з металокерамічними та іншими видами реставрацій.

Література

1. Sailer I., Makarov N., Thoma D., Zwahlen M., Pjetursson B. Порівняння металокерамічних та безметалевих ортопедичних конструкцій: клінічні результати // *Journal of Dentistry*. — 2015.
2. Pjetursson B., Sailer I., Makarov N., Zwahlen M., Thoma D. Керамічні та металокерамічні реставрації: систематичний огляд // *Clinical Oral Implants Research*. — 2018.
3. Mizrahi B. Особливості клінічного застосування діоксиду цирконію // *British Dental Journal*. — 2021.
4. Liu H. та співавт. Вплив цирконієвих реставрацій на стан тканин пародонта: рандомізоване клінічне дослідження. *Medicine*. 2026.

5. Wang J. та співавт. Клінічна ефективність керамічних реставрацій: систематичний огляд та метааналіз // *Journal of Clinical Medicine*. — 2023.

ПЕРЕДЧАСНЕ ВИДАЛЕННЯ ТИМЧАСОВИХ ЗУБІВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗМІР ЗУБНИХ РЯДІВ

Хахіяшвілі Анастасія

*Одеський національний медичний університет,
м. Одеса, Україна*

Актуальність. Передчасне видалення тимчасових зубів внаслідок карієсу та його ускладнень, травми, первинної адентії та інших причин знижує показники жувальної ефективності, яка є показником функції жування. Проблема ранньої втрати тимчасових зубів є актуальною, оскільки лише раннє заміщення дефекту може запобігти розвитку таких зубощелепних аномалій як скупченість зубів, звуження та деформація зубних рядів, зниження висоти прикусу та інших. Як відомо, саморегуляція з віком не відбувається. Для виявлення деформацій часто використовують аналіз моделей, який допомагає оцінити ширину та довжину зубної дуги, аналіз опорних ділянок та симетричність зубного ряду. Також важливим показником є дослідження жувальної мускулатури за допомогою електроміографії чи різних тестів для виявлення жувальної ефективності.

Мета роботи. Виявити баланс місця та звуження зубного ряду у дітей з передчасною втратою тимчасових зубів або адентією віком від 6 до 9 років.

Матеріали та методи. Для проведення аналізу використовували методи Берендока, Пона та МакНамара, щоб виміряти дефіцит місця у дітей 6–9 років з передчасною втратою молочних зубів або адентією. Метод Пона використовувався у дітей, у яких присутні були 1-ші постійні моляри без ротації, що утворили 1-шу групу. У дітей, у яких спостерігалась ротація бок — використовувався метод вимірювання ширини зубного ряду за МакНамара — 2-га група. Дані види аналізу схожі, тому 3-тю групу дітей обслідували за Берендоком, який установив очікувані розміри опорних зон, виходячи із суми мезіодистальних розмірів різців верхньої щелепи. Для проведення аналізу необхідно було виміряти фактичну величину опорних зон та порівняти її з даними прогностичних таблиць для визначення балансу місця.

Результати. За результатами дослідження у дітей першої групи спостерігалось звуження зубного ряду і становило від 0,8 до 9,69 мм. У другій групі звуження зубного ряду становило від 0,77 до 5,14 мм. У третій — від 0,9 до 3,2 мм. Дані результати показують, що передчасна втрата молочних зубів або адентія без протетичного лікування призводить до звуження зубного ряду.

Висновки. Передчасна втрата тимчасових зубів призводить до порушення формування та деформації зубних рядів та розвитку зубощелепних аномалій, тому своєчасна діагностика і заміщення дефектів зубного ряду є важливими для профілактики цих порушень.

Література

1. Деякі питання поширеності та структури дефектів зубних рядів у населення України. І. І. Соколова, С. І. Герман, С. А. Герман. *Український стоматологічний альманах*. № 6 2013 р. С. 116–119.

2. An innovative masticatory efficiency test using odour intensity in the mouth as a target marker: a feasibility study / T. Goto [et al.] // *J. Oral Rehabil.* 2016

3. Burstone, C. J. Physics and clinical orthodontics: 100 years ago and today [Text] / C. J. Burstone // *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* — 2015. Mar. — 147(3). — P. 293-4.

ОСОБЛИВОСТІ МІКРОКРИСТАЛІЗАЦІЇ РОТОВОЇ РІДИНИ У ДІТЕЙ З ГІПЕРЕСТЕЗІЄЮ ЗУБІВ

Гіносян Нарек

Одеський національний медичний університет,
м. Одеса, Україна

Актуальність. Мінералізуючий потенціал ротової рідини зумовлює стійкість твердих тканин зубів після їхнього прорізування, оскільки сприяє процесам дозрівання та ремінералізації емалі. Зміни у складі та властивостях ротової рідини є одним із провідних факторів розвитку карієсу зубів.

Мета дослідження. Вивчення типу мікрокристалізації ротової рідини у дітей 12–15 років з підвищеною чутливістю зубів.

Матеріали та методи. Обстеження проводилося на базі кафедри терапевтичної та дитячої стоматології Одеського національного медичного університету. В основну групу увійшли 15 дітей 12–15 років з гіперестезією зубів. До групи порівняння увійшли 14 дітей 12–15 років без гіперестезії зубів. Дослідження кристалоутворення проводилося за допомогою оптичного мікроскопа за методом П. А. Леуса.

Результати дослідження. Проведені дослідження свідчать про низький мінералізуючий потенціал ротової рідини у дітей з гіперестезією зубів. У 9 дітей основної групи спостерігався III тип мікрокристалізації; II тип мікрокристалізації визначався у 6 дітей з гіперестезією зубів.

Висновки. Проведені дослідження свідчать про необхідність проведення заходів, спрямованих на забезпечення підвищення вмісту мінеральних компонентів у ротовій рідині дітей з гіперестезією.

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДІВ ХІРУРГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕННЯХ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ

Золотухіна Катерина,
Комарницька Єлизавета

Одеський національний медичний університет,
м. Одеса, Україна

Актуальність: зростання кількості вогнепальних травм в Україні зумовлює необхідність підвищення точності та об'єктивності судово-медичних експертиз. Специфіка таких поранень полягає у значно складніших репаративних процесах порівняно зі звичайними переломами. Використання сучасних біохімічних методів дослідження, зокрема аналіз маркерів запалення, дає змогу отримати об'єктивні дані для планування термінів і обсягів хірургічних операцій, а також для ефективної профілактики післяопераційних ускладнень.

Мета: оптимізація процесів відновлення у пацієнтів із вогнепальними пораненнями щелепно-лицевої ділянки шляхом впровадження окремих модернізованих операційних методик.

Матеріали та методи дослідження. Експеримент був проведений на 36 білих щурах лінії Вістар (самці, вік 7 місяців, маса — 400–450 г). При проведенні досліджень усі тварини утримувались відповідно до «Настанов з утримання та догляду за тваринами» (Директива Ради ЄС від 24 листопада 1986 року, 86/609/ЕЕС). Також були дотримані «Правила використання лабораторних експериментальних тварин» (2006, Додаток 4), Гельсінська декларація про гуманне поводження з тваринами, Директива 2010/63/EU Європейського Парламенту та Ради від 22 вересня 2010 року про захист тварин, що використовуються в наукових цілях. У дослідженні були задіяні участь 3 групи тварин: контрольна група — інтактні тварини (n=4), група 1 — тварини з механічними ушкодженнями (а саме перелом) верхньої щелепи (n=16), група 2 — тварини з модельованим вогнепальним ушкодженням лівої верхньої щелепи (n=16). Дослідження тривало 28 днів.

Результати: за даними досліджень крові тварин, задіяних в експерименті, у 1-ї групи тварин через 21 добу маркери запалення значно перевищували показники у інтактних тварин. Тим часом ці показники були вищими, ніж у 2-ї групи тварин. Згідно з даними кісткових аналізів у щурів, після вогнепальних уражень були більш виражені процеси резорбції кісткової тканини щелеп, ніж у групі щурів після переломів, а процеси остеогенезу після вогнепальних поранень починаються на тиждень пізніше порівняно з остеогенезом після переломів.

Висновок. Вогнепальні поранення щелепно-лицевої ділянки характеризуються значно

Попружук Соломія 30
Постова Таїсія 108

Разінкін Олександр 100
Ратушненко Дар'я 83, 112
Рева Володимир 69
Рибалка Дмитро 65
Рижков Михайло 8
Родрігес Перес
Владімір-Рауль 84

Свистун Кароліна 17
Сич Артем 107
Склепкович Ірина 9
Сорокін Володимир 116, 117
Стець Владислав 43

Суськова Ольга 80
Сухенко Анастасія 66
Сущенко Еліна 71

Тиха Анастасія 92
Тімуш Катерина 9

Ушканенко М. Ф 18

Федоренко Еліна 89

Хахіяшвілі Анастасія 105
Хряпіна Маргарита 10, 30

Чернова Олександра 85
Чеханов Олександр 91

Шаміров Карен 85

Шип Софія 34, 36
Шубан Ярослава 10, 18

Щеглов Ілля 21, 31

Яременко Андрій 67

Abdelouahed Ichbani 120
Abozkika Mohammad 123

Bahmad Chafik 119

Kandayarai Milkakh 123
Kupchanko Sofiia 119

Raveel Mirza 120, 121, 122

Saida Raged 124