

ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ЦИРОЗОМ ПЕЧІНКИ ШЛЯХОМ РЕІНФУЗІЇ АСЦИТИЧНОЇ РІДИНИ

Дзигал О.Ф.

Одеський національний медичний університет, м. Одеса

Лікування хворих з цирозом печінки (ЦП), а також ускладненнями цього захворювання не є ефективним. Тяжким ускладненням ЦП є сформований набряковий синдром. Отримані нами раніше дані виявили доцільність реінфузії асцитичної рідини в якості складового компонента комплексного лікування вказаного контингенту хворих.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

Були проліковані 262 хворих із ЦП. Ретроспективно проаналізовані історії хвороб 48 пацієнтів з ЦП, у яких ЦП був ускладнений асцитом. Вони були розділені на наступні клінічні групи: до 1-ї клінічної групи відносили 21 хворого, яким було виконано лапароцентез та послідує доопераційне лікування ЦП. До 2-ї клінічної групи відносили 28 пацієнтів з ЦП та асцитом, яким також виконували лапароцентез, але в подальшому застосовували реінфузію асцитичної рідини після її очищення.

РЕЗУЛЬТАТИ

З числа хворих 1-ї групи протягом 3-річного інтервалу спостереження гарний результат було досягнуто у 3 хворих, задовільний - у 4 хворих та незадовільний – у 2 хворих. Було зафіксовано 7 летальних випадків. Гарний результат при реінфузії асцитичної рідини у хворих 2-ї групи був зареєстрований у 12 хворих, задовільний - у 7 пацієнтів, незадовільний – у 3 пацієнтів. Померли 3 хворі.

Виражена ефективність повторного застосування очищеної асцитичної рідини у хворих з ЦП та сформованим асцитом.

ВИСНОВКИ

Отже, ефективним способом лікування хворих з ЦП та зформованим асцитом є очищення та реінфузія асцитичної рідини, що відновлює динаміку лабораторних показників у хворих та покращує перебіг ЦП.