

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ,
присвячена 85-річчю з дня заснування
Студентського наукового товариства ОНМедУ



СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

(для молодих вчених та студентів)

22-24 квітня 2015 року

Тези доповідей



ОДЕСЬКИЙ
МЕДУНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ,
присвячена 85-річчю з дня заснування
Студентського наукового товариства ОНМедУ



СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

(для молодих вчених та студентів)

22-24 квітня 2015 року

Тези доповідей



ОДЕСЬКИЙ
МЕДУНІВЕРСИТЕТ

УДК 616-057.875:061.3
ББК 5(4Укр-2Оде)я431
С 916

Головний редактор:

лауреат Державної премії України, академік НАМН України,
проф. В. М. Запорожан

Редакційна колегія:

чл.-кор. НАМН України, з. д. н. т. України, проф. В. Й. Кресюн
(заступник головного редактора),
з. д. н. т. України, проф. Ю. І. Бажора,
з. д. н. т. України, проф. О. В. Зубаренко,
засл. лікар України проф. Б. С. Запорожченко, проф. О. О. Мардашко,
проф. А. С. Сон, проф. Ю. І. Карпенко, проф. О. Г. Юшковська,
Г. І. Хандрікова, доц. Н. О. Романова

Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини :
міжнар. наук.конф. студентів та молодих вчених, присвячена
85-річчю з дня заснування Студентського наукового товариства ОНМедУ. Одеса,
22–24 квітня 2015 року : тези доп. — Одеса : ОНМедУ, 2015. — 346 с.
У тезах доповідей міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених,
присвяченої 85-річчю з дня заснування Студентського наукового товариства
ОНМедУ, подаються стислі відомості щодо результатів наукової роботи, виконаної
учасниками конференції.

УДК 616-057.875:061.3
ББК 5(4Укр-2Оде)я431

ISBN 978-966-2070-00-2

©Одеський національний медичний університет, 2015

виявленню взаємозв'язу між показателем частоти приступів стенокардії і кількістю витків крупної епікардіальної артерії, де визначено ВИКА. Произведено ранжированное розподілення, а потім порівняльний кореляційний аналіз між бальною оцінкою частоти приступів стенокардії і кількості витків в крупній епікардіальної артерії.

Висновки.

1. У пацієнтів з ИБС, коронарним синдромом Х і виявленим феноменом ВИКА приступи стенокардії зустрілися достовірно частіше, ніж у пацієнтів з об'єктивними ознаками ішемії міокарда і інтактними коронарними артеріями ($p=0,0002$).

2. Існує достовірна залежність між кількістю приступів стенокардії і ізвитістю коронарних артерій у пацієнтів з ИБС і коронарним синдромом Х (коефіцієнт кореляції = $-0,72$), описується рівнянням регресії: $y_x = -0.11 x + 12.65$.

ПОШИРЕНІСТЬ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ХВОРИХ КАРДІОЛОГІЧНОГО СТАЦІОНАРУ

Амірова Г. Ю., Лагода Д. О.

Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна

Актуальність. Поширеність і захворюваність на фібриляцію передсердь (ФП) зростають у всьому світі та є найпоширенішим порушенням ритму серця, яке підвищує вплив на такі показники здоров'я населення, як втрата працездатності і смертність та є маркером загального серцево-судинного ризику та/або ураження серця. В Україні, за даними Всесвітньої організації здоров'я (ВООЗ), порушення серцевого ритму взагалі складає 33.3 % населення. Такий високий показник можна вважати епідемією.

Мета. Встановити поширеність порушень серцевого ритму, а саме фібриляцію передсердь у пацієнтів, які мають патологію серцево-судинної системи.

Матеріали і методи. Дослідження проводилося на базі Одеської Дорожньої лікарні. Із 365 хворих, що поступили упродовж 2014 року до кардіологічного стаціонару Дорожньої лікарні, 120 пацієнтів мали порушення ритму. Пацієнти з порушенням ритму були віком від 25 до 76 років, із них 73 чоловіки та 47 жінки. Пацієнти було розділені на дві групи: 1-ша група - пацієнти з основним діагнозом ішемічна хвороба серця (70 чоловік), 2-га група - пацієнти з діагнозом нейроциркуляторна дистонія (50 чоловік). У першій групі частота зустрічі ФП була вища (45%), ніж у другій (22%) ($p<0,05$). Також було встановлено, що ФП більша у чоловіків першої групи з супутньою патологією щитоподібної залози та цукровим діабетом 2-го типу (30%), проте як у другій частота зустрічання ФП склала 11 % ($p<0,05$).

Висновки. Частота ФП у хворих кардіологічного стаціонару – 23.5%, частіше на фоні супутньої патології ішемічна хвороба серця. Високий показник поширеності ФП потребує більш детального вивчення з метою розробки методів профілактики виникнення цього порушення ритму серця.