

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ,
присвячена 85-річчю з дня заснування
Студентського наукового товариства ОНМедУ



СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

(для молодих вчених та студентів)

22-24 квітня 2015 року

Тези доповідей



ОДЕСЬКИЙ
МЕДУНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ,
присвячена 85-річчю з дня заснування
Студентського наукового товариства ОНМедУ



СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

(для молодих вчених та студентів)

22-24 квітня 2015 року

Тези доповідей



ОДЕСЬКИЙ
МЕДУНІВЕРСИТЕТ

УДК 616-057.875:061.3
ББК 5(4Укр-2Оде)я431
С 916

Головний редактор:

лауреат Державної премії України, академік НАМН України,
проф. В. М. Запорожан

Редакційна колегія:

чл.-кор. НАМН України, з. д. н. т. України, проф. В. Й. Кресюн
(заступник головного редактора),
з. д. н. т. України, проф. Ю. І. Бажора,
з. д. н. т. України, проф. О. В. Зубаренко,
засл. лікар України проф. Б. С. Запорожченко, проф. О. О. Мардашко,
проф. А. С. Сон, проф. Ю. І. Карпенко, проф. О. Г. Юшковська,
Г. І. Хандрікова, доц. Н. О. Романова

Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини :
міжнар. наук.конф. студентів та молодих вчених, присвячена
85-річчю з дня заснування Студентського наукового товариства ОНМедУ. Одеса,
22–24 квітня 2015 року : тези доп. — Одеса : ОНМедУ, 2015. — 346 с.
У тезах доповідей міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених,
присвяченої 85-річчю з дня заснування Студентського наукового товариства
ОНМедУ, подаються стислі відомості щодо результатів наукової роботи, виконаної
учасниками конференції.

УДК 616-057.875:061.3
ББК 5(4Укр-2Оде)я431

ISBN 978-966-2070-00-2

©Одеський національний медичний університет, 2015

исследовании принимали участие 80 пациентов: 30 мужчин без симптомов дизурии и нормальной урофлоуметрией (группа 1); 30 пациентов с дизурией и патологической урофлоуметрией количество остаточной мочи (> 150 мл.) (группа 2); 20 пациентов, которым выполнялась МТУРП. Среднее значение Q_{\max}/T_{100} для 1 группы $1,49 \pm 0,43$; для 2 группы Q_{\max}/T_{100} $0,534 \pm 0,315$, при норме $Q_{\max}/T_{100} \geq 0,78$. Средний показатель TQ_{\max}/T_{100} был для 1 группы $0,428 \pm 0,068$; для 2 группы TQ_{\max}/T_{100} был $0,269 \pm 0,114$. Среднее значение Σ для 1 группы $0,689 \pm 0,033$; среднее значение Σ для 2 группы $0,579 \pm 0,080$, при норме $0,63 \leq \Sigma < 1$. Q_{\max}/T_{100} , TQ_{\max}/T_{100} , Σ можно выразить в количественном соотношении для образцов мочеиспускания и, таким образом, максимизировать значение результатов, полученных при урофлоуметрическом тестировании. По данным исследования для оценки урофлоуметрограммы достаточно определения трех параметров Q_{\max}/T_{100} , TQ_{\max}/T_{100} , Σ . Эти параметры позволяют не использовать другие уродинамические тесты для пациентов, считающихся здоровыми.

ОСОБЛИВОСТІ ОБСТЕЖЕННЯ ЧОЛОВІКІВ ІЗ СИНДРОМ ХРОНІЧНОГО ТАЗОВОГО БОЛЮ (СХТБ)

Руденко О. В., Лавренюк П. І.

Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна

Метою нашого дослідження було вивчити основні групи ризику чоловіків по формуванню патологічного комплексу – синдрому хронічного тазового болю на підставі оцінки основних чинників у розвитку та прогресуванні патології.

На базі клініки урології 10 МКЛ м.Одеси нами обстежено 36 чоловіків із СХТБ віком від 18 до 60 років. Обстеження включало: анкетування, огляд, лабораторне дослідження крові, сечі, секрету простати, УЗД, ультрасонографію, комп'ютерну томографію, нейрофізіологічне дослідження, консультування невропатологом та проктологом за показаннями.

За результатами обстеження у 16 чоловіків виявлено ураження статевого нерва – пудендопатія, у 10 – міофасціальний больовий синдром, у 7 – порушення кровообігу у судинах малого таза, у 2 – уретропростатичний рефлюкс.

У результаті нашого дослідження ми дійшли висновку, що комплексний підхід до діагностики СХТБ дає можливість виявити основні чинники даної патології у чоловіків та запропонувати нові підходи в лікуванні.

МОНІТОРИНГ ЕПІГЕНЕТИЧНИХ ЗМІН У ХВОРИХ ДГПЗ ЯК ДІАГНОСТИЧНИЙ МАРКЕР ПЕРЕДПУХЛИННИХ ПРОЦЕСІВ

Хаустов О. О.

Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна

Доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) є широко поширеним захворюванням чоловіків старшої вікової групи та зустрічається у 60% чоловіків у віці 60 років і старше, і у 80% пацієнтів після 80 років. Близько у третини з них при гістологічному дослідженні передміхурової залози зустрічаються передпухлинні зміни. Практична значимість вивчення цієї категорії хворих зумовлена ризиком розвитку у них раку передміхурової залози (РПЖ). Великий науковий інтерес