



НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ,
присвячена 150-річчю
з дня народження
Д. К. ЗАБОЛОТНОГО



СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

(для студентів та молодих вчених)

21–22 квітня 2016 року

Тези доповідей



ОДЕСЬКИЙ
МЕДУНІВЕРСИТЕТ



НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ,
присвячена 150-річчю з дня народження
Д. К. ЗАБОЛОТНОГО



СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

(для студентів та молодих вчених)

21–22 квітня 2016 року

Тези доповідей



ОДЕСЬКИЙ
МЕДУНІВЕРСИТЕТ

УДК 06.091.5:061.3:61-057.875
ББК 5я431
С 91

Головний редактор:

лауреат Державної премії України, академік НАМН України,
проф. В. М. Запорожан

Редакційна колегія:

чл.-кор. НАМН України, з. д. н. т. України, проф. В. Й. Кресюн
(заступник головного редактора),
проф. О. Г. Юшковська (заступник головного редактора),
проф. О. О. Старець, засл. лікар України, проф. Б. С. Запорожченко,
проф. О. О. Мардашко, проф. А. С. Сон, проф. В. Г. Марічереда,
проф. В. І. Величко, доц. К. О. Талалаєв,
Г. І. Хандрікова, доц. Н. О. Романова

С 91 **Сучасні** теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для студентів та молодих вчених) : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвячена 150-річчю з дня народження Д. К. Заболотного. Одеса, 21–22 квітня 2016 року : тези доп. — Одеса : ОНМедУ, 2016. — 156 с. ISBN 978-966-443-075-0

У тезах доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів та молодих вчених, присвяченої 150-річчю з дня народження академіка Д. К. Заболотного, подаються стислі відомості щодо результатів наукової роботи, виконаної учасниками конференції.

УДК 06.091.5:061.3:61-057.875
ББК 5я431

более значительное уменьшение болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде (2 нед.), в сравнении с пациентами, которым местная ирригация не выполнялась.

Частота повторных операций составляет в среднем 2 %, при этом все они отличаются высокой эффективностью.

ЕМОЦІЙНІ РОЗЛАДИ У МАТЕРІВ ДІТЕЙ З ОЗНАКАМИ РОЗУМОВОЇ ВІДСТАЛОСТІ

Анохін Є. А., Григорян Г. Е.

*Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна*

Загальновідомо, що повноцінний розвиток дитини, у тому числі такої, яка має психічні та поведінкові вади, залежить від емоційного стану матері та її вміння проаналізувати і адекватно висловити сутність нагальної проблеми.

Метою даного дослідження було з'ясування емоційного стану та ступеня його порушення у матерів, діти яких мають ознаки первинного когнітивного дефекту.

Нами досліджено 30 матерів, дітей яких направили на обстеження та лікування до КУ «ООМЦПЗ» з приводу тяжкої розумової відсталості (1), помірної розумової відсталості (6), легкої розумової відсталості (19) та розладів аутистичного спектра (4). Для контрольної групи відібрано 25 жінок такого ж віку, діти яких надійшли на лікування до дитячого відділення Одеської обласної дитячої лікарні.

Для дослідження використано такі методи: шкала тривоги Шихана, шкала Зунга для самооцінки депресії, Торонська алекситимічна шкала. Оцінка проводилася після відвідування матір'ю своєї дитини в стаціонарі. Передбачено 8 дескрипторів, за якими оцінювали стан: відсутність завищення показників за шкалами тривоги, депресії, алекситимії; ізольоване підвищення тривоги, депресії, алекситимії; попарне підвищення тривоги та депресії, депресії та алекситимії, алекситимії та тривоги; підвищення всіх трьох показників. Результати тестів у матерів хворих дітей були вищими порівняно з результатами контрольної групи.

Таким чином, матері дітей із психічними розладами мають достовірно вищий рівень тривоги та алекситимії, що потребує роботи як з дітьми, так і з матерями, до якої можуть бути залучені студенти-волонтери медичного університету.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК МОДУЛЯТОР ФАКТОРІВ САНОГЕНЕЗУ ПРИ ТРИВОЖНИХ РОЗЛАДАХ

Бабенко Н. В.

*Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна*

Тривожні та тривожно-фобічні розлади набувають у сучасному суспільстві надзвичайного поширення, насамперед серед молоді. Методи лікування та корекції потребують подальшого вдоско-

налення, не до кінця вивчені можливості сучасних інформаційних технологій, зокрема інформаційних мереж для надання дистанційної допомоги, поширення актуального досвіду окремих пацієнтів у корекції пароксизмальних станів при неврозах.

Метою роботи було узагальнення власного досвіду психокорекції у осіб, які хворіють на тривожні та тривожно-фобічні розлади та поширення його через соціальну мережу «ВКонтакте». Для цього у вказаній мережі було створено групу «Атака на панічну атаку», до якої підключалися не тільки зареєстровані члени з вказаними проблемами, але й фахівці, а також волонтери, зацікавлені у розв'язанні нагальної проблеми. Сьогодні у групі зареєстровано 736 осіб. Основна мета роботи такої групи — узагальнення тих факторів саногенезу, які спонтанно напрацьовані особами з невротичними розладами та використовуються ними для самокорекції у повсякденному житті. Включено конкретні цитати висловлювань людей: «Допомогати легше тому, хто поруч з тобою. А от собі допомогти — набагато складніше. Але я все одно працюю і буду працювати над собою. Тим більше, що бачу чудові результати. Я дуже рада спілкуванню з вами. Я тепер, як риба у воді. І так цього потребувала всі 4 роки...» (переклад та редактування — авторські). Отже, інтернет-ресурс є ефективним засобом організації паліативної допомоги хворим на тривожні розлади, що відкриває перед фахівцями потребу в участі у подібних форумах. Лікар не дає оцінки, а лише виступає як модератор, рівноправний учасник форуму. Таким чином, для фахівця у даній галузі Інтернет-ресурс стає способом оцінити ефективність своєї професійної діяльності, різних методів лікування пацієнтів, що страждають від панічних розладів.

ФАКТОРИ ПРЕВЕНЦІЇ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ В УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

Пахмурна В. С., Ярош Є. Я.

*Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна*

Перманентні бойові дії, які сьогодні спостерігаються в усьому світі, висувають перед психіатрами завдання не тільки лікувати посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), а й запобігати йому.

Метою роботи було виявлення та вивчення за допомогою клінічного і психодіагностичного методів осіб, які довгий час перебували безпосередньо у вогнищі бойових дій та брали участь у військових операціях. Незважаючи на жахи та небезпеку для життя на фронті, ці особи не проявляли ознак психічних розладів, у тому числі ПТСР. Усього досліджено 25 осіб (15 кадрових військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ та 10 добровольців).

Методи дослідження: тести Сонді, Равена, Люшера, Басса — Даркі, опитувальник Шмішека, проба Крепеліна, модифікована проба з гральними картами. Особливе значення ми надавали результатам опитування за тестами на професійну

придатність (Бойко), тестом на змістожиттєві орієнтації та тестом Рокича. Показник «Ціль» у першій групі був значно більшим, ніж у контрольній, яку утворили з 24 військовослужбовців, що повернулися з зони АТО з ознаками ПТСР. Зниження цього показника корелює із клінічними показниками, у тому числі окремими висловлюваннями обстежених про те, що «немає сенсу жити далі», «тепер мені вже байдуже, що далі буде» тощо. Показник «процес» характеризує задоволеність своїм статусом на момент дослідження; він суттєво нижчий у контрольній групі, що свідчить про чутливість цього показника щодо ПТСР як патологічного процесу. Субшкала «результат» характеризує переважно ретроспективні аспекти розвитку особистості й надає характеристику пройденого шляху без відокремлення його креативної складової. В основній групі було більше військовослужбовців, що до моменту ув'язнення мали повноцінну родину, дітей, з якими зберегли емоційний зв'язок. Характеристики груп термінальних цінностей у обстежених I групи свідчили про те, що найвищою цінністю для них є «воля». Утім досить високі рангові місця посідає також і «громадське визнання», і «впевненість у собі». Виявлено такі психологічні особливості людей, які зумовлюють їх високу стресостійкість в умовах бойової травми: чітка життєва позиція, прихильність до сімейних цінностей, патріотизм та загальнолюдські цінності.

ЕМОЦІЙНО-КОГНІТИВНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ТА ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА В ПСИХІАТРІЇ

Станинець К. В., Приходько І. В.

*Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна*

Робота виконувалася в межах тематики кафебри стосовно паліативних методів лікування хворих із необоротним перебігом тяжких психічних розладів.

Метою дослідження було встановлення зв'язку між емоційним станом хронічно хворих та ступенем збереження когнітивних функцій.

Дослідженню підлягали хворі чоловіки з гострого та хронічного психіатричних відділень КУ «ООМЦПЗ». Усього досліджено 60 хворих, яких було розділено на 2 групи: основна (35 хворих із хронічним перебігом шизофренічного процесу у фазі нестійкої ремісії) і контрольна (25 хворих на гострі психотичні розлади, зокрема з первинними психотичними епізодами). Було задіяно такі методи дослідження: шкала Гамільтона, тест на проходження лабіринту, Mini-Mental State Examination. Дослідження проводилося в динаміці, кожного хворого було тестовано тричі протягом 3 міс. з метою визначення динамічної тенденції вказаних співвідношень. У хворих першої групи ми спостерігали прямий кореляційний зв'язок між емоційним станом та когнітивними функціями: покращання першого, що відбувалося спонтанно або під впливом психотерапевтичних методів корекції,

приводило до значної активації когнітивної сфери. У контрольній групі, навпаки, не відзначено закономірних зв'язків між емоційним станом та актуальними якими когнітивної сфери: проведення лікування у цій групі хворих сприяло швидкому покращанню психоемоційного стану, редукції позитивної симптоматики при гострих психозах, але суттєво не позначалося на пізнавальних здібностях хворого.

Таким чином, корекція емоційного стану хворих із тривалим перебігом психічного розладу (шизофренія) має принципове значення для збереження пізнавальної діяльності у даного контингенту, що є одним із вузлових моментів паліативної допомоги в психіатрії.

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ, УСКЛАДНЕНУ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ

Давидок П. П.

*Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна*

Метою дослідження було виявлення впливу супровідного захворювання на цукровий діабет на перебіг шизофренічного процесу.

Усього обстежено 28 хворих основної групи на шизофренію, у яких на тлі основного захворювання розвинулася гіпоглікемія, що переросла у цукровий діабет. Контрольну групу утворили 25 хворих на шизофренію з нормальними показниками рівня глюкози у сироватці крові.

Методи дослідження: оцінка психотичної позитивної та негативної симптоматики за шкалою PANSS, оцінка когнітивного функціонування хворих на шизофренію за допомогою тестів проходження лабіринту і тесту на запам'ятовування попередньої карти, а також перманентний контроль рівня цукру у крові (1 раз на тиждень).

У результаті проведеного дослідження встановлено, що рівень когнітивного функціонування у хворих на шизофренію з супровідним цукровим діабетом значно гірший порівняно з контрольною групою. Глибина когнітивних порушень корелювала з тяжкістю перебігу цукрового діабету. Своєчасна корекція рівня цукру в амбулаторних умовах у 16 хворих основної групи дозволяла поліпшити показники когнітивної ланки психічного статусу хворих.

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ТЕРАПЕВТИЧНО-РЕЗИСТЕНТНИХ ХВОРИХ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

Кругляченко О. Д.

*Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна*

В умовах зони обслуговування дільничного лікаря існує досить велика когорта хворих на тяжкий психічний розлад, зокрема на шизофренію,