


Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины
Одесское отделение научного общества патофизиологов Украины
Одесское областное общество историков Украины

БЮЛЕТЕНЬ XIII ЧТЕНИЙ ИМ.В.В.ПОДВЫСОЦКОГО

19 – 20 ИЮНЯ 2014 ГОДА



ОДЕССА 2014

ББК 52. 52 Я 431

УДК 929 Подвысоцкий В.В. : 61

Организаторы – основатели конференции:

Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины

Одесское отделение научного товарищества патофизиологов Украины

Одесское областное общество историков медицины

Главный редактор

Гоженко А. И.

Редакционная коллегия

Заместитель главного редактора

Педанов Ю. Ф.

Ефременко Н. И.

Лебедева Т. Л.

Лисобей В. А.

Макулькин Р. Ф.

Ставрев Д. Г. (г. Варна, РБ)

Чурилов Л. П. (г. Санкт-Петербург, РФ)

Шафран Л. М.

Ответственный секретарь

Бадюк Н. С.

Адрес редакции:

ул. Канатная 92, 65039, г.Одесса, Украина

Телефон: +38(048)728-14-51

e-mail: medtrans2@rambler.ru

веб-сайт: www.medtrans.com.ua

XIII–е чтения В.В. Подвысоцкого: Бюллетень материалов научной конференции (19-20 июня 2014 года). – Одесса:

УкрНИИ медицины транспорта, 2014.- 331 с.

© УкрНИИ медицины транспорта



**ПОДВЫСОЦКИЙ
ВЛАДИМИР ВАЛЕРИАНОВИЧ**

24.05.1857 - 22.01.1913

Основатель и декан медицинского факультета,
Заведующий кафедрой общей патологии
Императорского Новороссийского университета
в городе Одессе
1900-1905

склеротичного пошкодження панкреатичних островків Лангерганса внаслідок прогресування саме імунопатологічних процесів.

Key words: immunopathological damage, pancreatic island.

УДК 613.81-055.2

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ЖІНОК, ХВОРИХ НА АЛКОГОЛЬНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ

INVESTIGATION OF WOMEN –ALCOHOLIC EMOTIONAL SPHERE

Рябухін К. В.

Одеський національний медичний університет

Метою даного дослідження стало вивчення особливостей емоційно-вольової сфери жінок, які страждають на алкогольну залежність.

В ході дослідження було продіагностовано 92 жінки у віці 29-52 роки, що мали діагноз алкогольна залежність, в якості основної групи (ОГ). До контрольної групи увійшли 89 жінок відповідного віку, без ознак алкогольної залежності. В дослідженні використовували психодіагностичний метод. Клініко-психологічне обстеження проводилось з використанням методів спостереження, клінічного інтерв'ю, а також психологічного тестування за допомогою методик «Особистісної шкали прояву тривоги Дж. Тейлор», методики «Самопочуття, активність, настрої» (САН), методики експрес-діагностики невротизації Хека-Хеса, а також шкали депресії Зунга.

Серед особливостей емоційно-вольової сфери у жінок з алкогольною залежністю вивчали рівень тривожності, особливості самооінки власного психоемоційного стану, ступінь невротизації, а також наявність депресивних тенденцій.

Особи, що відносяться до категорії високотривожних, спостерігались в 11,96% випадків в ОГ, що достовірно більше у порівнянні з КГ (різниця достовірна ($p < 0,05$)). Такі пацієнти схильні сприймати загрозу своїй самооінці і життєдіяльності у

великому діапазоні ситуацій і реагувати дуже вираженим станом тривожності. В даному випадку зловживання алкоголем було компенсацією тривожності.

Показники «Самопочуття», «Активність», «Настрій» в групах досліджених значно відрізнялися (достовірність відмінностей $p < 0,05$ по кожному з факторів). У групі жінок, залежних від алкоголю, значення за трьома факторами наближалися до нуля, що свідчить про низький рівень самооцінки, зниження активності, тривожність, астенизацію, пасивність.

Більшість досліджених ОГ мали високий рівень невротизації (82,60%), що проявлялось у підвищеній емоційній реактивності, схильності до негативних переживань (тривога, занепокоєння, напруженість, розгубленість, дратівливість). В КГ лише 7,86% осіб мали ознаки невротичного розладу (різниця між групами є достовірною ($p < 0,05$)).

Субдепресивний стан відмічався у 33,69% осіб ОГ, що достовірно частіше у порівнянні з жінками КГ (1,12%; $p < 0,05$). Цей стан характеризувався зниженим настроєм, песимістичною оцінкою подій і зниженням працездатності. Об'єктивно виявлялись загальмованість розумових і рухових процесів, значне зниження активності і працездатності. В деяких випадках наявними були суїцидні думки, зниження самооцінки, втрата перспективи майбутнього і песимістична оцінка минулого і сьогодення, втрата критичного ставлення до власного хворобливого стану.

Легкий ступінь депресії, який характеризував 46,73% досліджених ОГ, проявлявся в нерізкому пригніченні настрою, деякому зниженні активності та інтересів, суб'єктивному відчутті загальмованості розумових процесів, ослабленні інтенсивності позитивних емоцій і зниженні життєрадісності і уяви, ослаблення прихильності до життя.

Клінічний варіант депресії зустрічався лише серед досліджених ОГ (6,52% випадків) і характеризувався приєднанням маячних ідей (самознищення, винності, звинувачення та ін.), явищами депресивного ступору або меланхолійного збудження). В КГ більшість досліджених не мали ознак депресії (91,01% досліджених).

Key words: alcohol addition, emotional sphere.